



10h. 11. 15. 17

12 21 H -









ILLVSTRISSIMI.

Et Excellentiss. Sig. miei Padroni Colendiss.



Aria contro ogni ragione, che i primi fiori del Giardino si consegnassero ad altre mani, che à quelle de' Padroni: si che alle SS. V.V. Illustrissime, & Excellentissime era douuto per obbligo indispensabile questa mia Istoria Botanica, che sono le primizie del Giardino publico de' Semplici, confidato dalla loro bontà alla mia custodia; Io riuerente gliela presento, non come liberale donatiuo della mia diuozione, mà come necessario tributo della mia obligazione, pretendendo, che il mondo riconosca in questa mia offerta, non meno i contrasegni della loro padronanza, che gli attestati del mio profondo ossequio; sù questo fondamento, si come non ardisco di chiamare indegno del merito delle S.S.V.V. Illustrif. & Ecc. questo parto del loro Giardino più che della mia pēna, così confido, che sarà benignamente gradito dalla loro somma humanità. Egli è nato ne' recinti delle loro siepi, egli è stato coltiuito dalle rugie della loro liberalità,

beralità, e finalmente egli è cresciuto, e si è maturato al calore della loro protezione; ciò che io vi hò contribuito, è stato di condurre dalle più remote parti dell'Oriente, e del nuouo Mondo, la maggior parte dellè piante, che in quella sono descritte, e figurate, e di far godere à queste peregrine rarità della natura vn ospizio degno di loro nel giardino delle S.S. V.V. Illustrifs. & Eccell. Chi le accolse come Ospite al loro arriuo, non può senza violare le sante Leggi dell'Ospitalità disprezzarle, e negarle vn' amoreuole riceuimento, hora che se le presentano sù queste carte, doue assai più dureuolmente, che se fossero scolpite ne' marmi, attesteranno eternamente all' Vniuerso, e la magnanima cura delle S. S. V.V. Illustrifs. & Eccell. nel promouere gli Studi, e l'arti liberali, e la mia offeruanza infinita; in comprouazione della quale mi protesto con ogni riuerenza

Delle S.S. V.V. Illustrifs. & Eccellentifs.

Bologna li

Maggio 1675.

Humilis. e Diuotissimo Seruitore

Giacomo Zanoni.

Illustriſſimi, & Eccellentiffimi Signori Dottori Sindici
della Gabella Groſſa del preſente Anno 1675.

Sig. Bernardo Pini Priore.

Sig. Nicolò Alè.

Sig. Carlo Gaggi.

Sig. Gio: Battiſta Cingari.

Sig. Gio: Carlo Mattheſilani.

Sig. Co: Annibale Bianchi.

Sig. Vittorio Vittori.

Sig. Aleſſandro Guicciardini.

Sig. Co: Camillo Maluezzi.

Sig. Angelo Antonio Liuizani

Sig. Co: Federico Archidiacono Calderini.

Sig. Gio: Battiſta Giouagnoni.

Illuſtriſſimi Signori Senatori Aſſonti della medema
per l' Anno 1675.

Sig. Co: Marco Antonio Ranuzzi.

Sig. Gio: Antonio Vaſè Pietramellara, Bianchi.


Sig. Marco Antonio Gozzadini.

Sig. Angelo Michele Guaſtauillani.

Sig. Angelo Maria Angelelli.

Sig. Siluio Antonio Ghifelardi, Muſotti.

Sig. Co: Gerolamo Bentiuogli.



AL LETTORE.



*S*E à misura del gusto delicato del Mondo Letterario pretendessi di presentarti un' Opera degna del tuo sapere, haurei douuto certamente astenermi dal publicar ti queste mie fatiche; ma essendo mia intenzione di eccitare più tosto la tua erudita curiosità ad indagare cose non meno nuoue, che utili al genere humano, che di pascere il tuo intendimento, non ho stimato disdiceuole alla mia professione di publicare questa Istoria Botanica d'alcune delle più scielte Pianta, che sono state da me ricercate sino nelle più remote Parti della Terra, e la maggior parte coltivate ò nell' Horto publico di questa Nobilissima Madre de gli Studi, e nel mio priuato siccome l'unico mio fine è il publico bene, che dalla cognitione delle virtù, e qualità dell' herbe, e dello piante per l' uso della medicina può canarsi à beneficio humano, parendo, che la natura medica peritissima, et amorosissima de' suoi Parti, habbia in quelle più che altroue compendiate, e ristretta la forza, ed il vigore de' medicamenti. Così mi sono con rigorosi confronti sforzato di riconoscere le loro qualità, e con esatta descrizione di rappresentarle, acciò che non habbi da incorrere nell' errore di quelli, che ininatamente (come vedrai offeruato in più d' un luogo di quest' Istoria) presero una Pianta per l' altra, e confusero insieme col nome, le virtù; Al che se non hanno potuto conseguire le roze e espressioni della mia penna, sarà supplito, à mio credere, dalle figure delle medesime Pianta con ogni più esquisita diligenza fatte da me disegnare, e scolpire, à fine di porgere sotto gl' occhi una viuua, e vera imagine.

Essendomi conuenuto d' assoluta necessità di valermi del Testo Greco del gran Dioscoride; supplicho mi sieno seruiti dello Stampato in Basilea l' anno 1529. e di Marcello Virgilio Greco, e Latino Stampato nello stesso tempo, e nel medesimo luogo, e per l' interpretazione dal Greco, hò hauuto ricorso alla virtù, e perizia in detta lingua dell' Eccellentissimo Sig. Priore Pietro Mengoli Dottore di Filosofia Collegiato, e Publico Lettore delle Matematiche, e dell' Eccellentiss. Sig. Doctor Lorenzo Legati Professore di Lettere Greche in questa nobilissima Accademia.

Del resto se sei cortese, come spero, riguarderai benignamente le mie fatiche, ed il tuo gradimento mi somministrerà noua forza per intraprendere altra, e maggior opera; ma all' incontro se di Lettero vorrai farli mio censore, consenti che col Posa ti dica.

Carpere vel noli nostra, vel eade tua

nonisq; inuicem eliam in seclis.

quod si dicitur

in p. 1. d. 1. d. 1.

in p. 1. d. 1. d. 1.

in Q

IN-

INDICE

De gl' Autori nominati nell' Opera .



Amato Lusitano in
Dioscoride.
Andrea Cefalpino.
Andrea Lacuna.
Andernaco.
Aucenna.
Baldassare Campi.
Bartolomeo Maranta.
Bartolomeo Ambrosini.
Caio Plinio.
Carlo Clusio.
Carlo Rochasorte.
Cesare Odone in Theophrasto.
Christoforo Acosta.
Claudio Galeno.
Claudio Roccardi.
Columella.
Conrado Gesnero.
Domenico Cabreo.
Dionigi de' Carli Capuccino.
Ermolao Barbaro.
Fabio Colonna.
Francesco Alessandri.
Grazia dall'Orto.
Gaspardo Bauhino.
Giacinto Ambrosini.
Giacomo Bonzio.
Giacomo Cornuti.
Giacomo Dalechampio in Plinio.
Giacomo Tabernamontano.
Giovachino Camerario.
Giovanni Agricola.
Giovanni Bauhino.
Giovanni Bodeo.

Gio: Battista Rasari.
Gio: Battista Ignatio.
Gio: Battista Ferrario.
Giovanni Cornaro in Paulo Eginetta.
Gio: Enrico Cherlero.
Giovanni Figliuolo di Melue.
Giovanni Gerardo.
Giovanni Iunstoni.
Giovanni Manardi.
Giovanni Riario.
Gio: Maria Ferro.
Giovanni Pona.
Giovanni Ruelio.
Giovanni Serapione.
Giovanni Vislingo.
Giorgio Margraui.
Girolamo Irago.
Giulio Cesare Scaligero.
Gualtero Riffio.
Guglielmo Pisone.
Honorio Belli.
Indice Blesense.
Istoria generale delle Pianta di Lione.
Iunio Columella.
Leonardo Fuchio.
Leonardo Rauolfio.
Luigi Anguillara.
Luigi Mundella.
Marcello Virgilio.
Matteo Lobelio.
Matteo Siluatico.
Melchiorre Guilandin.
Michele Angelo Guatini, Capuccino.
Michele Campi.
Nicolo Marogna.
Nicolo Monardes,

Oribasio.
Othon Brunfelsio.
Padri Cenfori di Mefue.
Paulo Egineta.
Paulo Boccone.
Pedazio Dioscoride Anazarbeo.
Pietro Andrea Mattioli.
Pietro Bellonio.
Pietro Ferrari Giefuita.
Plateario.
Prospero Alpino.
Remberto Dodonco.

Ricardo di S. Lorenzo.
Roberto Morifone.
Simone Sett.
Simone Genouefe.
Theodoro Dorsteno.
Theodoro Gazza in Theofraſto.
Theofraſto.
Tobia Aldini.
Tomaſo Belluccio.
Valerio Cordo.
Vicenſo Bellunenſe.

FINE DELL'INDICE DE GL' AVTORI.



I N-

I N D I C E

Del Libro.



Cap.	1.	Pag.	1.
	2		6
	3		9
	4		11
	5		12
	6		14
	7		16
	8		19
	9		19
	10		21
	11		23
	12		23
	13		24
	14		29
	15		29
	16		30
	17		33
	18		35
	19		37
	20		40
	21		40
	22		44
	23		46
	24		48
	25		49
	26		51
	27		51
	28		52
	29		54
	30		59
	31		60
	32		61
	33		61
	34		62
	35		64

Canna

	Cap. 36.	Pag. 65
<i>Canna arborea Orientale.</i>		
<i>Carda arbore Indiano.</i>	37	66
<i>Cardilla arbore Indiano.</i>	38	66
<i>Cece Indiano perenne arboreo.</i>	39	66
<i>Celidonia Indiana, leggi Orbonna.</i>		
<i>Chriscome vero di Dioscoride.</i>	40	69
<i>Clemaide tetrafila Americana.</i>	41	74
<i>Dattura di Coccino spinosissima.</i>	42	76
<i>Dauco Siciliano con foglie di Pastinaca.</i>	43	78
<i>Dauco secondo Siciliano, con foglie di Sofia.</i>	44	80
<i>Dryosno di Plinio, leggi Braba.</i>		
<i>Erisimo di Dioscoride.</i>	45	82
<i>Eruca fruticosa con foglie di Tanaceto Indiana.</i>	46	86
<i>Eruca serpeggiante fruticosa Alpina.</i>	47	88
<i>Falangio ramofo Virginiano con foglie larghe serpeggianti.</i>	47	90
<i>Foglio, ouero Phillo maschio, e femina Indiano.</i>	48	92
<i>Fragaria arborea, con fiore herbaceo.</i>	49	95
<i>Fragaria Inglese di fior mezzo pieno.</i>	50	97
<i>Falsel arbore Indiano.</i>	51	98
<i>Garofalo Indiano velenoso.</i>	52	98
<i>Genestra arborea di Candia, con foglie sempre verdi.</i>	53	99
<i>Hilfune Cissampellos di Dioscoride.</i>	54	102
<i>Iacea spinosa Cretica, anzi spezie di Hiosfride Pliniana.</i>	55	105
<i>Iacea arborea argentea di Ragusi, parimente spezie di Hiosfride di Plinio.</i>	56	107
<i>Igli d' Ende Terra dell' Isola di Solor.</i>	57	109
<i>Kanadi pianta dell' Indie Orientali, detta anche Konadi.</i>	58	109
<i>Keiri con foglie dentate alpino di fior giallo odorato.</i>	59	110
<i>Lamba arbore Orientale.</i>	60	111
<i>Lamio arboreo perenne di Candia.</i>	61	112
<i>Leandro di Candia fruttifero maggiore fetido.</i>	62	114
<i>Leandro minore fruttifero di Candia.</i>	63	117
<i>Lepidio di Dioscoride.</i>	64	118
<i>Licnide siluestre viscosa peregrina.</i>	65	126
<i>Licnide umbellifera montana Eluttica.</i>	66	128
<i>Liubra, ouero Baccam frutice Orientale.</i>	67	130
<i>Malua con foglie di Bettonica prima.</i>	68	130
<i>Malua con foglie di Bettonica serpeggiante seconda.</i>	69	132
<i>Malua annua fruticosa Pernambucana di fior giallo.</i>	70	132
<i>Miagro de gl' Antichisecondo alcuni moderni.</i>	71	134
<i>Miagro Arabico, detto impropriamente Rosa di Gierico.</i>	72	138
<i>Miagro dell' Egitto, detto impropriamente Sesamo.</i>	73	140
<i>Miagro Affricano, chiamato (secondo alcuni) del Brasile.</i>	74	142


<i>Miagro di Sumatra, e di Soria, di seme spinoso, simile al capo d' uccello, detto impropriamente Rosa di Hierico silvestre.</i>	Cap. 75	Pag. 142
<i>Mimosa spinosa di Pernambuco.</i>	76	144
<i>Mimosa di Iamaica.</i>	77	149
<i>Mimosa spuria di Pernambuco, detta Mimosa Italica.</i>	78	151
<i>Nasturtio Orientale di Serapione, leggi Braba.</i>		
<i>Nasturtio de' tetti di Serapione, leggi Thlaspio di Dioscoride.</i>		
<i>Nelika.</i>	79	154
<i>Othonna di Dioscoride, chiamata da alcuni Celidonia Indiana.</i>	80	154
<i>Palma Indiana, chiamata da Portoghesi Birli.</i>	81	159
<i>Parcol arbore Indiano.</i>	82	159
<i>Pepe Indiano velenoso.</i>	83	160
<i>Pincheui arbore Indiano.</i>	84	160
<i>Pimpinella maggiore spicata di Canada.</i>	85	161
<i>Pimpinella minore spicata di Canada.</i>	86	163
<i>Quadrifoglio annuo pianta di Persia.</i>	87	164
<i>Ramba arbore Indiano.</i>	88	166
<i>Rambora, ouero Rumbora pianta Orientale.</i>	89	166
<i>Rategai arbore Indiano.</i>	90	167
<i>Rubia Silvestre aspera del Bosco di Raucenna.</i>	91	167
<i>Rumpha! pianta Orientale, specie d' Aro Indiano.</i>	92	170
<i>Serifo di Dioscoride, Leggi Assenzo Marino.</i>		
<i>Sesamo annuo, forse il bianco di Theophrasto.</i>	93	171
<i>Sesamo annuo Indiano, forse il secondo di Theophrasto.</i>	94	180
<i>Sesamo Perenne Indiano, pianta frumentacea, e specie di Sesamo.</i>	95	181
<i>Sidrine di Persia odorata.</i>	96	184
<i>Siderite Cretica viscosa con odore di Bitume.</i>	97	186
<i>Sisembro palustre alpino rotondifoglio.</i>	98	188
<i>Stipsdanti arbore Orientale.</i>	99	190
<i>Thlaspio di Dioscoride, o sia Nasturtio de' tetti di Serapione.</i>	100	191
<i>Thlaspio fruticoso di Persia, con foglia di Keiri di fiore odorato.</i>	101	196
<i>Toppi herba marina Indiana.</i>	102	198
<i>Totta vari, o forse Mimosa del Malabar.</i>	103	199
<i>Tossunda, ouero Casunda.</i>	104	201
<i>Trifoglio glutinoso, sabbatile, argenteo di fior odorato.</i>	105	201
<i>Verbena con foglie d' Ortica di Candia.</i>	106	203
<i>Virga Aurea Virginiana infusa annua di fior pallido.</i>	107	204
<i>Virga Aurea Virginiana minore.</i>	108	206
<i>Zambal frutice Indiano.</i>	109	207
<i>Zambul arbore.</i>	110	207

FINE DELL' INDICE.



fig 1

Abrotano marchio uero di Dioscoride





ISTORIA BOTTANICA DI GIACOMO ZANONI.

Abrotano Maschio vero di Dioscoride.

Cap. I.

Fig. 1.



On è cosa facile, o commune, la vera cognitione di questa Pianta; massime vedendosi appresso i moderni, oue trattano de gli Abrotani, e dell' Assenzo Serifio de gli Antichi, tanta diuersità di pareri, che frà i studiosi della professione, genera molta confusione; imperoche nell' istesso concettò da' Semplicisti sù tenuto,

l' Abrotano maschio volgare per il vero del sudetto Autore, quale da me per tale non viene stimato per la causa, che qui sotto soggiungerò, come ne pure alcun' altro di questa specie, da gli Herbari descritte sotto nome d' Abrotano maschio, ne meno l' istessa volgare femina, è quella dell' istesso Autore, ne altre diuerse specie di questa dal Clusio riserite ^a nella sua Istoria delle piante rare, quali tutte, e per la disposizione delle foglie, e de' fiori senza chioma, direi con buona licenza, o ruerenza de' passati, essere Abrotani femine, spurij, ò falsi, come à suo luogo andarassi dimostrando con maggiore dilucidatione; e frà tanto offerui, o Lettore, ciò, che ne dice Dioscoride, il di cui Interprete Marcello Virgilio, nel Cap. dell' Abrotano, ^b così lo fa parlare, *mas alterum vocatur, sarmentosum, absinthij modo fruticosum*; si che l' Abrotano maschio di Dioscoride, è pianta sarmentosa, copiosa di rami sottili à modo di flagelli, alquanto legnosi, di frutti minuti, e tenui, simili à quelli dell' Assenzo (che così appunto lo legge il mio Interprete dal Greco,) onde chiaro si comprende, che l' Abrotano commune, e maschio nostrale, abondante ne' nostri monti, e fiumi, è ch' oggi s' vfa nelle speciarie, non è in effetto, e fuori d' ogni dubbio, il vero, e legitimo di Dioscoride, per essere egli fruti-

A

ce, ò

^a l. 3. p. 12. 342.
^c 342.

^b pag. 347. l. 3.
^c 346.

ce, ò almeno, sottofrutice assai grande, composto di rami gruppolosi, & ineguali, grossi, duri, e legnosi, che porta foglie da quelle del Heliochriso diuersamente disposte, molto espanse, cioè largamente laciniate, di colore bianchiccio, d' odore grato, e di sapore poco amaro, qualità inuero tutte differenti dalla pianta, che descrive Diofcoride, ch'è di sapore amaro, anzi amarissimo, d' odore graue, noioso, penetrante, e che porta rami sottilissimi, e foglie, quali s' offeruano nel proprio Seme Santo; come quì appresso si dirà: si che per queste, & altre ragioni, e qualità, quest' Abrotano maschio nostrale, non è altrimenti quello di Diofcoride, e che non sia egli tale, l' accennò ancora l' Anguillara, nel parere decimo, oue trattando del sudetto di Diofcoride, scriue, *questo non si troua nascere in Italia, ma si bene nel contorno d' Aleppo di Soria, e nella Regione di Damasco, e per tutta la Natolia, cioè l' Asia*, e poco dopo soggiunge, *Il di cui seme si porta per seme Santo, che gli Arabi chiamano Semen Lumbricorum, & Auicenna Scheha*, dalle quali parole vengo confermato nel mio sentimento, cioè, che la pianta del seme Santo sia l' Abrotano maschio vero di Diofcoride; anzi, che la stessa Scheha d' Auicenna, che porta pure il seme contro lumbrici, come nel Cap. dell' Assenzo Serifio prouerassi, sia pianta diuersa dall' Abrotano maschio, di cui si tratta, che produce il vero seme Santo, e porta foglie lunghe, e non largamente disposte, ne cinericie come sono quelle, che produce la Scheha.

Viene questa pianta figurata, e descritta da non puochi de moderni Herbari, fra' quali il primo fù il Mattioli in tutte l' Editioni de suoi Commentarij sopra Diofcoride; però con questa differenza, che, se nelle prime figurò la pianta senza foglie, ^d nell' vltima la portò con foglie, e supposte al parere de gl' intendenti, massime da Gasparo Bauino nell' Istoria Bottanica, ^e e ciò non senza ragione, come conoscerà il Lettore, venendo proposta nella Pinace, ^g e nella Phitopinace ^b con nome d' Assenzo Serifio Alessandrino. Gio: Bauino poi nominolla seme contro lumbrici, seme Santolino, e Santonico di Galatia, Assenzo Romano, e seme zena, e seme Zedoaria, come si legge nella sua Istoria. ⁱ Il Cordo sopra Diofcoride ^k e nell' Istoria, ^l gli diede nome d' Assenzo Serifio Alessandrino, e seme Zino, come pur altri fecero, che per breuità tralascio.

Si trouano delle fogliette naturali di questa pianta, ouero d' Abrotano maschio, mischiate col di lei seme, che viene di Levante, sotto nome di seme Santo, cl' offeruate col microscopio, seno di forma lunghette, e strette, con vn neruo, che di sotto si mostra rileuato, con il contorno delle foglie medesime, a quella parte riuolte, di forma, e figura simili à quelle del Rosmarino coronario di foglie strette, ma queste son di color bianco, il quale fù proposto, e creduto dal Dalecampio ^m essere la cassia nera di

^c Pag. 167. par. 10.

^b Pag. 466. t. 24. l. 3. editione latina vniuers.

^e Pag. 181. l. 3. cap. 15. tom.

^g Fig. grande

^f Pag. 181. l. 10. 3. l. 16 cap. 71

^k Pag. 139. fig. 2.

^h Pag. 137. fig. 2. cap. 19.

ⁱ Pag. 180. l. 10. 3. l. 16 cap. 71

^k Pag. 51. l. 3. cap. 27.

^l Pag. 105. l. 14. cap. 81.

^m l. 12. c. 20. Pag. 308.

di Theofraſto, ch'io non conſentirei, per eſſere la Caſſia nera di queſto Autore ſenza odore, come ſi legge nel medefimo appreſſo al Gaza, nella ſua Iſtoria delle piante, * e queſto frutice è odorato, ma le foglie della pianta di che ſi parla, ouero dell' Abrotano maſchio, ſono molto minori, e il di loro colore, ſecche però, piega al giallo, & eſſe ſono per il più ad vna ſola, e tal volta vna di queſte porta il veſtigio d' vn'altra, e di più ancora, mà frà di loro diuiſe, & ineguali, come bene s' offerua nel ſopranotato ſeme, e come eſprime il Camerario nel ſuo Mattioli; * onde crederei, che frà queſte due ſorti di foglie, che le intiere, e ſolitarie, foſſero quelle, che ſono ne' rami ſuperiori, della ſteſſa pianta, e non altrimente ramoſe, come alcuni uella imagine del ſeme Santo, hanno figurato, e l'altre che ſono vnite à due, e tre inſieme foſſero parti rotte delle foglie medefime, che ſtanno ſituate nella pianta da baſſo diſpoſte per la lunga, e per conſequentia ſomiglianti, come accennò Serapione, nella pratica à quelle dell' Abrotano femina ſequent; mà nel contorno fraſtagliate, & inegualmente dentate, e poſcia come ſcriue Dioſcoride ſomiglianti (in quanto alla diſpoſitione, e forma,) à quelle del Heliocriſo; reſti però qui auuertito il Lettore, che Dioſcoride paragonò il ſuo Abrotano maſchio, con le foglie del Heliocriſo, mà però di quel Heliocriſo, che lui deſcriue, ch'è di foglie ſtrette, e lunghette, e non largamente eſpanſe, come vedo eſſerſi da alcuni creduto, e ſtato figurato nel loro Heliocriſo, e ciò verifiſimilmente; perche meglio ſi rafſembrino al loro Abrotano maſchio noſtrale, ch'al mio parere non è altrimente Abrotano, e ſe è (ch'io no'l credo) è falſo, e ſpurio, anzi è più toſto queſta, pianta vn genere d' Aſſenzo, fruticoſo, e odorato, che d' Abrotano, ſi come ancora ſon altre ſorti di queſti dalli herbari deſcritte ſotto varij nomi d' Abrotani maſchi.

Si ritroua nel mio Horto vna pianta Orientale, ouero vn Heliocriſo, il di cui ſeme, già tempo fa, capì di Perſia. Queſta porta foglie lunghette, e ſtrette, per interualli dentate, & è di poca altezza, e per conſequentia ſomiglianti all' Abrotano maſchio del medemo, & hà le foglie nel di ſotto, e nel di ſopra diſpoſte per la lunga, dentate, e incife, ne ſono lontane da quelle del vero Abrotano femina ſequent, come ben auerte, e ſcriue Gio: Serapione, il teſto del quale qui di ſotto ſi porta per teſtimonio, e legitima proua, ſi del Abrotano maſchio, come della femina ancora, che ſegue, e ciò ſi legge, dicendo egli, *Species Abrotani ſunt dua, quarum vna dicitur masculus, & alia femina ſcilicet femina eſt ſerè ſicut masculus. Differt tamen in hoc, quòd iſta ſit planta ſimilis Arbuſto, habens folia albicantia, & eſt plena folijs, qua ſunt ſupra ramulos, ſciſſa parua ſiſſura, ſicut Sarricon, ouero Serifo, & in ſummitate eius eſt ſlos ad rotunditatem tendens, au-*

rei coloris, aureis apprens in estate: & habet odorem bonum, cum grauedine pauca, amarisaporis, & dicunt aliqui, quod abrotanum Sicilia est tale: sed masculus habens ramulos subtile aliquantulum lignosos: & est parua planta eius, sicut Absinthium, & quod ex ea administratur, est flos, & summities eius.

Vfasi molto à nostri giorni questo seme Santo, ò più tosto seme dell' Abrotano maschio. di questo Autore, preparandosi nelle Speciarie col zuccaro, prescriuendosi da gli Eccell.^{mi} Medici à fanciulli contro li vermi, qualità, che sendo attribuita da Dioscoride à suoi Abrotani, serue per confirmare il mio parere, che non si scosta da quello dell' Anguillara, nel trattato però di questo di che si parla, perche confrontano in lui tutte le vere notizie, qualità, e virtù, che detto Dioscoride attribui à suoi Abrotani, come notò Marcello Virgilio nella precitata pagina, "dicendo: plurimum nascitur Abrotanum in Capadocia, & Asia Galatia, & Hierapoli, Succurrit in difficultate spiritus, non nisi recta ceruice spirantibus, vtriusque semen decoctum, crudumque, tritum, & cum aqua potum. Succurrit & ruptis, & conuulsis, coxendicis doloribus, angustijs vrina, & suppressis mensibus: quin etiam letalibus venenis aduersatur cum vino potum, Ex oleo idem cum febrium accessionibus cum tremore algentibus inungitur; fugat idem serpentes lectis instratum, & ad suffitus incensum. Cum vino potum contra eorundem morsus utile est: phalangijs priuatim, & scorpionibus aduersatur. Cetera oculorum inflammationes cum decocto cydonio malo, aut pane emplastri modo imponitur. Discutit præterea pannos Abrotanum decoctum, & cum farina hordeacea, qua hydrelæo subacta fuerit coactum. Miscetur præter hæc, & additur in confectione irini vnguenti: soggiunge Marcello nel suo commentario nel sopracitato luogo, altre virtù mirabili attribuite da Dioscoride à suoi Abrotani, ben che nel testo del medesimo non siano notate, come l' istesso Marcello afferma, cõ le seguenti precise parole. Obseruauimus præterea Græcum Dioscoridem, qui mihi omnium vetustissimus, & probatissimus est, Paulum Eginetam, Galenum, Serapionem, & plerosque alios in Abrotani decretis legentes, plerasque alias vires à cunctis, & ab aliquibus eorum Abrotano decerni. Quales sunt, ventris omnia animalia necare, capilli defluuia, quas alopecias vocant expellere, ex tenui aliquo oleo inunctum, crematumque maiores in siccando vires acquirere, quæ in scriptore hoc desiderari forte possunt temporum iniurijs, & librariorum incuria amissa.

Prouano anco di più la mia opinione, l' altre virtù da me offeruate nel seme Santo, tutte concorrenti ad altre delli Abrotani di Dioscoride; perche gioua nelle difficoltà del respiro, come hò offeruato, & esperimentato in me stesso, vfando vn poco della di lui poluere sèra, e mattina, drama vna per volta in vino grande solue lentamete il corpo; facenda à me accorsa alcune volte, & il simile ad altri àncora che l' hanno pigliata; la mede-

desima funzione auertisce il Plateario nella pratica di Gio: Serapione ^{1 Cap. 317.} il medesimo scriue il Pandetario ^{pag. 145.} nel trattato dell' Abrotano, e purga le reni ^{1 Cap. 10.} per vrina da materia crassa, e viscosa; benchè l' vrina stessa al più delle volte resti di colore di sangue, quale effetto egli fa tante volte, quante si piglia, però ciò coll' vlarla alcune volte prima, mitiga i dolori sciatici, & adduce i menstrui presane al sudetto peso la poluere la mattina in vinoagliardo, come anco la sera doppo cena, e così continuando sino, che faccia l' effetto, il che tutto m' induce à credere, che vaglia ancora ne gli altri anali, de quali Dioscoride notando i luoghi, e virtù de suoi Abrotani, lasciò scritto, come ben spiegò il mentionato suo interprete ^{pag. 148.} Marcello.

Rappresento quiui al Lettore la propria Imagine, qual'è la stessa del seme Santo, leuata dal Dodoneo, ch' al mio credere la stimo la medesima del Mattioli, gli aggiungo però le sue foglie ne' rami superiori diuerse da quelle delli sopranotati Autori, stante come si disse in questo, non esser tali, cioè l' istesse ch' io hò ritrouato, framezzate nel sudetto seme Santo, e l' altre della pianta da basso, sono le stesse trouate parimente nel medesimo seme, mà rotte, à due, e à tre insieme, come sopra notai, ch' al mio credere, sono come scriue Dioscoride, simile à quelle del suo Heliocriso, cioè lunghe, strette, e con interualli dentate, e frastagliate, e non altrimenti disposte in forma ampia, come sono state da altri figurate, anzi queste confrontano giustamente conforme auerte Gio: Serapione nella sua pratica, come nelle sopranotate pagine si scriue, douer esser le foglie dell' Abrotano maschio, quasi simili à quelle della femina.



Abrotano femina di Dioscoride. Cap. 2.

Fig. 2



Scendofi horamai à bastanza dimostrato quale sia l' Abrotano maschio di Dioscoride, descriuerò ancora con la sua figura quale sia del medesimo la vera femina, ch' al mio parere fù à gli huomini tanto tempo incognita; molte piante in vero proponansi da moderni per essa, mà sendo che da nissuno si dimostra con descrittione, ò figura, quale sia la legitima di questo Auto-

re, io per tanto con ragioni efficaci, e valide farò vedere non esserne, altra, che meglio conuenghi con la descrittione di Dioscoride, frà tante già proposte da tutti gl' Autori, che quella, che da me hora sarà foggionta: molte specie sono le registrate da Gasparo Bauino nella Pinace, ^a si come anco nella Pytopinace, ^b la prima delle quali fù anco notata appresso al Trago nell' Istoria, ^c dal Fuchsio, ^d dal Cordo, ^e dal Gesnero, ^f e da altri diuersi, che per breuità tralascio, quali eredertero esser; mà al mio parere, con errore, il Chamecipariso di Plinio, nome (pens'io) supposto, per non hauere l' Autore dato lume alcuno delle fategge della pianta, non trouandosi altro di lui, se non le sequenti parole portate dal Dalechampio & *Chameciparistos herba ex vino pota contra venena serpentium omnium, scorpionumque pollet*: si che lascio qui al giudicio de' Letterati, se dalle sudette parole di Plinio si può di questo Chamecipariso determinare cosa alcuna, da certi ancora viene proposta questa pianta (ch'io non direi) anzi figurata, e descritta per l' Hifsopo di Dioscoride, e de gli antichi, e doue sono mai in questa pianta le foglie, e la chioma corimbifera simile à quella dell' Origano, donde fù da questi antichi al loro Hifsopo attribuita?

Da altri viene questa pianta figurata, e descritta per Santolina, nome, cred'io, dal Santonico dedotta, anzi da certi creduta il Santonico del medesimo Autore: mà di gratia, oue si trouano in questa pianta foglie simili à quelle dell' Assenzo volgare, con le quali Dioscoride paragonò quelle del suo Assenzo Santonico? le mostri, se potrà chiunque si esercita in questa nobile professione herbaria, si che dunque per le cause descritte, questa pianta, non solo non è il Chamecipariso, ne Santolina, ne l' Hifsopo sopraccennato, mà ne meno il Santonico del detto Autore: il Mattioli sopra Dioscoride ^b figurò questa per l' Abrotano femina; benchè, tale non sia la pianta di che si tratta, come qui sotto si figura, e si descrive, niente-

a l. 4. v. 11.

pag. 136. v. 137

b l. 4. v. 11.

pag. 136.

c l. 1. v. 73.

d pag. 83. in

figlio cap. 134

e l. 1. v. 149.

cap. 100. v. 11.

Istoria.

f pag. 61. v. 11.

Istoria in 8.


g lib. 23. pag.

614. v. 11.

h l. 3. v. 16.

pag. 736.

fig. II



Linocamp femina uero di Dioscoride

nientedimeno per hauere foglie disposte alla lunga, e frà se diuise, la collo-
cò, meglio delli sudetti, frà le specie d'Abrotani femine, quali, come scrissi
nel Capitolo precedente, sono più tosto tante specie false, e molto diuerse
dalla sudetta, per non corrispondere nissuna di queste, ne al sapore, ne al
l'odore graue, ne alle fattezze, e qualità, che da Dioscoride s'attribuiscò-
no al suo Abrotano femina vero.

Hebbi molt'anni sono questa fruticosa pianta, come intesi, venuta
di Siria, e secondo altri di Persia, producendo dalla corona radicale molte
foglie lunghe vn'oncia, e meza incirca, strette, e nel contorno sseffe, e
sottilmente incise, l'vna da l'altra separate, massime quelle del cesso infe-
riore, quali considerate à parté, à parté, imitano, come dice Dioscoride,
con le incisure loro, quelle del suo Assenzo Serifio marino, che à suo luo-
go si deferiue, contuttociò, che le foglie di questo vero Abrotano femina
siano per il lungo disposte, & in altra forma, che non sono quelle del me-
desimo Serifio, sostentate da vn neruo nel di sotto poco rileuato, e nel di so-
pra folcato, colorite di verde biancheggiante, sembrano con questo colore
quelle dell'Assenzo nostrale, e disposte, come sono quelle della Stecade,
con foglie crespe, figurata, e descritta dal Clusio nel libro delle piante ra-
re, ⁱ che al riferire del Dalecampio nell'Istoria di Lione, ^k è il Succudo
d'Auicenna, di Micone, benché con errore, non sendo, al mio parere, il
Succudo, di questo Autore altra pianta, che il Simphito, ò vero Consolida
maggiore di Dioscoride, si rassomigliano anco di molto alle foglie di quel-
la pianta, che sotto nome d'Assenzo marino d'Egitto vien figurata, e de-
scritta dal Mattioli, ^l ne hanno minore proportioné con quell'altra pianta
che Gio: Bauino ^m nella sua Istoria, doppo la figura del suo Serifio, ouero
Assenzo d'Egitto secondo alcuni, propose con nome d'Origano con fac-
cia di corimbo, giudicandolo vna spetie d'Assenzo Serifio: piante, e l'vna,
e l'altra, ch'io stimo più tosto spetie d'Abrotano femina, che d'Assenzo,
come à suo luogo si mostra nel Capitolo, che segue.

Sorge trà queste foglie vn fusto rotondo grosso più d'vn quarto d'
oncia, & alto circa ad vn braccio, e mezzo, di scorza sottile, che bian-
cheggia come fanno li rami dell'Assenzo volgare, e piegato, facilmente si
frange, per essere nell'interno di sostanza spongosa, & arida, e mostrafi
pieno di midolla candida; porta le foglie ad vna ad vna, mà senza pic-
ciuolo, e trà sè egualmente disposte, trasmettendo dal piè di ciascheduna
vn ramo, che ne produce d'altri, tutti con foglie simili, e fassi la pianta
molto folta, ma però à proportioné minori.

Parte di questi rami terminano in vna folta ombrella di botoncini
lucidi, e dorati, di forma, e di colore molto simili à quelli del Elicriso di
Dioscoride, mà alquanto più grossi, e più scagliosi, e parimente circon-
dati

ⁱ Pag. 345. l. 3.
cap. 42.
^k Pag. 1200.
l. 10. cap. 68.

^l Pag. 726 del
Editione Ve-
neta 1568. l.
3. cap. 35.
^m Tom. 3. lib.
26. cap. 72.
pag. 183.

dati di fogliette, e nel mezzo ripieni, e coperti di stami dorati, quali poi caduti che sono, succede il seme sottile, lunghetto, crespo, e scaglioso; ma che non si matura in queste parti, onde per propagare la pianta moltiplicasi con rami della medesima meglio ancora, che col suo seme, quale conviene procurarlo di Siria, ò di Persia.

La di lei radice à proportion della pianta è sottile di colore cinericio, e di sostanza legnosa, vn poco ondeggiante, si dirama in molt' altre minori tutte feconde di numerose fibre, masticata dà sapore come di Cardo, prouoca lo sputo, e ferisce la lingua con calore mordace, sono le foglie al gusto di sapore amaro, acute, e d'odore graue, e spiaccuole, & aromatico, massime i fiori, e l'ombrella, non molto discosti, al mio credere, dal sapore, & odore della Canforata, pianta, che dal Trago con nome di Mille foglio nobile, e Stratiote vero, vien proposta, e dal Dodoneo nell'Istoria per Tanaceto minore sù figurata, e descritta.

Per la gran similitudine, che s'è motiuata trà i fiori di questa pianta, e dell'Elicriso di Dioscoride, coltiata in molti luoghi d'Italia, e stata da alcuni chiamata Elicriso Siriaco, da altri Persiano; mà che non sia specie di Elicriso, lo manifestano le di lui foglie, odore, e sapore, & altre note toccate da Dioscoride, nel discorso, che fa del suo Abrotano femina, così rapportato da Marcello Virgilio nella sua edizione Greco-latina *¶* oue dice *Abrotanum diuim generum frutex est, alterum femina, quod arborescit, albicantibus folijs, incisuris minimis, Seriphij Absynthij modo circa ramulos diuisis: Floribus plenum: comantibus in summo fulgore auri, veluti corymbis quibusdam, nascitur aestate odoratum cum grauitate aliqua, & in gustu amarum, crediturque Siculum tale esse.*

Qui però il Signor Dottore Pietro Mengoli huomo molto intendente, e mio interprete di lingua Greca, trà i due Testi Greco, e Latino, auuertisce à mio proposito alcune diuersità da non trasandarli. La prima si è, che la parola *στ. λιγχο* è aggiunto di tutta la pianta, non delle foglie sole, come espresse Marcello Virgilio, scriuendo Dioscoride *θαμνος: ἀνδροειδής: ἐπὶ λανγχο*, cioè *frutex arborescens subalbus*.

La seconda *περί τῶν ῥαμῶν πλήρης ἀνθῶν ἢ τῶν ἀκρῶν τῶν χορυμῶν: ὅς τις πρὸς τὸ δένδρον γινώσκουσιν*, che suona *circum ramos plenum flore, in summitate habens aliquid corymbosum simile in aureum vergens, aestate genitum*: il che concordando con la capelliera, ouero ombrella de i fiori, mostra, che questa, mà non la pianta nasce d'Estate.

Quanto à i luoghi natali di questa pianta, mi riferisce il M. R. P. Fra Valerio di S. Giuseppe Carmelitano Scalzo Missionario Apostolico di sua Religione nella Persia, & India, hauerne veduto in copia, ne' Campi di Babùonia, nell'Arabia felice, e ne' contorni di Niniue, detta hoggidi Musul,

n Pag. 476. l.
1. cap. 160.
o Pag. 37. l. 2.
pomp. de pres
ma cap. 17.

p Pag. 143. l.
3. cap. 16.

fig. III.



Abrotano femina di seconda
e terza specie

ful, nella Mesopotamia, e ne' Stati di Orfa, oue serue etiandio di pascua à Camelli.

Le facultà di questa pianta à bastanza sono state descritte nell' antecedente capitolo dell' Abrotano maschio, hauendo Dioscoride attribuito à queste due Piante virtù eguali; onde in mancanza di questa femina, che credo essere in Italia del tutto smarrita, si può vsare nelli antidoti contro Vermì, e nelle compositioni contro veneni il seme dell' Abrotano maschio, che nelle Speciarie vien comunemente chiamato seme Santo, e non per questi Abrotani altra pianta.

Abrotano femina, seconda Specie. Cap. 3.

Fig. 3



Inito il discorso di quella pianta, che stimo essere l' Abrotano femina di Dioscoride, parmi à proposito di conetterui ancora il confronto d' altre due, che giudico à quella con generi, benchè da altri vien creduto diuersamente. La prima dunque di queste, ch' io chiamo Abrotano femina, della seconda specie, per essere ella assai più si-

mile alla precedente, che quest' altra, che seguita, e quella stessa di cui discorre il Mattioli nell' Epistole medicinali^a chiamandola Assenzo Serifio che parimente descrive, e figura egli stesso in molte edizioni, de' suoi Commentarij sopra Dioscoride, massime nell' vltima,^b oue la chiama Assenzo Serifio marino dell' Egitto: così il Dodoneo, il Tabernamontano, & il Gerardo figurandola nelle loro Istorie,^c la nominarono Assenzo dell' Egitto: il Lobellio ne gl' Auerfarij,^d nelle Imagini,^e e nelle obseruationi,^f non solo chiamolla Assenzo dell' Egitto, mà vi aggiunse con foglie di Politrice. Gio: Bauino,^g portando come i sopradetti, la figura del Mattioli, v' inserisce Assenzo dell' Egitto secondo alcuni, di cui ne fa mentione ancora Gasparo di lui fratello nella Pinace,^h con nome dell' Assenzo Santonico dell' Egitto, il sudetto Gio: Bauino alla figura mentionata aggiunge l' ombrella, ò corimbi d' vn' altra simil pianta, ch' è la seconda di quelle, che chiamo con generi dell' Abrotano femina di Dioscoride.

Quanto alla prima, ch' ella sia vna specie d' Abrotano femina di Dioscoride, stimerò hauerne gran parte dell' intento, poi ch' hauerò prouato non essere ella altrimenti Assenzo, il che più che chiaro si manifesta, dal non hauere l' Assenzo foglie disposte à modo di Politrice, come hà questa Pianta marina d' Egitto, che però Claudio Roccardo fondato nel giuditio d' ingegni nella professione Botanica peritissimi diede materia al sudetto

B

Gio:

- a Lib. 5. pag. 585. impressione di Louo.
- b 1504. e quella di Progo in foglio del 1505.
- c pag. 355. l. 5.
- b pag. 716. l. 3. cap. 55.
- c pag. 15. nel primo, pag. 3. del secondo, pag. 1103. del terzo.
- d pag. 337.
- e 756.
- f pag. 437.
- g Tom. 3. pag. 153. e 153. dell' Istoria l. 26. cap. 72.
- h pag. 139. l. 4. sed. 2.

Gio: Bauino di scriuere nel luogo citato. *Claudio Roccardo Auctore Absinthium hoc, quod ex Aegypto translatum esse volunt, Polytrici folio ex Absinthiorum numero reijciendum, esse doctissimorum herbariorum maior pars censet.*

Se dunque, come vogliono si grand'huomini, questa pianta Egipcia, si deue leuare dal numero delli Assenzi, e se per il contrario si vede con foglie presso la radice simile à quelle dell'Abrotano femina di Dioscoride, anzi se da essa si raccoglie seme di virtù vniformi al seme Santo: in qual genere di piante dourà collocarsi, se non ne gli Abrotani? e collocataui, mentre più si rassomiglia alla femina, che al maschio, con qual nome dourà chiamarsi meglio, che d'Abrotano femina? il che toccò ancora il Mattioli, quantunque non s'arischiasse d'affermarlo, per non hauere hauuto notizia del precedente Abrotano femina di Dioscoride, si che parlando di questa pianta nell'vltima con figure grandi, e nell'altre ancora,

*Il Nel L. 2. cap.
25. pag. 726.*

così lasciò scritto, *i vn'altra pianta d'Assenzo marino portata d'Egitto, di cui è qui parimente la figura, hebbi pur'io dal Magnifico Sig. Giacomo Antonio Corruso, dalla quale se bene vogliono alcuni, che si raccoglie il seme Santo, io nondimeno non ne hò chiarezza veruna; alcuni vogliono, che sia l'Abrotano maschio, mà meglio sarebbe stato à dirla femina, il che io non affermo.*

I quali motiui mi paiono bastanti à fare conoscere, che questa pianta Egipcia sia vna specie del vero Abrotano femina de gl'Antichi, e

non d'Assenzo, la di cui imagine da me rappresentata è la stessa del Mattioli, mà però dal medemo posta sotto nome d'Assenzo

Scrifio marino
d'Egitto.



Abro-

Abrotano femina, terza specie.

Cap. 4.



'Altra pianta, che motiuai con genere all'Abrotano femina di Dioscoride si è quella, di cui ne figura alcune sommità Gio: Bauino, e chiamandola Origano cō faccia di corimbo, e descriuendola in questa forma.

2 Tom. 3 pag.
153. l. 16. cap.
74.

Tragorigani nomine misit plantæ cuiusdam cacumina D. Rauwolfius, quæ non nihil similia Maro Syriaco, sive Origano onici Martioli, candida admodum, parua, hirsuta; quorum capitula squamis oblongis, in modum capitulorum Thymi Cretici dispositis, compacta, odore graui, sapore amaro, feruido, ad saporem seminis contra accedente, adeo, ut de Seriphio aliquo suspicionem possit injicere. Eius figuram iunximus cum Absynchio Egyptio quorundam. Sin qui il Bauino con la sua tolita eleganza.

Mà perche questa pianta espressa nella figura portata dal sudetto Bauino, produce le foglie più tosto alate nella maniera de Politrice, e de gl'Abrotani femine sopradetti, che non à due, à due alternatamente per interualli disposte, come ne gl'Origani. Perciò pare, che meglio trà gl'Abrotani femine, come terza specie, che trà gl'Origani debba connumerarsi.

Ne solo la figura delle foglie ciò persuade, mà più le ombrelle corimbifere simili à quelle dell'Abrotano femina vero, à suo luogo figurato, e descritto. Mà per la gran similitudine del di lei odore, e sapore amaro, come ne gl'Abrotani, e non acuto senza amarezza, come ne gl'Origani.

Trouarà chi legge questa pianta nella Figura terza, in due imagini nella prima le foglie, & nel secondo li fiori disposti in forma d'ombrelle ambi leuate dall'Istoria sopranominata di Gio: Bauino, descritte sotto nome d'Origano con faccie di Corimbo.



Acetosa tuberosa, serpeggiante, con macchie sanguigne di Ragusi. Cap. 5.

Fig. 4



Vrìosissimo inuestigator de semplici à nostri tempi, fù il Sig. Duca Gaston d' Orleans, il quale si come in diuerse parti del mondo, mantenne molti Sempliciti, così in Italia mandò il Signor Alessandro Balam Gentilhuomo Inglese, per inuestigare quini le piante da trasportare, e seminare ne suoi Giardini Reali. Restato il Signor

Alessandro quasi herede della stessa curiosità, dopo la morte del Duca si portò ad habitare nella Città di Tanger, oue di presente si occupa nell' osseruazioni delle piante, mentre ch' egli dimorò in queste parti, contrassì con esso lui amicitia, e seruitù, con occasione che veniuà à fauorire la casa mia, trattenendosi tutte le volte che fù di passaggio per questa Città, si che hebbi campo di riportarne molti semi, e piante peregrine, quali hoggi ancora per fauore del Cielo si conseruano in questo Horto publico, e nel mio Giardino ancora, insieme con diuerse altre, che esso Signore mi fauorì del detto luogo di Tanger, come d' alcune si potrà vedere in questa mia Opera, sendo anco stato regalo suo il seme della pianta, che descriuo nella maniera seguente.

Trà le molte piante, che da gli antichi, e moderni Sempliciti non sono sin' hora state espòste alla cognitione publica per mezo di descrittioni, ò figure, quì mi si rappresentano varie specie d' acetose peregrine, che per quanto io penso non sono per anco state osseruate da alcuno, due delle quali io quì ne propongo, tutte diuerse da quelle de gli altri, vna è di radice tuberosa, e l' altra è senza tuberì, e di foglie dentate.

a Pag. 155.

b Pag. 191.

È perche il Lobelio nelle osseruazioni^a propone vna pianta di simil nome, e genere, figurata anco nelle imagini^b perciò auanti, che passi alla descrizione della prima delle mie, sono da osseruarsi le differenze, che sono trà questa, e la sudetta del Lobelio; sendo che la mia serpeggia, e si moltiplica frà terra, mandando fuori altre piante nel contorno, & hà le foglie sanguigue, il fiore rosso, e porta vn solo tubero longo, e grosso per ciascuna radice, simili à quelle della Peonia femina, ò del Asphodelo maggiore, oue quella del detto Autore manca di queste note, sendo ella tutta simile all' Acetosa hortenfe, eccetto che ne' Tuberì, che sono assai più piccolì, che nella mia, e taluolta questa del Lobellio ne porta due, e tre per radice, vniti insieme, e in grossezza, simili à quelli della volgare Filipendula, ouero

Enan-





Enanthe de gli Antichi, secondo l' opinione del Fuchſio, come s' offerua nell' ſtoria. ^c

Similmente Fabio Colonna nel Libro delle Piante men cognite, ^d fa mentione di quattro ſpecie d' acetofe, due delle quali ſono di radice parimente tuberofa, ma ſendo queſte, come nota chi le deſcriue, piante di foglie rotonde, chiaro apparifce, che niuna di queſte può paragonarſi con la mia: il che hò giudicato bene auuertire, perche forſi non mancheranno tali, che ſi datanno à credere, che queſte, e quella ſiano vna ſteſſa coſa.

Spunta dunque queſta pianta da terra con vn groſſo germoglio di foglie, d' aſpetto ſimili à quelle dell' Acetofe volgari, ecetto che ſono vn poco più grandi, allungandoſi più d' vn deto, & allargandoſi alcuna volta quaſi due per ttauero, con gambi lunghi, ſolcati di dentro, e rileuati di fuori, per via d' vna coſta, che iui ondeggia, larghi nel di ſotto, e quiui di color carneo, vniti inſieme, & abbracciandoſi l' vn l' altro, nel modo, che fanno le piante ſerulacee, come la Tapſia, l' Aneto, e il Finocchio, hanno in oltre queſte foglie, vna conditione particolare da non traſandarſi: ed è che quando ſpuntano dalla ſuperficie della terra, ſi vedono à luogo à luogo coſperſe di macchie, e punti rotondi, di color di fangue, che poi ſi muta in gialliccio, & à poco à poco ſuanifce, laſciando in luogo di quelle macchie, altrettanti ſorami rotondi, che paſſano da vna parte all' altra, non molto grandi, ma però manifeſti.

Nel mezzo di queſto germoglio foglioſo, creſce vn fuſto groſſo più d' vna penna da ſcriuere, alto circa à due cubiti, e queſto dal piede ſin' al mezzo è totalmente roſſo, e nel reſtante quaſi tutto verde, di qualità fleſſibile, piegandoſi ſenza ſpezzarſi, e rotto che ſia, appatiſce cauo da vn nodo all' altro, e di color argentino, veſtitofi ne' detti nodi di foglie, ma che dalla metà in giù, hanno il gambo più breue, che le deſcritte, e di là in ſù, ſtanno ſenza gambo alcuno, con due punte ſole, che nella baſe loro dipendono, quaſi abbracciando il caule, come s' offerua nella maggiore parte delle altre Oxalidi, ò ſiano Acetofe, e che chiaro ſi vede nella ſua figura.

Trà queſte foglie, & il caule nella parte ſuperiore naſcono alcuni ramoſcelli ſpiccati, di color cremefino, pieni di botoncini verdi, che di Maggio s' aprono in fioretti roſſi, e muſcoſi, formati di ſottiliſſimi filamenti, e fogliette, difficili per la loro picciolezza ad' eſſere rauifati di che precisa forma ſi ſiano: caduti queſti fiori, laſciano ſul gambo, vn' inuoglio di forma triquetra alato di color roſſigno, al modo delle altre acetofe, nel quale ſtā rinchiuſo vn ſeme lucido, nero, triangolare, mà che partecipa del lungo.

La radice nella corona ſi dirama in varie braccia, rotonde, non molto groſſe,

c. Pag. 162. d.
d. 11. in fol.
d. Pag. 211.
cap. 47.

to grosse, & in alcune parti ineguali: delle quali le più superficiali serpeggiando tramandano fogliosi germogli, che con noue radici s'abarbicano, e si propagano all'intorno, le altre profondandosi s'ingrossano in vn tubero, della forma, e grandezza, come già diffi, di quelle dell'Asphodelo, ò sia l'Hastula regia volgare, e della Peonia femina, mà vn poco minori, quale piegato si rompe facilmente, mostrando nell'interno vna midolla bianca tutta carnosà, dopo il quale finisce la radice in vna lunga coda, come nell'Imagie s'offerua, contornata di molte fibre sottili: sono queste radici coperte di due scorze, vna tenue di color di Tabacco, ed anco più scuro, quale facilmente si leua, l'altra di color d'oro, e questa contiene vna midolla legnosa, nel centro della quale vi si troua qualche poco di materia sfilacciofa.

Questi Tuberi esposti all'aere, cangiono il primo loro colore in rosso sanguigno, mangiati freschi, rendono materia succosa, e saporita come la Mandola fresca, lasciando nel fine, sapore astringente con siccità: le foglie sono acide assai: è pianta perenne.

Acetosa dentata di Tanger. Cap. 6.

Fig. 5



On è meno segnalata questa Acetosa per le foglie dentate, che l'antecedente per le sue radici tuberose; onde stimo sia per essere gradita, e la figura, e la descrizione, che ne soggiungo.

Esce di terra con vn cespo di foglie in questo genere strauaganti; per essere inegualmente dentate, ondeggianti, crasse, & alpre al tatto; mà di sostanza asciutta, e frà di loro variamente piegate, & inuolte, parte delle quali vengono trascorse di lince sottili, e sanguigne, con due incisure grandi, opposte nel fondo, che formano, come due ali parimente dentate, e quali del tutto separate dal resto delle foglie, quali perciò tengono molta somiglianza, in quanto alla forma, con quelle dell'Aro volgare, ò Dragoncello minore de gli antichi, se non che questo non hà incisura alcuna: sono le dette foglie sostenute da gambi assai lunghi, solcati di dentro, e ondeggianti di fuori.

Dal centro di questa massa di foglie spunta vn fusto, e taluolta più, quale mentre è tenero, si stende sopra la terra, e poi si solleua, crescendo all'altezza d'vn cubito, ondeggiante, rotondo, e grosso quanto vna penna, che viene trascorso per il lungo da certa costarella rileuata, più sensibile al tatto, che all'occhio, dal mezzo in giù è colorito di rosso, che bian-

cheg-

fig V



Acetosa denticata perpetua di Tanger

cheggia, e nel rimanente di verde chiaro, & herbaceo, ma duro, e che non può rompersi, che non stridi: la di lui scorza si leua facilmente dalla parte interna, che è dura, ma sfilacciofa.

Sono in questo caule assai frequenti i nodi, le foglie de quali, quanto più in alto nascono, tanto più breue hanno il piedetto; ma nissuna però ne resta affatto priua, come nell'antecedente, ed in molte altre Acetose ancora; ogni nodo hà vna sottile cartilagine, che locirconda, abbracciando tutto il caule, & insieme il piedetto delle foglie, trà le quali, souente spuntano alcuni ramicelli con foglie à proportione minori delle prime, e nel fondo molto meno frastagliate di quelle di sotto, sì che le loro alette vengono, ò poco, ò nulla spicate, crescendo questi poco meno del caule principale, così anco come essi terminano in vna spica, ò più tosto racemo diritto pieno di botoncini rotondi, che nel verde rosseggiano, senza ordine disposti, nascendo ora solitarij, ora à due, ò tre, e taluolta quattro in vno stesso luogo, mà con piedetti così sottili al caule annessi, che non potendo sostenerli, è forza, che pieghino all'ingiù, e che pendino, & ad ogni leggiero soffio tremolando si mouino.

S'aprono poi detti botoncini in tre fogliette rosseggianti, e nel mezzo ad esse ne sono altre fogliette gialle, tanto sottili, che non si può prenderne la forma, e trà queste vi sono molti stami pure gialli con apici simili, mà vn poco più scuri; nel cadere de quali, rimangono appese à loro sottili piedetti altrettante vessiche triangolari, come si vde nell' altre Acetose: in queste si contiene vn seme longhetto, pure triangolare, di colore bianco, che gialleggia.

Non è la di lei radice più grossa del caule, ondeggiante, liscia, rotonda, di sostanza alquanto succosa, gialletta tanto di dentro, come di fuori, simile à quella della Rubia de' tintori, ò sia l'Erittodano de gli Antichi: tramanda questa da ogni parte altre minori radici, tutte copiose di fibre. Il di lei sapore è molto amaro, qualità non più da me offeruata nell' altre piante congeneri, e spita odore simile à quello della faua fresca, il sapore delle foglie è acido con molta astringenza, e siccità: questa pianta si conserua più anni, e fiorisce, e matura il seme anco d' Inuerno: nasce in abbondanza nella Mauritania Tingitana, d' onde hebbi i primi semi trasmessimi sino del 1664. dal già mentioned Sig. Alessandro Balam.

L' Anno 1673, sendo morta la pianta ch'era campata più di tre anni, feci cauare di terta la sua radice, che pure riseruo, per essere stata ritrouata intiera, & assai maggiore di quello che s' offeruò da vna pianta nouella, cioè grossa nella corona quanto il dco pollice, e lunga più d' vn palmo, e diuersamente ramosa.

Aladiul, ouero Asdalbul, Erba Indiana.

Cap. 7.



Ladiul Herba, habet folia lata, & oblonga, flores albos unico ramo insidentes, in quo sunt aliqua foliuncula cordis figura, interque nascuntur flosculi, qui habent odorem quasi similem pomo maturo, & includuntur similis foliorum, in quibus apparet caput Vacca cum suis cornibus, unde Gentiles, qui Vaccas adorant, pulmentum tali capite faciunt.

Il. 4. cap. 9.
Pag. 366.

Questa Pianta viene descritta dal P. Fra Vincenzo Maria di Santa Caterina da Siena Procuratore Generale de Carmelitani Scalzi, & hora dignissimo Priore del Conuento di Bologna, nel Viaggio dell' Indie Orientali, sotto nome d'Alad, con la seguente narratione.

L'Alad è vn' Erba di foglie lunghe, larghe, alquanto sode, & aspre. Produce li fiori bianchi, e piccioli, in vn sol ramo raccolti, sopra certe fogliette verdi, carnose, accompagnate d'odore simile à quello de nostri pomi maturi. Quello hanno di mirabile è, che tagliati per trauerso dimostrano formatissimo il capo d'una Vacca, con li Corni, occhi, & altre parti, per il che li Gentili l'hanno in veneratione, ne mai si vagliono della gambetta del medesimo fiore, che è giallo, e per altro serue di Zaffarano, ottimo per condire li cibi, per non offendere la deuotione, e rispetto, che portano à quell'Animale.

L'Image di quest'Erba è nella figura 7. dell'Archam :

Conferuo nel mio Museo molti Disegni di piante venute dall' Indie Orientali, & iui ritratte dal non mai à bastanza lodato M. R. P. Fra Matteo di S. Gioseppe Carmelitano Scalzo, da Reggio di Lombardia hoggidì habitante nella Prouincia di Malabar, parte delle quali si rapresentano in figure picciole in questa Istoria, tanto più per hauerne di queste qualche poca di descrittione, & ancora tanto lume, che mi basta à poterli formare sopra qualche discorso delle quali ne fui fauorito dalla somma cortesia del M. R. P. Fra Michele di S. Eliseo Carmelitano Scalzo, Aromatario del suo Monasterio nella Città di Milano, e nella professione Bottanica molto versato, con la stessa lettera scrittagli dal medemo Padre Fra Matteo di tal tenore.

Mando alla vostra carità alcune figure di Semplici di questi Paesi, cauati dalle piante viue, al meglio hò potuto, come vostra carità mi richiede, mi spiace però, che quando col Padre Michele Angelo era uare alle Missioni, non venisse in queste parti, che haureste veduto de bellissimi, e curiosi semplici, particolarmente

mente nell' Isola di Zeilam, nella costa, ò riuiera di Chirmandel, ne Monti di Bisna confinanti al Gran Mogor, e nell' Isola di Goa, e di Calecut; e perche molte d'esse sono state viste, & offeruate dal detto Padre Fra Matteo in vn famoso Giardino posto in Oriente nella Città di Balsora doppo la relatione delle di lui parole seguenti, scriuerò ancora per maggior sodisfazione del Lettore tutti li nomi di dette piante.

Vidi, & obseruavi multas plantas (così scriue il sudetto Padre) in viridario cuiusdam magni viri nomine Saladinus Artasa in Vrbe Balsore, qui delectabatur simplicibus curiosis, & extraordinarijs calebat etiam medicinam, & armis excellebat, valde per humane mihi ostendit hoc viridarium, & magna cum letitia mecum egit, videns quod ego quoque delectarer simplicibus, ab eo ex illis petij, sed respondit quodcumque aliud petijsem, se mihi libenter concessurum, sed id neque mihi, neque cuicunque alij concessurum. Petij veniam illos delineandi, & mittendi in Europam, quam mihi libenter concessit, dicens se mihi illa negare, qua à suo Patre hæres habuerat, & ex varijs longinquis terra partibus acceperat, & ut possem delineare quascumque partes plantarum, cum radices non possent videri, mihi ostendit librum in quo simplicia illius viridarij erant delineata, & ex illo figuras integras extraxi.

A		Bare Riul.	Arbor.	F	
		Basila.	Herba.		
Arecha.	Arbor.	Bazaget, seu Alarled.		Ficus Indica.	Herba.
Atta.	Arbor.			Fulfel.	Arbor.
Ardabar.	Herba.	C		G	
Aladiul.	Arbor.				
Alhu.	Arbor.	Carda.	Arbor.		
Anana.	Arbor.	Carambola.	Arbor.	Giambus.	Arbor.
Arundo lusit.	Arbor.	Cardilla.	Arbor.	Giacha.	Arbor.
Archan.	Arbor.	Chaggiu.	Arbor.	Gingiber.	Herba.
Arbor tristis.		Cinamomum.	Arbor.		
		Cascunda.	Frutex.	H	
		Cetorzon.	Frutex.		
		Criata.	Herba.	Hada, seu arbor Iuda.	
		D		I	
Bachion.	Arbor.				
Belimbi.	Arbor.				
Biagha.	Arbor.				
Bulila.	Pulbus.	Datura Ind.	Herba.	Ignis Cali.	Herba.
Bakili.	Arbor.	Durion.	Arbor.		
Balinda.	Arbor.			K	
Buebenda.	Herba.			Karididi.	Herba.
		C		Kana-	

<i>Kanadi.</i>	<i>Herba.</i>	P	<i>Stipsdanti.</i>	<i>Arbor.</i>	
	L	<i>Paguiera.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Suphucaia.</i>	<i>Arbor.</i>
<i>Linda.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Papaia.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Siabon.</i>	<i>Arbor.</i>
<i>Lamba.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Palma Ind.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Samba.</i>	<i>Arbor.</i>
<i>Londal.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Paperambul.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Surandi.</i>	<i>Arbor.</i>
<i>Lichia.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Pinxui.</i>	<i>Arbor.</i>	T	
<i>Linbra.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Parcol.</i>	<i>Arbor.</i>		
<i>Laudelsul.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Pinp. l.</i>	<i>Herba.</i>	<i>Toppi.</i>	<i>Arbor.</i>
		<i>Phyllonmas.</i>	<i>Herba.</i>	V	
	M	<i>Phyllonfamina.</i>	<i>Frutex.</i>		
		R		<i>Ulba.</i>	<i>Herba.</i>
<i>Masiera.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Rambora.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Vendi.</i>	<i>Arbor.</i>
<i>Munda Iabo.</i>	<i>Herba.</i>	<i>Rarondera.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Vatcl.</i>	<i>Herba.</i>
<i>Marbeth.</i>	<i>Herba.</i>	<i>Rodali.</i>	<i>Herba.</i>	Z	
<i>Manguflan.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Ramba.</i>	<i>Arbor.</i>		
<i>Macongo.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Roserage.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Zambal.</i>	<i>Frutex.</i>
	N	<i>Ratdegat.</i>	<i>Arbor.</i>	<i>Zalanda.</i>	<i>Herba.</i>
		<i>Rota, seu Canna Ind.</i>		<i>Zasar.</i>	<i>Balbus.</i>
<i>Nidi Auium Indie.</i>		<i>Romphal.</i>	<i>Herba.</i>	<i>Zambul.</i>	<i>Arbor.</i>
	O	S			
<i>Oxalis.</i>	<i>Herba.</i>	<i>Sabranta.</i>	<i>Herba.</i>		
		<i>Serpentariae spe.</i>	<i>Herba.</i>		



Alhù Pianta Orientale. Cap. 8.



Libu Arbor grandis est, habet folia magna, lata, plana, & mollia, odore siluestri, flores producit coloris purpurei, fructus fert quasi ut ficus, sed desuper acutus, colore rubro, sapore acido, semen inclusum est valde amarum, fructus habet vim corroborandi, refrigerandique, folijs vrinuntur Indi ad inflammationes, & tota planta cum ligno est multum medicinalis.

L' Imagine di questa Pianta è nella figura settima dell' Archam.

Aranzo detto la Bizzaria. Cap. 9.



Rà le molte, e singolari delizie, delle quali restò priuilegiato à gara dalla natura, e dell' arte il suolo Toscano, & in particolare la Città, e Campagna di Firenze, ve ne sono molte per obedire alla verità, che si possono dire proprie di quel Clima; nel numero di queste puole hauere luogo vna sorte d' Agrume monstroso nouamente venuto alla luce à caufa d' vn Ine-

sto fatto con varie specie d' Agrumi gl' anni passati, che per la varietà, e differenza de gl' altri con adeguato nome viene chiamato Aranzo della Bizzaria, il quale riconosce la sua nobile origine di vna deliziosa Villa, poco distante dalla Città del Sig. Canonico Panciatichi Caualliero di somma bontà, ed Eruditione, e dottrina singolare dottato.

Produce questa Pianta con tre differenze le sue foglie, quali sono d' Arancio liscie, e di grandezza come quelle de gl' Aranci ordinarij, altre più picciole, e cresphe, mà di forma somiglianti pure all' Aranzo, & altre del tutto simili à quelle del Cedrato. E' cosa non meno prodigiosa, e degna d' amirazione, che dalla medesima pianta, e da vn' istesso ramoscello hora spinoso, hora senza spine naschino due sorti di fiori, alcuni bianchi porporreggianti, come quelli del Cedrato, mà alquanto più odorosi, altri candidi, e della medesima fragranza di quelli dell' Arancio. Fù prodiga non meno la natura nel produrre li pomi, di quello, che sia stata nelle foglie, e nei fiori; perche da vn' istesso ramo nascono tre sorti di Pomi, vno sarà tutto Cedrato, vn' altro tutto Arancio, l' altro ch' è più marauiglioso meschiato d' Arancio, e Cedrato, & è così distinto, che ne dimostra la forma, che vi si riconosce à parte à parte la sua differenza, e di colore, e di sapore, di tal ma-

niera, che la parte del Cedrato viene con il suo ordine diuisa, e l'vna, e l'altra in varie forme, è separata da quella dell' Arancio, e da quella del Cedrato.

b. l. 1. cap. 19.
pag. 163.

Vi è però nelli Cedrati schietti qualche differenza da quellà de gl' altri Limoni Cedrati, che descrive il Padre Ferrari nel Hesperidè, posciache quelli che produce la Bizzaria hanno in se alquanto più dell' amaro, come che nascono da pianta, che hà gran simpatia, e somiglianza con l' Arancio, & il Limone cedrato, e per l'odore, e per lo sapore al gusto più grato.

Vi è da offeruare ancora, che la Pianta della Bizzaria produce Cedrati schietti, e nella foglia tutto Arancio, & ancora nel frutto Arancio, schietto, e nella foglia tutto Cedrato, con qualche differenza però, che il Pomo, quale fa nel ramoscello tutto Cedrato è più delicato, e più dolce di quello, che fa nel ramo tutto Arancio, quale è del sudetto di sapore più ingrato, & alquanto amaro, mà non di tal sorte, che ancora questo non si possi gustare.

Non teme questo Arboscello, come molt' altri Agrumi, tanto il rigore dell' Inuerno, e la ragione crederei, che fosse, perche partecipa come s'è detto della natura dell' Arancio, essendo Cedro, e Limone, come si dice, *Virtus vnita fortior*, ouero perche hà la scorza più dura, e tenace de gl' altri Agrumi, e per essere meno succosa, & humida, e perciò si difende dal freddo, più d' ogni altra sorte di questi.

c. l. 1. cap. 8.
pag. 40.

Hebbi questo anni sono dall' Eccellentiss. Sig. Filippo Donini sopraintendente delli Giardini del Sereniss. Gran Duca di Toscana, il quale poiche hebbi inteso, che l' Eccellentiss. Pietro Nati doueua rappresentarlo nel Libro, che destina alla luce, mi contenai restringerlo in queste poche righe, rimettendo li curiosi à più dislessa, e particolare relatione, che ne darà detto Signor Dottore, parendomi solo cosa strana, che appresso gl' Antichi, nel scriuere tanto diligenti, e sagaci, fossero tutti gl' Agrumi compresi sotto vn solo nome, se non volessimo dire, che di quel tempo non se ne trouaua che d' vna specie, come pare accennasse il sudetto Padre Ferrari, dicendo nella sua Hesperide, e *Imò vnum olim genus arboris fuisse leui, confusaq; notitia, non satis antiquitatis exploratum. Manifesto esse inditio commune mali Medice nomen antiquitus usurpatum: & ignotam vetustiori Græcia, Latioque Ciriij, Limonis, & Aurantij appellationem: e più basso, Illa etiam coniectura persuadet, malum Citreum, & Aurantium fuisse veteri seculo indistincta, quod eodem utrumque Arabes nomine Narange Raphaelengio interprete appellant. Sed quanquam e Cardani sententia vnico genere, ac nomine complexa est medicas arbores rudis antiquitas: attamen callidior posteritas species complures, & obseruatione peruidit, & cultione inuenit. Quocirca sunt qui malum citreum naturæ vetustissimum inuen-*
tum,





Arbore doue pendono
Nidi d' Uccelli Ind'

fig VI

tum, Limonium verò, & Aurantium, culericis artis recentius imitamentum esse probabiliter arbitrentur. Vt propterea solum veteres norint mali aurei, siue Medici, siue citrei nomen: & altroue, ⁴prisca etas aurantium videtur à Citreo non secreuisse, communiq; aurei mali, ac punici vocabulo appellasse.

d. L. B. 4. cap. 1.
p. 6. 17.

Arbore Indiano, oue pendono Nidi d' Vccelli.

Cap. 10.

Fig. 6.



Vi congiunto v' è la figura d' vn' Arbore Indiano, contenuta nel Catralogo Alfabetico seguente, qual Arbore non hà appresso di me discretione, ne nome alcuno, per esser questo (come sopra diſſi) scritto in lingua Arabica, da me non intesa, ne qui in questa Città uolto conosciuta, per hora seruirà solamente ciò per mostrare, che certi V-

ccelli Pardali chiamati in quella reggione appendono i loro nidi, nelle cime di quei Arbori, accioche li Serpenti, & altri Animali non mangiono le oua, & i loro Polli, e così figuro, e porgo al Lettore l' Image propria, ritrouata ne' Libri manuscritti del Padre Matteo. Hò ancora nel Libro picciolo sopra nominato qualche memoria di questi Nidi figurati, e descritti con le seguenti parole. *Artificioſissimi Nidi ad arbores pensiles, & ad recta Domorum sunt, quasi tenuissimo serico texti, qui ex Coccorum filis fabricantur, mas extra est, femina vero intus, operante roſtro ex vna parte est locus securus, & fortius textus pro ouis, ex alia parte tuba longitudine duorum, vel trium palmorum, tam tenuis vt per luceat, ex qua inferiori parte solum auibus patet ad nidum aditus, desinens in filum tenue, ne aqua de super commoretur, altera camera intus est, vt masculus locum habeat, dum femina fouet oua, & tam bene sunt efformati, vt ex eis Rustici sumant aliquos magnos ad caput cooperiendam. In Insula Chirmandel, quia ibi non sunt ſilua, ſua materia apta pro nidificadō, aues in petris dant octo, vel decem oua, roſtro illa confringunt minutim, componentes cortices cum substantia oui, qua parum ad Solem exicata conſtruunt fortissimos nidos, & camerule pro vno quoque aue fiunt.*

Di questi Vccelli, il P. Fra Vincenzo Maria di Santa Caterina da Siena, nel suo Viaggio all' Indie Orientali ne parla in questa forma.

Nel Pardale d' Arbore, non ritrouo cosa particolare, solo l' artificio col quale forma il nido, è degno di memoria. La sua grandezza, forma, e figura, è totalmente simile à quella de' nostri Passeri, le piume differenti, similissime à quelle de'



le de' nostri Rosignoli, e senza canto. Perche li Serpenti sono anidissimi de' suoi oui, ò sij per la similitudine, che tengono con li loro proprij, ò per altra qualità occulta, che in essi deuono trouare singolare, la natura gli diede vn' industria tanto mirabile per assicurarli con la forma del nido, che la capacità dell' huomo à pena giungere potrebbe ad imitarlo. Con fili di Cairo (che è la Canepa dell' India, tirata dalle prime cortecce del Coccho, frutto della Palma) tesse vn' artificiosissima orditura, come di vn sacco, longo circa vn braccio, e mezzo, nella parte suprema acuminato, che per vna sol cordicella sottilissima si appende all' estremità de' rami delle piante, nell' inferiore aperto, quanto basta per darli volando l' ingresso. Tirati, che hà li primi fili, congiunti con quello che li sostiene, al quale sta appesa tutta la fabrica, gli ordina di sotto nel circolo, che gli deuue seruire di porta: poi appoggiandosi la femina à questo, con il peso li stende, e lauorando pur di dentro, & il maschio di fuori, con il becco si vanno gratiosamente porgendo gli altri fili, per attrauerarli con quelli, che già sono stesi per longo, come se volessero tessere vna tela incrociando, torcendo, tagliando, & aggroppando doue fa di bisogno, con tanta sicurtà, e forza, che vna mano industriosa pare, che non possisfare d'auantaggio. Giunti con la tessitura al mezzo del sacco, lo dilatano in certe borse nelli lati,oue formano vno due, e più luoghi per riporre li oui, e li figliuolini, poi ritornando sul dritto primiero, seguivano fino al fine con terminare in piramide la loro casa, tanto bene coperta, che resta sicurissima dall'acque. Taluolta occorre, che molti s' accoppiano per la medesima fabrica, desiderosi di cohabitare, non però mai si confondano, formando nella parte di sotto diuerse aperture con le vie separate, acciò ogn' vno habbi l'ingresso distinto alle proprie cellette, senza occasione di rissa, ò d'impedirsi l' vn l' altro. Questa tessitura suol essere tanto forte, e ben concatenata, che molti Pulias (lauoratori di terra) se ne vagliano per coprirsi il capo, riparandosi vguualmente bene dal sole, e dalla pioggia; altri se ne seruono per sporticelle, e sono tanto dircuoli, che se bene si rompono in qualche parte, non per questo si sciolgono, ma per disfarle del tutto, è necessario troncare li fili in minutissime parti. Nell' Isola di Caromandel, doue manca il Cairo, con nuoua, ed altrettanto curiosa inuentione suppliscono al difetto, e prouedono al loro bisogno. Fatti che hà la femina circa vna dozna d' oui sopra le pietre in qualche luogo incauato, il maschio li spezza trizandoli minutissimamente con il becco, poi aggiugnendoui terra, impasta quella materia, formando vna massa tanto dura, e soda, che con quella puole commodamente fabricarsi l'habitatione sicura sopra qualche balzo, o sasso eminente, in luogo inaccessibile, cuoprendola sopra, e sotto, con lasciare vna sol apertura nel lato destro, come sogliono fare le Api per il miele seluaggio.

Di questi Nidi Ofsei ne conferuo alcuni fragmenti nel mio Museo, quali mi sono stati recati dall' Eccellentiss. Sig. Gio: Battista Caponi Dottore di Filosofia, e Medicina, Lettore Publico, & Ostensore de' Simplic

fig VII



plici nel Studio di questa Città, de' quali à suo luogo se ne discorerà col portare di questi la loro propria Imagine.

Archam Arbor. Cap. 11.

Fig. 7.



Vitis Arboris radix, mater Dei dicitur. Folia habet tripartita, solida, ut mirus, flos est albus, e cuius medio oritur fructus squamatus figuram Piscis habens, qui in puluerem reductus, & cum aqua bibitus, est optimum remedium pro febribus.

Ardabar Pianta Orientale, Spetie d'Aro, così chiamata in lingua Arabica. Cap. 12.



Se herba (dice detto Padre) quæ facit radicem similem Aro nostro, cum aliquibus paruis radicibus, ut in figura obseruatur, ex hac nascitur virga aculeis viridibus circumdata, quæ extollitur ad se palmos in vertice gignit pyramidem, ex baccis viridibus compositam, ad similitudinem cupressis, quæ dum sunt mature rubescunt, cum palla in medio: folia sunt duo, & à radice, unde ha-

bent originem, aqualiter extolluntur, vnum in aliud insitum, ex quorum medio exit virga, vel caulis habens folia ad formam semicirculi, coloris qui in viridi rubescit, nigris naculis aspersa, & sunt pulcherima visu, fractus, & radix sunt calidissimi, quibus Indi vtuntur contra morbos frigidos.

L' Imagine di questa Pianta Indiana si troua nella Figura 74. della Virga Aurea di Virginia.

Questo Ardabar non è altro ch'vna spetie d'Aro, che porta foglie semicircolari, e fusto come nella propria Imagine s' offerua, & è vna di quelle piante, che il Padre Matteo offeruò nel Giardino di quel Signor Saladino Artafa, nella Città di Balfora come trouarà scritto il Lettore.

Di questa Città ne fa menzione il Ramnusio sotto nome di Balsera, posta sul fiume Frata, ouero Eufrate come s' offerua nel Tomo primo di Odoardo Barbofa, & in molt' altri Autori, quali per non dilungarmi tralascio.

Arkafond, siuè Akafond Pianta Indiana.

Cap. 13.

Fig 8



*Vnt Arbores mediocris magnitudinis in riuolis man-
gatis, quæ flores producant albos ad instar Iasmini
Hispanici, & fructus magnitudine mediocris race-
matim ad instar Mangha, unde nomen adepta est
Mangha Siluestris. Est autem, & laetiginosa, ut
pleræque arbores Orientales, ob nimium calorem, &
humiditatem, habet folia oblonga, lenia, estque me-
diocris altitudinis. Fructus leuis est. Tota arbor ratione foliorum, florum, ac
fructuum, est aspectu pulcherrima illius semina perexigua sunt.*

Non mi par di douere ch'io tralasci in questo luogo di porgere al
studioso Semplicista vn' altro Indice, che contiene molte Pianta, & Arbo-
ri Indiani, e frà queste ne sono ancora alcune descritte nell' Indice antecede-
nte, quali furono portate in Italia, & à me consegnate l' Anno 1672.
dal Molto R. P. Fra Valerio di S. Gioseppe Carmelitano Scalzo Visitato-
re Generale nella Prouincia del Malabar, & altri luoghi della Persia, &
dell' Indie Orientali, eccedente al numero di circa trecento, alcune delle
quali sono figurate dall' Acofta, dal Monardes, dal Clusio, e da altri anco-
ra, che qui tralascio, anzi che queste (al mio parere) leuano il scrupolo, e
fanno fede, e credito all' altre, che non sono sino ad' hora (ch'io sapia) sta-
te d' alcuno Autore, ne figurate, ne meno descritte, e sono le seguenti re-
gistrate per ordine dell' Alfabetto.

A

Aginam

Akafa.

Akled, species Croci In-
dici.

Akafond, siuè Arkafond.

Ala, seu Zingiber Chi-
nense.

Aladar Croci species.

Aladiul.

Albu.

Allium Indicum.

Alco.

Amarkand.

Ambari fagi.

Ambeti.

Ambare, arbor grandis.

Ampururi.

Ananas fructus Indicus.

Anguis.

Angelica, arbor.

Anglé, arbor.

Anicipan.

Annbona.


Anna Varfecha.

Antacca.

Arbor S. Georgij.

Arbor alta, ex qua aues
nidos suos suspendunt.Arbor Indica, maxima
falso Idolorum cultui
dicata.Arbor ferens folia argen-
tea.

Archam.



<i>Archon.</i>	<i>Buebenda.</i>	<i>Corundi.</i>
<i>Arti suæ Ada, arbor.</i>	<i>Bulilla.</i>	<i>Cruni.</i>
<i>Ardabar.</i>	<i>Balinda.</i>	<i>Crullimusla.</i>
<i>Arecha.</i>	<i>Buin, Binkhini.</i>	<i>Cyminum Indicum.</i>
<i>Areca supari.</i>		<i>Cyperus.</i>
<i>Arita, seu Rita.</i>	C	D
<i>Arûbe Mirabulani Spe.</i>	<i>Caggiu.</i>	<i>Danti, seu Stipsdanti.</i>
<i>Arusa.</i>	<i>Canna Indica.</i>	<i>Datura, seu Nux metel-</i>
<i>Atta.</i>	<i>Carambola.</i>	<i>la.</i>
<i>Auicularû industria qua</i>	<i>Carda.</i>	<i>Dudhali.</i>
<i>miromodo circa littora</i>	<i>Cardilla.</i>	<i>Durli.</i>
<i>maris nidos suos com-</i>	<i>Carmai, seu Carambola.</i>	<i>Durion.</i>
<i>ponunt.</i>	<i>Carangia, arbor.</i>	
B	<i>Cassia, fistula Indica.</i>	F
<i>Bablia.</i>	<i>Casunda.</i>	<i>Fanghela.</i>
<i>Bacchion.</i>	<i>Cata, Tartane.</i>	<i>Faniculum Marinum</i>
<i>Badam. Arbor.</i>	<i>Capa Indica.</i>	<i>Syria.</i>
<i>Bakeli.</i>	<i>Cedrus Conifera Libani.</i>	<i>Ficus Indica, alias Mu-</i>
<i>Banghi.</i>	<i>Cetorzon.</i>	<i>za, seu Manz Arabû.</i>
<i>Bar, Zambul.</i>	<i>Churafani, seu Syl. Chu-</i>	<i>Ficus Indica ramus, &</i>
<i>Bare Rjuil.</i>	<i>rasen.</i>	<i>germina.</i>
<i>Basilicum Indicum syl-</i>	<i>Cia, seu The.</i>	<i>Ficus Indica fructus.</i>
<i>vestre.</i>	<i>Cia Thara.</i>	<i>Ficus Indica, cuius in</i>
<i>Battata.</i>	<i>Ciadken.</i>	<i>quolibet fustulo rotun-</i>
<i>Behla.</i>	<i>Ciamba Pua.</i>	<i>do figura Crucifixi re-</i>
<i>Belimbi.</i>	<i>Ciarari.</i>	<i>presentatur.</i>
<i>Bendi.</i>	<i>Ciaruans, seu herba Tri-</i>	<i>Ficus Indica ex trunco</i>
<i>Bogra.</i>	<i>nitatis.</i>	<i>qualiter aqua extrahit-</i>
<i>Biga.</i>	<i>Cickna.</i>	<i>tur.</i>
<i>Bil.</i>	<i>Cinamomum.</i>	<i>Ficum Indicarum race-</i>
<i>Billila Tari.</i>	<i>Cirti cucumeris species.</i>	<i>mus.</i>
<i>Binghe.</i>	<i>Ciurata, seu Rota, aut</i>	<i>Flos Pauonis.</i>
<i>Birlispecies Palmæ Indi-</i>	<i>Canna Indica.</i>	<i>Flos Perfidis, seu flos So-</i>
<i>ce.</i>	<i>Coccus maior oculatus cû</i>	<i>lis.</i>
<i>BolZari.</i>	<i>midulla.</i>	<i>Flos S. Thome.</i>
<i>Bretum siue Blitum Bë-</i>	<i>Coccorum interiore de fru-</i>	<i>Fulfel.</i>
<i>galicum.</i>	<i>ctu extrahitur oleum</i>	
<i>Bretum Amberi.</i>	<i>in torculari pro medi-</i>	G
	<i>cina, & lucernis.</i>	<i>Galgheri.</i>
	<i>Colocofia cum bulbis.</i>	<i>Ga-</i>

<i>Garar Nelli.</i>	<i>kampedi Fudeli.</i>	<i>capra.</i>
<i>Gembo, vel Giambus,</i> <i>arbor.</i>	<i>kemberi.</i>	<i>Licchia.</i>
<i>Gharfalli.</i>	<i>kanadi.</i>	<i>Limbera.</i>
<i>Ghondi, arbor.</i>	<i>kandol.</i>	<i>Limbera alia species.</i>
<i>Giacca, arbor.</i>	<i>kandol beri.</i>	<i>Liubra.</i>
<i>Giambua.</i>	<i>kandol species altera.</i>	<i>Londal.</i>
<i>Giambus malakensis.</i>	<i>kante feri, vel kata Sy-</i> <i>riaca frutex.</i>	<i>Luceraggio Planta.</i>
<i>Giafon, arb. parua.</i>	<i>kannu.</i>	M
<i>Gintbegintba.</i>	<i>karante arbor.</i>	
<i>Girgui, seu Bonduch.</i>	<i>karute arb. procera.</i>	<i>Mako.</i>
<i>Guburli.</i>	<i>karanda Arbor parua.</i>	<i>Makoma.</i>
<i>Gulfi.</i>	<i>Kareka Puli.</i>	<i>Malua Indica.</i>
<i>Gung.</i>	<i>Kasunda.</i>	<i>Malum punicum Indicu</i>
H	<i>kat manga.</i>	<i>Malkangoni frutex.</i>
<i>Halu.</i>	<i>Kata Pineka.</i>	<i>Manda labo.</i>
<i>Herenda.</i>	<i>kate, sine Licium Indicu.</i>	<i>Mandara.</i>
<i>Herenda alia species.</i>	<i>kheuan.</i>	<i>Mandragora.</i>
<i>Hircu, datura Indica.</i>	<i>khinc.</i>	<i>Mangustam.</i>
<i>Hortulana.</i>	<i>Kiriata.</i>	<i>Maneka, seu Amba arb.</i>
I	<i>kocus Insularum.</i>	<i>Indica fructifera, &</i> <i>quasi Regina inter</i> <i>pomiferas.</i>
<i>Igera Murri.</i>	<i>kodna.</i>	<i>Manka alia species.</i>
<i>Ignis Cali.</i>	<i>Koni, vulgo Ralla.</i>	<i>Mamekdi.</i>
<i>Igli Arbor.</i>	<i>Kotton, seu Gossypium In-</i> <i>dicum Arbor.</i>	<i>Marbit.</i>
K	<i>Krididi.</i>	<i>Marotti.</i>
<i>kadi Tumba.</i>	<i>Kudi, Anneko.</i>	<i>Masiiera.</i>
<i>kaggiuri species palme</i> <i>daclilifera.</i>	<i>kucli, arbor parua.</i>	<i>Meluk.</i>
<i>kaggiu Arbor.</i>	<i>kuper kuti, herba repens,</i> <i>super terram.</i>	<i>Mogora, seu Mogori.</i>
<i>kagnilam.</i>	<i>kumba.</i>	<i>Mogori altera species.</i>
<i>kaida Ciuka.</i>	<i>kurulu.</i>	<i>Molag, seu piper.</i>
<i>kalungi matam.</i>	<i>kurut. arb. parua.</i>	<i>Morus Indica vulgo Cel-</i> <i>si.</i>
<i>kali arb. ex qua Arabes</i> <i>colligunt cineres Oriē-</i> <i>tales.</i>	<i>kureta.</i>	<i>Mis n'a.</i>
<i>kali Ciri.</i>	<i>kura kusa.</i>	<i>Muri Kuk.</i>
<i>kali kardor radix.</i>	L	N
<i>kalumba.</i>	<i>Lamba.</i>	
	<i>Lauu, vulgo Giacca de</i> <i>Buscio.</i>	<i>Nai.</i>
	<i>Laſa margiada, seu pes</i>	<i>Nagdon.</i>

Na-

<i>Nagli, seu Nacceni.</i>	<i>Palma Indica elate cum suis coccbis parvulis.</i>	<i>Paugiora.</i>
<i>Narandi radix.</i>		<i>Phulia.</i>
<i>Narnbedi.</i>	<i>Palma Indica, ex qua fiunt Trabes, vcl ananum, ac rudentes Ancorarum.</i>	<i>Pilu.</i>
<i>Narua, seu Narul, arbor.</i>		<i>Pimbul arbor.</i>
<i>Nelika.</i>		<i>Pinpal.</i>
<i>Nid.</i>		<i>Pinkcui.</i>
<i>Nigunda.</i>	<i>Palma Indica ex succo distilatur vinum potens, & extrahitur saccharum.</i>	<i>Plantago Indica.</i>
<i>Nil, ex cuius folijs maceratis extrahitur succus qui condensatur, & fit ex eo color, qui dicitur Indigo.</i>	<i>Palma Indica sylvestris, vulgo Palma Braua, cuius folia deseruiunt pro stabellis.</i>	<i>Pui Phanda.</i>
<i>Nimbera.</i>	<i>Palma Indica folijs vntur Malabares pro carsa, & ex ijs compingunt libros.</i>	<i>Putakeri.</i>
<i>Nucilla, alias Nigunda.</i>	<i>Palma Indica, ex cuius villis auiculae artificiosissimo modo, & industria nidos suos conficiunt, ut à serpentibus, alijsue animalibus, Oua, aut pulli ledantur.</i>	<i>Puna.</i>
O		<i>Pyrus Indica.</i>
<i>Odhelunga.</i>		R
<i>Oghfi.</i>		<i>Radix, Pclusa, & Peluz.</i>
<i>Oud Moghre.</i>		<i>Radix, Ran Varuua, seu Dantora.</i>
<i>Oxalis Persica.</i>		<i>Radix Nai.</i>
<i>Oliue Damascene.</i>		<i>Radix kua.</i>
P		<i>Raisink.</i>
<i>Paberabul.</i>	<i>Panna, seu Bethel.</i>	<i>Rambe.</i>
<i>Pacali, arbor parua.</i>	<i>Panna Tali.</i>	<i>Rambulon.</i>
<i>Pagnas.</i>	<i>Panaube, seu Giancoma.</i>	<i>Ranabil, radix.</i>
<i>Paire arbor.</i>	<i>Pancka.</i>	<i>Rangandual.</i>
<i>Palma.</i>	<i>Panri Karli.</i>	<i>Ranguri.</i>
<i>Palma Arabica, seu Datilifera.</i>	<i>Papaia.</i>	<i>Rarondera.</i>
<i>Palma Elate.</i>	<i>Papaie fructus.</i>	<i>Ratdegat.</i>
<i>Palma Indica Nucum vulgo Cocchi seracifima.</i>	<i>Paragh, seu Pharangh.</i>	<i>Reubarbarum.</i>
<i>Palma Indica, ex qua liquorem extrahunt Indigene.</i>	<i>Paranghi.</i>	<i>Ribasium Arabicum, seu Ribes Arabum.</i>
<i>Palma Indica sylvestris, ex qua extrahitur liquor.</i>	<i>Parcol.</i>	<i>Rinda.</i>
	<i>Paringha.</i>	<i>Ringhini.</i>
	<i>Parmi.</i>	<i>Rodali.</i>
	<i>Parmi Kanti arbor.</i>	<i>Ronphal.</i>
	<i>Pareki, seu Pripilli.</i>	<i>Rosa Syrica.</i>
		<i>Roserage.</i>
		<i>Rumbera.</i>
		<i>Rodibula.</i>
		S
		<i>Sabon.</i>

<i>Sabrantia.</i>	<i>Tamar Henna, siue Bo-</i>	<i>Varua Chan arb. parua.</i>
<i>Sabfan, & Samb, Sa-</i>	<i>trus Cypri, aut Ligu-</i>	<i>Vasnağa.</i>
<i>uan, item, Antaka.</i>	<i>stum Arabicum.</i>	<i>Vatel seu Aslu.</i>
<i>Sai, seu Sairam.</i>	<i>Tamarindi.</i>	<i>Vespertilio Indica.</i>
<i>Sakat.</i>	<i>Tamarindus Syiu.</i>	<i>Visub mogri.</i>
<i>Sanderfar.</i>	<i>Tamberi Pagi.</i>	<i>Viha.</i>
<i>Sanderfar, & Sander</i>	<i>Tan.</i>	<i>Vmbar arb. magna.</i>
<i>Pal. arbor.</i>	<i>Tankela.</i>	<i>Vnderi.</i>
<i>Sander lak frutex.</i>	<i>Tapheri Nidus, scilicet</i>	<i>Vpalsari.</i>
<i>Sapura.</i>	<i>qui in extremitate</i>	<i>Vrna arundinea.</i>
<i>Saturi.</i>	<i>Palme rami ab au-</i>	<i>Vua Damascena.</i>
<i>Sauargha.</i>	<i>culis alligatur.</i>	
<i>Sciruli.</i>	<i>Tarara.</i>	Z
<i>Sciuan.</i>	<i>Tota Vari.</i>	
<i>Sciuan, & Saiuan arb.</i>	<i>Tendelines.</i>	<i>Zalanda.</i>
<i>procera.</i>	<i>Teti Kani.</i>	<i>Zambal.</i>
<i>Scorzonera Indica.</i>	<i>Toppi.</i>	<i>Zambul.</i>
<i>Scorzonera Syriaca.</i>	<i>Tungur.</i>	<i>Zambulon.</i>
<i>Sena Indica.</i>	<i>Turbith.</i>	<i>Zaffar.</i>
<i>Serpentine.</i>	<i>Ty arb. parua.</i>	<i>Zafuan, vel Ciasu.</i>
<i>Siabon.</i>		<i>Zingiber.</i>
<i>Suran.</i>	V	<i>Zuni.</i>
<i>Surna.</i>		
T	<i>Vaar seu Vara.</i>	
<i>Tabaccum, seu herba Sa-</i>	<i>Vuar Panti.</i>	
<i>Eta.</i>	<i>Vanti.</i>	

Tutte queste Piante comprese nel sopradetto Catalogo doueu' io à spece mie produrre alla luce per via di Stampa, e già quasi tutte le haueuo fatto figurare à quest' effetto, parte delle quali sono ancora intagliate, mà per diuerse cause, che non mi è lecito manifestare, tutto il concerto andò in fumo. Onde perche tante mie costeuoli fatiche non rimanghino del tutto infruttuose, nel corso di questa mia Istoria, ne anderò tramisciando alcune d' esse in figure grandi, e picciole, massime le più rare, e più singolari; tanto più per essere sin' adhora la maggior parte di queste à Sempliciisti incognite, e se non portaranno seco eruditione, d' vtile alcuno, seruiranno almeno à gl' intelligenti della professione di passatempo.



fig IX



Arna ouero Ana Vareca



fig. X



Arti ouero Aldum

dell'Irola di Solor

Arna, ouero Ana Varecca . Cap. 14

Fig. 9.



E i Libri manuscritti del P. Matteo si ritroua l'Imaginem di questa pianta Indiana, chiamata iui col nome d'Arna, ouero Ana Varecca quale cresce, e viue sopra gl' Arbori, sostentata da suoi caprioli, che in ciaschedun nodo tramanda, come nella figura s' offerua, e v'è crescendo sopra quelli: Di questa non ne hò alcuna de-

scrizione, non essendomi rimasta che la sola figura, e perche fù vna delle prime ad essere intragliata, la rappresento quiui al cortese Lettore, parendomi pianta degna d'esser veduta, ed ammirata, massime trouandosi in quelli scritti molte relationi, e virtù, che d'essa vsano gl' Indiani del Malabar, in tanto darà à semplicità materia, ò causa d' affaticarsi ad inuestigare la di lei cognitione, e le di lei virtù, e qualità.

Arti, ouero Ada, e forsi Aldum, dell' Isola di Salor nella China . Cap. 15.

Fig. 10.



Itrouo trà queste Imagini del sopra scritto Padre, vn' Arbore Indiano, che per quanto si può cōgetturare, cauasi da esso per incisione vn liquore, ò latte, ouer Refina, che deue seruire appresso quelli del Paese per vso della medicina, le sue foglie, per quanto mostra il ritratto, sono molto somiglianti à cert' Esula di Soria, du-

biosamente dal Clusio nell' Istoria, ^a stimata essere specie d' Apocino del medemo luogo, e da Prospero Alpino, e da Gio: Vislingo, ^b fù per Beid, el offar, e Beid, el Ssar figurato, e descritto, quale Arbore ne' proprii manuscritti, che sono stati presso di me, non vi si ritroua descrizione alcuna, ne altro, che il sopra accennato nome scritto in lingua Arabica. S' appa-

^a l. 5. c. 4. p. 87.
^b pag. 87. del primo, e pag. 26. del secondo.



After

Aster Attico Annuo Odorato di Candia :

Cap. 16.

Fig. 11.



Olta confusione trouo appresso i moderni Autori nella dichiarazione dell'Aster Attico vero di Dioscoride, e crederei esserne proceduta la causa, ch'alcuni si sono creduti, ch' il fiore di questa pianta sia di duoi colori, cioè porporino, e giallo, mà in questo si sono ingannati, perche il codice Greco stampato in Basilea l'anno

1529. chiarisce questo errore, doue la parola, che dice (&) deue dire (vel;) onde risulta che il fiore di questa pianta deue essere, ò giallo, ò porporino, come molto bene afferma l'Anguillara con queste parole.

b. 208. 14. pag. 204.

Ma rauigliami molto, come possi essere, che huomini dotti, che hanno fatto professione d'intendere Dioscoride, habbino spesse fiate preso errore in intenderlo, si come auiene nel Cap. deli' Aster Attico, volendo alcuni, che quelle parole ἄστρος πορφυρεόν, ἡν-ἀντα cioè, che hà il fiore porporino, ouer giallo, non si debbano pigliare disgiuntiuamente, mà che con quelle Dioscoride intenda due cose in vn medesimo soggetto; mà quanto s'ingannino questi, ogniuo se ne può chiarire, nascendo il vero Aster Attico in molti luoghi d'Italia con cinque fogliette picciole, appuntate nella cima, poste in ordine à guisa d'vna stella, nel mezzo delle quali è il fiore, ch'è di color giallo, simile al capicello della Camamilla, ouero di color porporino. Fà il gambo alto vn cubito, legnoso, e peloso, con foglie simili all'oliuo, mà asprete, e pelose. Chiansasi in molti luoghi d'Italia da gli Herborari, Filix ante patrem, & in Grecia, nel Peloponneso, & al Zante si chiama Dodecaminitis. Vn' altro errore parmi pur essere appresso ad altri, quali non hanno osseruato, che Dioscoride trattando della sua pianta voglia inferire, ch' il capitello del suo fiore sia similmente coronato delle stesse foglie della propria pianta, e disposte, come esso notò, in forma di stella, il che li hà indotti à pigliare per l'Aster di Dioscoride vna pianta impropria con fiori azurini, che è più tosto l'Amello di Virgilio, che l'Aster di questo; onde parmi d'hauere luogo ancor io di proporre vna pianta, ch' al mio credere più d'ogni altra se gli accosta, per hauere coronati li capitelli de suoi fiori delle proprie foglie della pianta, come mi pare, che Dioscoride voglia inferire del suo Aster, conforme da molti viene spiegato, e specialmente nel Dialogo di Baldassar, e Michele Campi nel trattato, che vi si fa dell'Aster di questo Autore, & oue si dice non essere per anco conosciuto, ben che la pianta da loro proposta sia diuersa da quella di Dioscoride,

b. 208. 13. pag. 62.

fig XI.



Ager annuo odorato
di Candia

de, e quale è l'Astero inclinante del Colonna, nell'Istoria delle Piant
meno cognite. Colpirono però nel segno conchiudendo, ch' il fiore dell' c pag. 356.
Astero di Dioscoride hauesse li capitelli delle proprie foglie della pianta
coronati. Il Clusio parimente sopracitato ^d porta vn' Astero, ch'è il primo d pag. 346.
de' suoi per il vero, e legitimo. L' Anguillara ^e fa della stessa pianta il si- e pag. 384.
mile, sì come anco diuersi altri, ne parmi fuor di ragione, che questo con-
uenisse più con quello di Dioscoride, che altri fin' hora proposti; per non
ritrouarsi à quel tempo pianta più consimile, hauendo li capitelli de' fiori
coronati di foglie, ancorche questa sia pur diuersa dal vero Astero di Dio-
scoride, per esser le foglie de' capitelli spinose, tanto più che il sudetto Au-
tore nel suo Astero non mentiona mai alcuna spina; hora che di Candia se
ne ritroua vno nato nel mio horto più d' ogni altro à questo di Dioscori-
de confacente, come si dimostrerà con euidenza, ne rappresento qui all'
intelligente Lettore la sua descrizione congiuntaui ancor la figura.

Cresce all' altezza d' vn cubito con fusto rotondo, diritto, sodo, la-
nu ginoso, che piegato non si rompe, e rotto poi à forza, mostra nel di dē-
tro vn canaletto sottilissimo, che gli passa nel centro, con midolla intorno
bianchissima, niente succosa, hà poca dogia, mà sode, la scorza poi è sot-
tile, e rosseggiante, & in essa si vedono alcune irregolarità di linee; hà mol-
ti nodi posti senz' alcun' ordine, da ciascuno de' quali nascono ad' vna, ad'
vna le foglie nel contorno pelose, simili à quelle del primo trà gli Asteri
figurati, e descritti dal Clusio, / che viene ad' essere il secondo figurato dal f l. 4. c. 7. pag. 13.
Mattioli, e lo stesso, che scrisse l' Anguillara, eccetto che nel mio sono sen-
za piedetto, sendo anco la pianta in ogni parte minore. Sono le dette fo-
glie di colore, che nel verde gialleggia, e dal loro mezzo esce per il lun-
go vn neruo leggermente folcato, dal quale si diramano alcuni lun-
ghi neruetti, nella parte superiore visibili, mà piani, e nell' inferiore rileua-
ti; dal piede di ciascheduna spuntano altri cauli fogliosi, che con nuoue ra-
mificationi fanno corona alla pianta, e numerosi sorpassano il fusto pri-
miero, sì che col frutticare tiene questa pianta non poca similitudine col
Gnafalio volgare, ò sia la creduta Impia di Plinio chiamata ancora, secon-
do alcuni, la Cartafilagine, come notò l' Anguillara e ne suoi pareri.

Termina ogni ramo in vn capitello florido, che hà due ordini di fo-
glie herbacee, nel primo maggiori più del doppio, che nel secondo, dispo-
ste à modo di stella con raggi alternatamente lunghi, e corti, le quali foglie
sono simili, non meno nella sostanza, che nella forma alle altre della pian-
ta, mà non spinose, come nel capitello del secondo Astero del Mattioli,
dell' Anguillara, e del Clusio, à differenza di tutti li altri Asteri, ne quali le
foglie disposte à modo di Stella (onde trassero il nome queste piante) non
sono herbacee, mà floride; il disco poi di questo fiore stellato è come
quel-

g 307. 12. pag. 203.

h. 1. 3. c. 3. pag.
331.

quello del Buftalmo giallo con foglie lanuginose figurato, e descritto dal Clusio nell' Istoria *b* sotto nome di Chrysantemo Valentino; è coronato di fogliette nel colore consimili, e nella cima quadrate, con tre incisure per ciascheduna, a timiglianza di quelle dell' Aftero terzo descritto dal Clu-

§ 1. 4. c. 7. pag.
33.

sio, i che è il primo Austriaco del medesimo.

Questo fiore spira vna fragranza, che sembra di rose, e d'Olibano, ouero Incenso: caduto poi lascia in suo luogo à perfettionarsi vna chierica piena di semi longhetti, quadrangolari, di colore argentino, con alcuni peletti nella sommità, come nel Ciano. Sono questi, come il loro fiore, e foglie, di sapore amaretto con qualche mordacità; per lo contrario la Radice è di grato sapore, mà tenue, bianca, sottile, e fibrosa.

E' pianta annua, frequente nella Candia, e meglio di qualunque altra descritta da gli Autori conuiene con l' Aftor Attico del fiore giallo di Dioscoride, onde io la stimo per lo stesso, quando ciò non tolga l'essere di fiore odorato, qualità, che Dioscoride non hà nel suo dichiarato; che se poi l' odore può costituire differenza, trà questa, e quella, resta in chiaro, che questo Aftero sia di nuoua offeruatione, come non prima d' hora, ch' io sappia, figurato, ò descritto da altri.

Per essere in tanto simile all' Aftor Attico di Dioscoride, non negherai à questo le virtù, che quel grand' huomo attribui al suo;
cioè di giouare alle inflammationi de gli occhi, & ai tumori, e dolori dell' Inguinaglie; onde li Aftori furono chiamati Inguinali: che mitighi il fouerochio calore dello stomaco sopra postoui à modo d' Empiastro: che la di lui decoctione purifica l'vscita dell'vltimo intestino, e finalmente,
che il fiore beuto con acqua sia gioueuole alla scaranzia, & a i putti, che patiscono di male caduco.



fig. XII.



Astero di Ragusa

con foglia di Verbascum

Astero di Ragusa con foglie di Verbasco.

Cap. 17.

Fig. 12



Ll' Astero di Candia ne aggiungerò vn' altro di Ragusa venuto sotto nome d'Astero con foglie di Verbasco, meritamente così chiamato, per hauere esso le foglie lanuginose, e molto simili (in quanto alla forma) cō quelle de Verbaschi. Ne rapresento qui la sua linagine, come di piãta, che non hò per anco vista mentionata presso Scrittore alcuno.

Mi nacque questa spetie d'Astero nel mio horto sino dell' Anno 1658. alzandosi circa vn cubito da vna radice cinericia, ruuida, e grossa, massime nella corona, spargendo dalla metà in giù altre minori, e queste ne tramandano altre più sottili, tutte moderatamente contorte, & ondegianti, con scorza grossa, che con difficoltà si separa dall' interna loro sostanza, che è tutta legnosa.

Da essa spuntano diuersi cespi numerosi di foglie lunghette, e gentilmente nel contorno dentate, le quali verso il gambo si restringono; sendo egli di mediocre lunghezza, incauato, rotondo, e largo nella base, e più bianco di quello delle foglie, che sono coperte di lanugine candida, mà assai più di sotto, che di sopra, oue la bianchezza inclina più al verde; quindi nel color, e nella superficie lanuginosa, non meno, che nella forma, come accennossi, somigliano alle foglie più picciole de Verbaschi, massime à quelle del primo di Dioscoride, non eccedendo nella grandezza quelle del Verbasco con foglie di salvia de moderni, che è il quarto di Dioscoride, figurato dal Mattioli nelle sue edizioni, e nell' vltima con figure grandi^a per il quarto di questo Autore, descritto, e figurato ancora per Verbasco siluestre dal Dodoneo nell' Istoria,^b sono perciò più molli al tatto, ben che di sopra seminate di spessi, e picciolissimi porretti, a quali nel di sotto corrispondono altrettante incauature, e da questa parte corre loro fin alla cima vn neruo rileuato, da cui ne diramano altri sottilissimi, e curui: nel fondo poi de' loro gambi s'abbracciano queste foglie l' vna con l' altra nel modo della Cinara volgare, ò sia Cardo nostrano, che comunemente si mangia, sì che con detta loro vnione ingrossano molto i cespi, che per la molteplicità delle foglie si dilatano in giro sufficiente.

E

Nel

^a lib. 4. cap.
106. fol. 1205.
^b pag. 146 l. 5.
prim. prima
cap. 29.

Nel mezzo de' cespi fogliosi pullulano rami, ch' alle volte s' alzano vn cubito, rotondi, lanuginosi, sodi, e da vn nodo all' altro variamente piegati, con foglie, in quanto alla sostanza, e colore, simili all'altre della pianta, mà molto minori, di forma ouata, vn poco acute nella cima, e da piedetto affai più breue sostenute, nella sommità de quali apparisce à suo tempo vn bottone biancheggiante, che s' apre poi in vn fior giallo di fogliette ouate, disposte intorno ad vn disco di filamenti parimente gialli, e lucidi: circondano poi questo fiore dalla parte di sotto altre foglie, ma herbacee, picciole, e biancheggianti della sostanza di tutte l'altre della pianta, alle quali sono frapolte altre anco minori, le quali contornando elegantemente tutto il disco del fiore, formano vn' ombrella stellata con raggi alternatamente l' vno più lungo dell' altro, come nell' Astero di Candia sopra scritto.

Cadono questi fiori, e ne' loro calici restano racchiusi i semi, che sono minutissimi, & osservati col microscopio si scuoprono di forma quadrangolare, di color castagno, solcati per il lungo, e sparsi d'ogni intorno di rari peli bianchi.

Masticate le foglie, e la radice similmente, si manifestano di sapore alquanto amaro, efficcante, & vn poco mordente; s' ella è custodita con diligenza resiste à i rigori dell' Inuerno, e si conserua molto tempo.

Varie specie d' Asteri sono hoggidi note appresso gli herbari; mà, à mio credere, nissuna di esse conuiene con quella di Dioscoride, come nel Capitolo precedente si è diffusamente dimostrato, e tutte queste vengo-

no nella Pinace registrate, e si come anco altre cinque specie di fiore azurro, la prima delle quali dal Trago nella sua Istoria

vien chiamata fiore de tintori, da altri Astero azurro

Italiano, e da altri, ben che impropriamente, per

l' Aster Attico vero tenuto.

Io però tutte

queste sorti di piante dirai più tosto

tante specie d' Amelli, che


d' Asteri.

C. I. T. Bot. 2.
p. 8. 166.
d. I. 1. 167.
e. Pag. 154. l. 1.
cop. 49.





fig. XIII



Astero Aizoide del Capo di Buona Speranza. Cap. 18.

Fig. 13



Enne il seme di questa pianta dal Capo di Buona Speranza, mandato dall' Illustriss. Sig. di Siluercroon Ollandese, nel dicui Giardino fiorì la prima volta in Europa, all' Ecc. Sig. Dottore Nicolò Ponchau Nobil Fiamingho, Signore nella materia de' Bulbi, e fiori molto insigne, e da esso trasmessimi con quelle stes-

se parole, che gliene scrisse quel Cavaliere Ollandese, che sono le seguenti.

Mando qui giunto à V. S. certo seme capitalomi dal Capo di Buona Speranza sotto nome di Astero Aizide, il quale l' anno passato produsse nel mio giardino il primo fiore, che se ne vidde in Europa, mà per l' inclemenza di questo nostro freddissimo Clima non maturò il suo seme, si che non ritrouandosi altro, che quel poco, che gli trasmetto, ogni volta che gli sarà moltiplicato, la supplico à fauorirmene. Fu da tutti giudicato il suo fiore bello, e curioso; il suo color è giallo lucido come vetro; nasce in tale modo nel mezzo delle foglie herbacee della pianta, che forma un triangolo, sendo l' istesso fiore parimente triangolare, si che fa un effetto bellissimo, e ben posso certificarle essere pianta nuoua, e non più vista.

Non fece però l' istessa riuscita nel mio Giardino primato, oue non puòte ne menò ariuare à produrre il suo fiore, ben che fossero vstate diuerse diligenze, sino à coprirla con cristalli, per augmentarli di giorno maggior calore nell' occhio del Sole, e per conseruarlo dall' intemperie de' freddi della notte, mà nulla giouò, e non produsse altro, ch'vn cespo di foglie lunghe, carnose, triangolari, della stessa grandezza, che nell' imagine si dinota; le quali e in forma, e in sostanza sono tanto diuerse dalli altri Asteri, che mi fanno credere con ragione essergli male applicato quel nome d'Astero, con cui mi fù trasmesso; ne meno conuenirgli quello di Aizoide, non hauendo che fare con gli Aizoi d' Sempreuuii, se non voleffimo hauere riguardo alle foglie, benchè queste nel di fuori non siano angolate come nella mia pianta, à somiglianza di quelle dell' Aloè Americana, la quale riseruandosi il nome d'Aloè appresso i Greci, & a' Latini, alcuna volta da qualche moderno è stata chiamata sempreuuiuo, nò per altro, se non perche viue lungamente, come i sempreuuii. Io però non le hò mutato nome, bench' io conosca essere altra pianta che Astero, perche non hauendo veduto il di lei fiore, e frutto, non hò potuto determinare sotto quale spetie, e genere ella debba collocarsi.

Essendo però questo fiore, secondo la relatione hauutane, composto con le foglie in forma di triangolo, me lo figuro simile à quello di certa pianta aquatica, che nasce nelle nostre Valli di Malalbergo, e ne Territorij del Poggio Marchesato dell' Illustriss. Sig. Guid' Antonio Senator Lambertini: la quale dal Bauino nella Pinace ^a chiamasi Aloè Palustre, e dal Dodoneo ^b Sedo, e Stratiote Aquatico, col quale nome fù parimente proposta dal Lobelio ^c ne gli Auuerfari, e nelle Osseruazioni, e poi replicata ancora nelle di lui imagini. ^d

^a l. 7. p. 8. 6.

^b pag. 181.

^c p. 104. l. 1.

^d pag. 584.

^e pag. 334.

^f 104.

^g pag. 379.

Ne solo ne fiori, mà ancora nelle foglie parmi, che si possino paragonare queste due piante, scorgendosi amendue quasi della stessa figura, se non che nell'Aloè Palustre sono sottili, e spinose, e per lo contrario, nell'Astero Aizoide senza spine, e carnose; anzi al tatto molle: mà quanto più nella figura conuengono, tanto maggiormente dissimili di natura si scorgono; poiche oue l'vna è pianta aquatica, l'altra è nemica dell'acque, à tale segno, che spesso perisce per causa d'vna pioggia troppo frequente.


Quindi la conobbi pianta di temperamento caldo, e secco, nel che mi confermò di più il sapore salso delle di lei foglie, le quali stropicciate rendono humore glutinoso, di cui per poco, che se ne ingiottifesa, assai riscalda il palato, & è tanto potente, e gagliardo, che non mi ricordo hauere sentito mai cosa simile, perche subito gustata matura, e euaa in copia lo sputo, rompendo insieme gagliardamente le ventosità dello stomaco.

Del medesimo sapore, mà più moderato, è la sua Radice, che si profonda in terra circa vn palmo, dal mezzo in sù nuda, e nel restante tutta contornata d'altre radici minori, che si diramano in molte fibre sottili.

La di lei scorza è tenue di color giallo chiaro, e nell'interiore è tutta sfilacciosa.



fig XIV



Aezeno Seriphia

Vero di Dioscoride

Assenzo Marino, ouero Serifio di Dioscoride.

Cap. 19.

Fig. 14



Auendomi. l' Abrotano maschio di Dioscoride auanti descritto, ramemorato il suo Assenzo, ò Serifio marino, hò giudicato bene il soggiungerne quì il mio sentimento, mostrando quale pianta hoggidi lo esprima in tutto, e per tutto; massime, che da questa cognitione si viene meglio in chiaro del sudetto Abrotano, il che tanto più ispediente giudico, quanto che, sendosi molti affaticati in cercare questo Serifio, propofero piante, ch'al mio parere, adeguatamente non lo rappresentano, e se ad' alcuni capirò trà le mani, ne parlorono come d'Assenzo men raro, ò d'altra.

Io dunque tengo per fermo, e senza dubio alcuno, che il vero Assenzo Serifio di Dioscoride sia la Scheha de gl' Arabi, ò d'Auicenna figurata, e descritta nell' Istoria herbaria di Lione ^a nelle aggiunte con nome, non solo di Scheha, ma di specie di Assenzo; la quale Scheha da Gio: Bauino nella sua Istoria ^b fù descritta sotto nome di seme contro lumbrici, e d'Assenzo Santonico del Rauuolfi, è mentionata ancora da Gasparo Bauino nel Teatro Bottanico ^c con nome d'Assenzo Santonico Giudaico, e dallo stesso nell'enumeratione delle piante ^d descritta sotto nome di Assenzo Peregrino della duodecima specie.

Fondasi questa mia ragione nel confròto delle descrittioni di questa, e di quella, che scambievolmente conuengono tanto, che nulla di più; possedendo le medesime virtù, e qualità la Scheha degli Arabi, che il Serifio di Dioscoride, come nel di lui trattato, mediante l'interpretatione di Marcello Virgilio, ^e si legge: *Abfynthium marinum, sunt qui Seriphium, qui Santonicum vocant: Romani Santonicum dicunt. Seriphium quidam vocantes, marinum intelligunt, nascitur, & in Egypti Taphosiri, quo pro oleaginis ramis Sacerdotes vtuntur*: passando poi alla descrizione della pianta, come appresso il sudetto Marcello Virgilio viene esposta con le seguenti parole: *Fruicosa herba est, minori Abrotano (ch'è il maschio) similis, semine onusta, leni amaritudine, stomaco inimica, grauissimè odorata, cum caliditate aliqua adstringens. Ea per se vel cum orizā decocta, mox cum melle sumpta, ascaridas, & rotundos lumbricos necat, aluum simul leniter deiciens: eadem potest obsonijs addita, aut cum lenticula decocta*, altrettanto si può dire della

^a Pag. 36. r. 37.^b Tam. 3. pag.

180. f. 26. cap.

71.

^c l. 4. fol. 1. p.

139.

^d Pag. 138. f. 4

fol. 3.

^e Pag. 347. l. 3

cap. 21.

della Scheha, che sendo pianta simile all'Abrotano minore di Dioscoride, fertilissima di seme, con leggier' amarezza, mà graue odore, amazza i vermi del corpo humano, tanto lunghi, quanto rotondi, e purga con qualche astringenza.

Il che fù offeruato da Serapione, che perciò descriuendo le tre sorti d' Assenzo, Pontico, Santonico, e Serifio, così della Scheha à mio proposito hebbe à dire, come si legge appresso Matteo Seluatico, *Abfynthium est cuscute Romanum, & alij dicunt, quòd est Scheha Romanum, & species eius sunt tres, vna est qua nominatur nomine generali, & est Abfynthium in veritate, & est ex eo Cretense, & est melius, & illud est Abfynthium ponticum*; e questo è il terzo Assenzo Cretico mentionato dal Bauino nella Pinace,^g e nel Prodomo,^h e nella Fitopinace i con nome d' Assenzo Pontico d' Honorio Belli, ch' è il vero Assenzo Pontico de gli Antichi, così cognominato per nascere frequentissimo nelle Prouincie di Ponto, quale pianta non differisce in altro dall' Assenzo nostrale d' Italia, che nel sapore, sendo questo amarissimo, e quella con niuna amarezza, quando è verde, e con pochissima, quando è secca, al riferire del sudetto Belli. E pur Dioscoride come sopra si è descritto, quando ragiona del suo, doppo hauere notato le fattezze della pianta, scriue di questo primo, che il migliore è quello, che nasce in Ponto; non perche questo sia dal primo Assenzo diuerso: mà perche quello di Ponto non hà in sè tanta calidità, e poco, ò niente d' amarezza, e così Dioscoride loda questo per vso della medicina per la causa sopra accennata. Dunque questo Assenzo di Candia, ò di Ponto, e l' Assenzo nostrale non sono due, mà vna pianta sola.

Il Clusio nell' Istoria delle piante rare & scriue vna specie d' Assenzo natiuo di Pannonia, e d' Aultria, e ne' campi di Vienna, chiamato comunemente Assenzo Pontico volgare, vsato per tale hoggidi da Medici, e da Speciali; mà però questo non è altrimenti quello degli Antichi, come sopra à bastanza si è dimostrato: auertisco in ciò il Lettore, che mancando oggidì quello, che nasce in Ponto, e in Candia stimato da Dioscoride per il migliore, vsasi questo pannonicò, & Aultriaco, per non partecipare di tanta amarezza, ne calidità, come fa l' Assenzo nostrale; onde per tornare à mio proposito, parmi che molto bene spieghi il sopracitato Serapione, dicendo: *Et est alia species qua nominatur Saricon* (nome cred' io, contratto dal Serifio) *& est alia species qua nominatur Santonicum, & sunt ex hominibus qui nominant Scheha, & Saricon Abfynthium; & nascitur in montibus Regionis, qua dicitur Chirochia, & in locis qui dicuntur Bosir*: (di questo Bosir, ne fa mentione il Ramusio,ⁱ e la delinea Gio: Blacu^m nel suo Atlante,^j) *& in Regione Babilonis, & est herba subtilis, similis herba, qua dicitur Abrotonum plena semine, sapor eius vergit ad amaritudinem nocinam, grauis*

par-

^g pag. 9. pag. 8.
pandicaria.

^h pag. 138. l. 4.
vul. 2.

ⁱ pag. 71.

^j pag. 670. nel
l' appendice
quarta.

^k pag. 239.

^l Vol. par. 8. de
l' Africa fol.
81.

^m par. 11 fol.
15. dell' Asia.

odoris, & quando animalia comedunt ipsam, maxime in Chirochia, impinguntur. Vnde sapor eius est salsus cum amaritudine, & stipticitate pauca, & est calidior Absynthio, & debilior Abrotano, & est mala stomacho, & Scheha similatur Absynthio in figura, & sapore, & differentia inter ea est, quod non est Strypticum sicut Absynthium, & quod calefacit plus eo, & amaritudo eius plus cum parua farsedine, & illud est Absynthium Citrinum, quod latine vocatur Stecados citrinum, vel Stecas citrina. Onde fù parere dell'Eccellentiss. Sig. Dottore Lorenzo Legati publico professore di lettere Greche in queste Città di Bologna, che li Arabi tirassero questa loro parola Scheha del Greco *στέχας* corronpendola come souente accade in simili dedutioni.

Di questa Stecade citrina intesa per la Scheha de gli Arabi, differēte dalla nostra Stecade citrina detta da alcuni falsamente Chirifocome, come à suo luogo auertisco, il medesimo Sera pione altroue ne discorre in maniera parimente, che serue per confirmare il mio sentimento, perche, al riferire del Siluatico ^{a c. 67. pag. 60.} nell'opera citata, parlò di modo in Arabico, che così suona in latino Scheha idest *Stachados citrinum*, ò più tosto *Stachas citrina*, est *absynthium marinum habens minutum semen, simile semini plantæ, quæ dicitur abrothoum*: & non est amara herba sicut absynthium, & habet odorem grauem, figura eius est in apparentia sicut planta absynthij, il che tanto s'adatta alla desferitione del Serifio di Dioscoride, che pare souerchio il dubitare, che la Scheha non sia vna istessa pianta con l'Assenzo marino.

In confirmatione di che Auicenna ^{a c. 668 p. 79.} con l'espositione del Gentile, mà secondo la traslatione di Gerardo Sabionetta Cremonese, trattando di questa pianta, lasciò scritto. *Scheha sunt due species, vna earum est spinosa, & c. alia habet folia, vt Tamariscus. Reperitur, & species tertia, quæ nominatur Stechas citrina Armena, & nominatur absynthium marinum.*

Così stimo prouato a bastanza ciò, che proposi, ed in conseguenza, che la Scheha de gli Arabi, il Santonico Giudaico del Bauino, la Stecade citrina di Serapione, la Stecade citrina Armena d' Auicenna, il seme contralumbri, & il Santonico del Rauolfio, altro non sono, che sinonimi del vero Serifio, ed Assenzo marino di Dioscoride, la figura del quale rappresento in questo luogo leuata dall'istoria sopracitata di Lione; ciò faccio, perche sia maggiormente conosciuta questa rara pianta da studiosi della professione, tanto più, che questo libro non è così facile d'hauerlo, anzi difficilissimo a ritrouarlo, che perciò da pochi può essere creduta: la porto quiui, con le stesse parole, che in detta istoria trouo notate.

SCHEHA ARABVM ABSYNTHII GENVS.

Circa Bēblehem prouenit copiosum Absynthij genus, folijs cinereis, quale est nostratis: ramulis tenellis multis, in quorum vertice, semen copiosissimum est grauis odoris, qui nauseam moueat, etiam valde molestam, gustu acre, salsum, ama-

rum . Hanc Plantam Arabes Scheha vocant . Semen huius minutissimum est, semen Zina, lumbricis necandis vtilissima, quamobrem semen contra vermes Mercatores, qui vendunt, & emunt, nuncupant .

Afsitra, ouer' Arbore di S. Tomafo, in lingua Arabica detto Kethefnar.

Cap. 20.

Fig. 15



On mi ritrouo di questa pianta descrittione alcuna, ma solo la figura, copiata da quella, che cauò il P. Matteo della pianta originale, ne quì si porta, che per la strauaganzia delle sue foglie, e speculatione de' curiosi Simplicisti, sin canto, che di lei comparisca maggior relatione. Christofo- ro Acolta » descriuendo le qualità, e virtù

a pag. 21. & 5.

dell'Arbore Macer, tanto celebre appresso a gl' Antichi, dice, che li Christiani del Malabar lo chiamano Arbore di San Toma, ma egli è molto differente da quello, che hora da me vien figurato, ne si può dubitare ch'ella non sij vn'altra pianta, come si vedrà dalle loro Istorie.

Bambagia di Pernambuco Arborea.

Cap. 21.

Fig. 16



I questa specie di bambagia non trouo chi ne faccia mentione altri, che Pietro Martire nel suo libro *de Rebus Oceani, & noui Orbis*, mà alla sfuggita. Et il Lerio nelle sue osservazioni, e viaggi del Brasile con queste sole parole. *Arbores bambacem ferentes abundant in Brasilia medio- cris sunt altitudinis, flores campanulis similes ferunt*

luteos instar cucurbitarum vel citrulorum, Fructus maturus accedit ad figuram Fagi, qui in quatuor partes etiam finditur, Bombax (Cotton) Americanis dictum Ameni-ion, ex ijs pendet magnitudine paruarum pilarum in medio, grana nigra simul arte iuncta renem exprimentia, Faba non crassiora, nec longiora. Hoc mulieres Syluestres colligunt, & filum ex eo parant pro suis lectis, così citansi qu-
fi



ti Autori da Gio: Bauino, oue tratta de' semi di questo Arborfcello, dal medemo figurati à parte dell' imagine della Bambagia dell' Egitto.

a Tom. 1. l. 11.
cap. 13. pag.
347.

Della breue relatione, che portano i sopranotati Autori di questa pianta, io foggiungo ch'ella natami l'anno 1668. di seme del Brasile, mandatomi dal già P. Michel Angelo Guattini da Reggio Capuccino, crebbe nel publico horto, e nel priuato mio giardino, all' altezza della statura ordinaria d' vn huomo, ma hò per relatione, che nel suo natiuo paese s' inalza alla grandezza di cinque in sei braccia, il di cui fusto vicino à terra s' ingrossa quasi alla misura del pollice d' vna mano, e nel Brasile arriua alla grossezza quasi d' vn braccio humano; tanto il fusto principale, quanto li rami sono di materia legnosa, e coperti d' vna scorza lucida: quando l' arborfcello è ancora picciolo, e crescente, la scorza verdeggia, & è strisciata di linee di color ferrugineo; mà crescendo poi elle spariscono, restandone solo à luogo à luogo di color pauronazzo, sendo la medesima corteccia nelle parti verso le cime aspersa di macchiette varie, come nella figura, mà tutte uere, che rende la pianta molto vaga, macchiata nel modo, che il gambo della Serpentaria volgare, ouero Dragoncello maggiore di Dioscoride; mà però le macchie della mia Bambagia sono assai minori.

Il fusto piegato non si rompe, e lo stesso succede de rami, quali dilatandosi dal piede sino verso la cima, formano vn assai largo, e frondoso giro, e da nodi di tutta la pianta nascono foglie di forma molto varie, parte delle quali giungono all' ampiezza di quelle della Malua di Theofrasto figurata dal Tabernamontano nelle imagini, b creduta impropriamente essere l' Abutillo d' Auicenna, coime si comprende appresso il Pona. c

b Pag. 768.

c Pag. 109.

Le foglie di questo mio arborfcello sono frà loro di forma diuerse, cioè l' inferiori hora quasi rotonde, hora più lunghe, e taluolta ancora ouali; dalla metà in sù del fusto principale talmente mutano la forma, che fatte molto dissimili dalle inferiori sembrano non essere nate da vna stessa pianta; onde difficilmente si possono esprimere in descriptione; perche nel crescere che fanno i rami producono sempre foglie diuerse, come può vederli nell' imagine: le prime, che nel nascere dell' arborfcello spontano da terra, tondeggiano, le seconde, che à queste succedono, sono alquanto acute, le terze sono diuise da vna incisura, la quale si moltiplica nelle superiori à misura, che cresce la pianta, à tanto che quelle della cima si trouano da dette incisure diuise in sette parti, & all' hora s' assomigliano molto à quelle della Stafisagria, della Vite, & altre piante simili, dilatandosi alle volte in ampiezza assai maggiore di quelle del Platan.

Quelle poi, che sono ne' rami, seruono l' istesso ordine, se non che le prime, e più vicine al fusto di mezzo non tondeggiano, quanto fanno le prime, che sorgono da terra nel nascere della pianta, mà hanao nella cima

vna sola acutezza, che vâ sempre moltiplicando nelle superiori con incisure nel modo sudetto: tutte però appaiono segnate come il caule, & i rami di macchiette nere, & in particolare quando, sono nate di nouo; poiche nel crescere le macchie diuengono meno apparenti, restandone però sempre qualche ombra, & impressione; al di sopra sono colorite di verde chiaro, e di sotto biancheggiante, per causa d' vna certa lanugine tenue, che le ricuopre fino al contorno. La loro sostanza è membranosa, ma sottile, e sono rigate al disotto di nerature rileuate, & asperse di piccole macchiette oscure: le sostentano gambi sodi, lunghi, rotondi, e medollosi, puntati di nero, grossi nella parte, che si congiunge, ò al caule, ò a i rami, con due alette nell'istesso sito sottili, e di sostanza herbacea, vna per parte riuolte verso la cima della pianta.

Sorgono dal piede delle foglie, tanto del fusto maggiore, quanto de' rami altre fogliette intiere simili alle prime della pianta, che poi ne tramandano altre incise simili à quelle del secondo ordine: pressò di noi quest' Arboscello non produce fiore, quantunque lo facessi coltiuare con diligenza particolare, non solo per essere pianta rara, ma per hauere nome commune con la Famiglia de gl' Illustriss. Signori Conti Bombaci di Bologna, trà quali riuerisco in primo luogol' Illustriss. Sig. Co: Gasparo Istorico famoso di questa Città sua Patria: nè migliore riuscita hà fatto in altri luoghi d' Italia oue mandai del suo seme, segno euidente che l' aria di questo Clima non gli conferisce. Nulladimeno hò fatto soggiungere all' imagine di questa pianta la figura del suo fiore conforme al disegno, e relatione, che n' hebbi dal sopradetto Padre Guattini, da cui ne riceuei il seme, oltre che il Padre Fra Stefano da Rauenna pur dellà Religione Capuccina, habitante hora nel Conuento di questa Città, quale hà dimorato nelle parti di Pernâbuco circa quattordici anni continui, mi riferisce questo essere vn fiore di colore gialletto, fatto à modo d' vna campanella, con cinque leggiere merlature nell' orificio; e quindi resta verificata la citazione di Lerio da me di sopra portata; che *Flores campanulis similes ferunt luteos instar cucurbitarum vel citrulorum &c.* questo fiore è sostenuto da vn calice simile à quello, che sostiene il fiore del pomo granato, e caduto che sia, rimane nel calice vn pometto, che gionto alla sua naturale maturità, s'apre, e mostra i semi congiunti insieme l' vno con l' altro, come apunto dice Lerio *in medio grana nigra simul arctè innicta*, della grossezza, che si vede nella figura, & inuolti in morbida, e candida congerie di quella lanuginosa materia, che communemente è detta Bambace, la quale in questa pianta è più sottile, & assai più fina, che nell' altre congeneri.

La sua radice è facile à piegarsi senza rompersi, il che credo proueuire dall' essere ella filacciosa, e diuisa in varie diramazioni moderatamente

fig. XVI.



Bambagia Arborea

di Pernambuco

te sottili, alcune delle quali si stendono alla lunghezza di mezzo braccio; e dalla radice principale deriva parimente gran quantità d'altre radicette fibrose, e capillari, il loro colore è gialletto, & il sapore è simile à quello della pianta massima, da alcuni moderni Simplicisti chiamata Helenio Indiano, e da altri Crisantemo Peruviano, rendono però qualche portione di dolce al gusto, & hanno molto dell'efficace, partecipano del medesimo sapore, e siccità, anco le foglie, anzi la scorza del fusto, e de' rami, che gustate lasciano per qualche tempo la bocca arida.

Mi resta pure d'avvertire il Lettore, che nell'Istoria di Giorgio Marcgrauio, ove tratta delle piante del Brasile, si troua descritta vna certa bambagia Arborea, che pare à me diuersa della pianta, di che si tratta, benchè alcuni si sono creduti in contrario: per d'osservare li studiosi le diuersità, che frà l'vn', e l'altra vengono da me notate, e dijno tale sentenza, ch' à loro pare. Prima scriuendo egli il fiore della di lui bambagia lo fa di cinque foglie separate l'vna dall'altra, & aperto che sia si mostra di grandezza eguale à quella delle nostre rose volgari: produce le sue foglie herbacce, e sempre diuise contrè incisure per ciascheduna, la scorza è simile à quella del Sambuco, e il suo frutto di forma ouata; produce il seme della grossezza del Pistacchio, & altre particolarità, che la rendono notabilmente diuersa dalla mia Pernambucana. Giovanni Laet nelle sue annotationi sopra la precitata Istoria, parlando di questa pianta, dice d'hauerla coltiuita più volte, e che sempre gli è riuscita di poca vita, e trattando del di lei seme, così ne discorre. *Semen autem minus erat, quam Auctor noster prodit, atque adeo septem illius semina coniuncta, ut plerumque sunt, non multum superant molem nuclei pistaci.* Quindi io argomento, e probabilmente si deue credere, che nel Regno del Brasile si trouino due specie di Bambagia, e che il seme di quella, che descrive il Laet, sij diuerso da quello del Marcgrauio, mà più tosto pare s'accossi al mio, ch' appunto nella forma, e nella grandezza si conosce per simile à quello ch' egli scriue.

Crebbe questa mia Bambagia in maggior altezza di quello, che per l'auanti si sij notato, nel Giardino del Sig. Giuseppe Fornioni mio Nepote habitante nella Città d'Imola, nella materia de' Fiori, e piante rare molto intelligente, il di cui seme hebbe da me con altri, qual seminato s'alzò la di lei pianta all' altezza assai maggiore della sopracenata, producendo ancor foglie più ampie delle prescritte; non potè però produrre il fiore, che oppressa dall' indemenza dell' Inuerno fù stretta il perirfene; Questa, per vederla congenere alle altre specie per l'auanti da molti Autori descritte, mi presumo non li sij inferiore nelle virtù, che oltre il fabricarne tele sottilissime con la di lei lanugine, sijno ancora di sicurissimo rimedio li suoi semi à flussi di sangue, & che della loro mucilagine si seruino contro

d. Zdit. 1. lib. 2.
cap. 2. pag. 199

le feбри ardenti à difetti del petto, & ad' infiniti mali anchora, quali per non dilungarmi tralascio.

Bonduch, Pianta Indiana.

Cap. 22.

Fig. 17.



I questa Pianta non hò altro, che la semplice imagine cauata dalle figure del Padre Matteo, con i seguenti nomi di Gadgenda, di Bonduch, di Kaeck, & olio di Gatto, vi si ritroua ancora qualche poco di descrizione, e virtù, iui scritte ne' proprij volumi, delle quali non ne curai come quello che doueua produrle alla luce,

pongo quì la sua figura, per essere meglio espressa, che non è in altro luogo, massime dandosi ancora miglior Imagine de' frutti con li loro primi inuolti, che non sono appresso altri, che dal Clusio, e questi stessi portati da Giouanni Iuston nella Tauola 84. della sua Istoria, gli aggiungo ancora li frutti nudi, e liberi dalla sudetta prima scorza spinosa, che mi trouo nel mio Musco, altri di colore cinereo, & altri di color citrino, quali trouarà il Lettore lateralmente nell' imagine figurati. Fù questa Pianta espressa, e descritta da Gio: Pona nella descrizione del suo Monte Baldo, ^a trattando della pianta, e del frutto, con le seguenti parole.

Questo frutto, per quanto l' Illustriss. Contarini me ne scrisse, è venduto in Alessandria d' Egitto da' Turchi con nome di Bonduch, ascriuendole gran virtù, & in particolare, (come mi fu scritto dal Sig. Gio: Maria Danioto nella cognizione delle piante versatissimo) che portato adosso da' Fanciulli, gli preserua da mali euenti, (nel modo che Plinio scrive della Pictra Molochites, chiamandola Custodia infantium) ualere al morso de' Scorpioni, toglie l' Emicrania ricuendolo in poluere sottilissima per le narici, & sana la tortura della bocca; conferisce all' Epilepsia, & la quantità sua esser il peso di due grani di Pepe, beuuto nel vino, alla quantità di un cece, sanare il colico, la febre quartana, & resistere à tutti li Veneni: le quali virtù quanto di lui proprio siano non saprei dire, per non hauerne veduto esperienza, e questo frutto le fu mandata da Costantinopoli, asserendolo tali facilità, & esser iui in gran prezzo.

Questo è di grossezza di una Nocciola, liscio, splendido, di color di cenere, di molta durezza quasi di sasso, tutto che gettato nell' acqua sopra nati: ineguale, alquanto schiacciato, come ne' Pisi si vede, mentre nel proprio Lobo del luogo couendono, il che accenna anco il Clusio, mentre egli descrisse il primo frutto peregrino nel




fig XVII

Bonduc Frutice Indiano~

no nel 30. Capo dell' undecimo Libro de gli Esotici in tutto à questo nostro confacendofi . Nè lascierò di dire come lo stesso Clusio con sue lettere delli 12. d' Agosto 1605. mandacemi da Leon d' Hollanda menire mi communicò buon numero di cose peregrine, mi mandò anco un Lobo tutto spinoso, il quale conteneua questo stesso frutto, di cui parliamo; il quale tuttauia riseruo insieme col' suo involglio, sopra del quale era scritto di proprio suo pugno, Lobus Echinoides, ch' è quello appunto, ch' egli stesso rappresentò nel terzo Libro de gli Esotici al capo decimoquinto nel cui luogo egli riferisce esser chiamato in Spagna Matas de India pardo, che tanto suona, quanto Legume Indiano di color di cenere . Questo Lobo è di color, che nel rosso nereggià misto di pallido, di sottil membrana, carico di fortissimi spine, & nell' interna parte liscio, & assai delicato; entro vi era il nostro Bonduch Indiano, unito, & dalla siliqua diviso . Da questa specie di frutto è nato la pianta, della quale habbiamo dato la figura, con caule legnoso, la quale s'è innalzata il primo anno all' altezza di tre palmi, ramosa, & carica di spine, con otto, & più ordini di foglie per cadaun ramuscello, di forma mirtina, se bene alquanto più appuntate, (tuttoche il tagliatore le habbi mostrate rotonde) lisce, & simili di colore, & queste disposte, come quelle del Lentisco, rimanendo anco nell' ultimo suo ordine pari, come in quello, nè altro per adesso posso dire più chiaramente d' intorno à questo. Aggiungerò solo, che il frutto di questa pianta (ancor che di rado) si vede di color citrino, vno de' quali ultimamente hebbi dall' Illust. & Eccell. Sig. Gion. Prevorio Lettore publico nel Studio di Padova, e mio gran Signore.

Di questo frutice Giouanni Iustone, della sua Istoria sopra nominata, ne porta altre relationi, cauate dal Bauino, e da Giorgio Marcgrauio nell' Istoria Brasiliana notate con le seguenti parole.

De Bonduch Indorum, quæ alijs Matas Indorum cinericijs coloris, hoc duntaxat habeo, arborem esse spinosam, folijs Lentisci, quæ fert lobos fuscos, subrubentes, frequentibus pinnulis hirsutos, cortice membranaceo, quibus aliquando singuli, aliquando bini fructus, instar magni pisi, coloris ex albo cineracei, paruo hilo fusco, adeò solidi, & duri putaminis, ut saxei viderentur. Ex conflatis albus Nucleus amarissimi saporis exilit, Baubinus, e æuellana magnitudine, splendet, durissimum, & cinerei coloris habuit. Quidam Bonduch, nonnulli Milium Indicum appellant. Adfertur ex Iaua, Syria, Brasilia, & Virginia. Marcgrauio sub nomine Inimboy Brasiliensium ita describitur. In Cynosbathi magnitudinem excrescit; caudex, & ramuli pleni spinulis hepatici coloris, lignum autem intus medullosum instar Sambuci. Habet in quolibet ramo multos ramulos directè oppositos; in ramulis porro folia iidem opposita à quatuordecim ad viginti in vno ramulo, qui inter quodlibet per foliorum duobus munitur aculeis, sunt autem folia latè viridia, splendentia, ferè cylindracea, & vnum circiter digitum longa. Flores fert in spicam congestos luteolos. Hos sequuntur Lobi spinosi, hirsuti, coloris cum maturuerunt hepatici; in quibus singulis continentur duo globuli

c. Physop. l. 11.
p. 118. 2. pag. 399.

buli durissimi, cinerei coloris, glabri, & splendentes, qui quassato lobo strepitem edunt: nucleus interior ex albo flavus, amarus saporis instar lupinorum. Lobus autem per maturitatem dissiliit, & effundit globulos.

Dirò qui vn mio parere, qual seruirà per auertenza al Lettore; che questi due Fruttici peregrini, che sono appresso al Marcgrauio notati, cioè del Bonduc dell' Indie Orientali, & il Bonduc del Brasile quiui notati nell' Istoria sopranominata di Giouanni Iunston, & al mio credere penso siano piante ambedue l' vna dall' altra differenti, tanto più ch' io offeruo, l' vno hauere le foglie mirtine, e l' altro del Brasile sono le foglie più lunghe, e dal sopradetto diuerse, come d' ambedue le descrittioni potrà offeruare chi legge, sì che queste non vna, ma due sono le piante.

Boragine Murale variegata con Fiore odorato di Candia.

Cap. 23.

Fig. 18



Oltiuasi nel Giardino publico, e nel mio priuato vna rara specie di boragine, nata di tempo venuto di Candia, ch' io conferuo, riseminandola ogni anno à Primavera, & all' Autunno per essere pianta annua, la quale, come mi vien riferito, nasce trà le pietre delle mura di Candia, e non trouandola da altri Herbarij descritta, la

rappresento qui à studiosi Simplicisti.

Da vna sola radice affai longa, di grossezza mediocre, fibrosa, biancheggiante, di scorza grossa, che ricuopre l' anima legnosa germoglia vn fusto rotondo, di sostanza herbacea, hirsuto, aspro, e succoso, che s' erge all' altezza d' vn palmo, & in poco spatio, sopra la radicale corona produce molti ramicelli, che crescendo si dilatano sopra le pietre, e s' alzano altrettanto, e più del caule principale, & alcuni di essi ne producono altri congiunti al medesimo fusto.

Le foglie oltra le molte, ch' appresso la corona della radice sopra il terreno, e bassi si stendono, sono sparse per la pianta vna per occhietto, attaccate a i rami senza piedetto, simili a quelle della boragine volgare, ma molto più strette, vn deto lunghe, & in punta acuminate, e macchiate nelle rileuature, o foruncoli di color biancheggiante, simili in queste macchie à quelle di certa pianta figurata, e descritta dal Lobelio nell' aduersario

rio




fig XVIII

Boragine murale con fior odorato di Candia



ria, per la Cerinte di Plinio, e maggiormente ancora à quelle dell' Echio a pag. 171.
volgara.

Dalle cime de' rami nasce vn picciolo germoglio di foglie, frà quali sorgono i bottoncini composti di cinque fogliette verdi, & hirsute, come quelle della boragine volgare, li quali apprendoti mostrano vn fioretto composto d'altre cinque foglie di colore del fiore di Persico, e sono macchiate nel mezzo di paonazzo, che apparisce nella foglia tanto di sopra, quanto di sotto; il fiore prima di cadere cangia il colore persichino in vn turchino, & il rosso in porporino scuro; perloche auuiene, che nella medesima pianta, e nell' istesso tempo vedonsi fiori diuersamente coloriti; onde rendono con la loro varietà, e vaghezza, gran diletto alla vista. L' odore del fiore è di fragranza grande, similissimo à quello de pomi Persici inaturi.

Caduto questo fiore rimangono pel mezzo del calice stellato quattro piccioli semi verdi, insieme congiunti, come s' offerua nell' imagine a parte, nella loro grandezza naturale, li quali maturandosi diuentano di colore oscuro, e veduti col microscopio appariscono di forma tondeggiante, & in vna delle parti, che è di colore castagno, sono quasi che lisce, e nell' altra coloriti variamente di chiaro, e scuro, e di forma ineguali, & al tatto aspri, con varie solcature, che le circondano, e fanno in essi varie rilieua- ture, con vna incauatura per ciascheduno assai profonda, che nel mezzo s' ingrossa, & hanno da vna parte vna punta, che gli fa rappresentare giustamente vn capo humano armato con l' elmo: le foglie, e la radice non spirano odore se non herbaceo, con sapore insipido. Questa pianta è annua, ma cadendogli il seme si moltiplica da sè, e si diletta di rinascere trà le fisure de' sassi, e pietre del giardino, più che in altro luogo, anzi traspiantata nel terreno grasso, ò troppo humido, muore la pianta.

Dioscoride, b secondo l' interpretatione di Marcello, c trattando delle virtù del suo Buglofo, che secondo molti è la boragine volgare, anzi con questo nome di Buglofo la chiamano ancora gli Oltramontani, scriue, che quella che produce trè fusti, e che trito il seme con tutta la pianta gioua beuuta contro il rigore della febre terzana, e quella, che ne produce quattro, contro la quartana: cotta nel vino, dicono essere vtile ancora alle posteme: infusa la Boragine per vn giorno nel vino, e quello beuuto rallegra, e consola l' animo. b Cap. 127.
c pag. 141.

Galeno nel libro sesto, secondo la traduzione d' Andrea Lacuna, d delle facultà de' semplici medicamenti, trattando del Buglofo, scriue essere di calido, & vmido temperamento, e che pigliata nel vino, si crede portare nell' animo allegrezza, con queste parole dicendo: *Humida calidaque temperiei est: vniisque iniectum hilaritatis causa esse creditur, sed gusturis etiam lenis aspredinem, si melicrato coctum sumatur.* d pag. 111. l. 6.

Che

Chè cosa si potrà dunque argomentare di questa rara, e nouella boragine, che spira dal suo fiore odore sì grato, che formalmente sembra essere vn specifico antidoto, & vn preseruatiuo, e confortatiuo tanto cordiale, quanto quale altro; che produchi qualsiuoglia altra pianta? Stimò dunque questa essere di virtù non solo eguale alle altre congeneri; mà di gran lunga maggiore, bèn che sin'hora non se ne sia potuto fare esperienza alcuna, stante la rarità di lei.

Boragine Siluestre annua di Candia.

Cap. 24.

Fig. 19



La Boragine murale di Candia ne succede vn' altra Siluestre del medesimo luogo, quale cresce in altezza poco meno d'vn cubito, cò fusto rotondo, ondosò, peloso, tenero, succoso, e pieno di midolla verde, composto di rari nodi intrecciamente, & inegualmente posti, mà che verso le cime s'vniscono, e da questi nascono le sue foglie sempre vna per nodo, delle quali l'inferiori sono lunghe vn deto, e proporzionatamente larghe, aspre al tatto, e nella parte di sotto, e nel contorno irsute, con peli duri, e pungenti, trascorrendogli nel di sotto vn neruo assai rilcuato, che nella faccia d'essa lascia vna sottile folcatura, oue alle volte sono strisciate di certe macchiette biancheggianti, nel modo, e forma, che sono quelle dell'Echio volgare. Sono queste foglie senza pedino alcuno al caule congiunte, anzi che il caule medesimo ne resta alato, come ben offeruasi nell' imagine, e nel crescere, che fa questo fusto verso le parti superiori, tramanda due, ò per lo più ch' habbia offeruato nella pianta, tre rami dipartiti con foglie simili alle sopranotate, benchè molto minori, nella di cui cavità nasce vn breue, e rotondo pedino sopra del quale stà vn bottone, ouero ricettacolo ventricoso, irsuto, aspro, con cinque denti nell' orificio, simile à quello del Solatro verticillato, ò sia Solatro sonnifero dal Mattioli descritto, mà questi dalla mia pianta sono di ricettacolo più larghi, e portano nel Mese di Maggio vn fiore lungo, fatto à campanella, simile à quello della Polmonaria volgare, dal Dodoneo nell'Istoria chiamata, ^b Sinfito maculoso, mà questo della mia Boragine Siluestre è molto minore, e nel ricettacolo più largamente dentato, e senza odore alcuno.

^a Nell'edizione
Veneta del
1617 è 4. 184.
cap. 25. & in
altre ancora,
b lib 5. p. 135.
pomp 1. cap.
16.

fig. XIX



Boragere Sil'ana di Candia

Stà nascosto questo fiore nel medesimo luogo, etiamdio fiorito, anzi à pena comparisce con le sue punte fuori del ricettacolo medesimo; il suo fiore è composto d'vn morello tanto scuro, che chi bene non l'offerua, lo giudica nero, anzi da certi fù questa pianta, e con ragione, per Boragine Siluestre Cretica di fior nero chiamata, e nel mezzo d'esso si scorgono cinque stami, ouero filamenti bianchi, in capo de' quali vi stà vn' apice dello stesso colore.

Caduto che sia questo fiore rimangono nel stesso luogo li suoi semi insieme congiunti sino al numero di quattro al più, ch'io habbia offeruato, di forma simili à quelli della sopradetta Boragine di fiore odorato, e s'assomigliano ad'vn Elmo di ferro con il collo, nel contorno è tutto strisciato di coste rileuate, & increspate, che variamente, & elegantemente lo circondano, lasciando in essi strauagante, e bizzara solcatura. Il suo colore immita quello del muscho; hà nel fondo vna cauità rotonda, nel mezzo della quale stà vna rileuatura, che sembra vn ombelico. Nella figura rapresentansi al naturale il ricettacolo, fiore, & il seme sì separato, come vnito. E' pianta annua.

La sua radice è succosa, bianca, sottile, fibrosa, e senza odore alcuno. Le foglie sono di sapore insipido, e lasciano alla bocca molta siccità.

Boragine Siluestre perenne di Candia di fiore rosso Cremesino. Cap. 25.

Fig. 20.



La sopradescritta Boragine Siluestre annua ne aggiungo trè altre spetie, che per quanto mi vien referito sono natiue del medesimo luogo di Candia, quali nelle loro foglie sono poco diuerse l'vna dall'altra, anzi, mentre non si vedono fiorire, non si conoscono, pur tuttauia le descriuo qui breuemente con quelle loro fattezze, e qualità che hò conosciuto, e che in esse hò trouato, le quali sono nel mio horto, & alcune di queste nel Giardino publico ancora. La prima dunque d'esse cresce in altezza d'vn cubito e mezzo, e porta dalla sua radice vn cespo di foglie, parte diritte, e parte sopra al terreno distese, lunghe circa ad vn palmo, larghe quasi quanto sono due dita ristrette insieme; sono nel di sopra di color verde, che biancheggia, e nel di sotto palide, coperte di pelli sottili, che tutte le foglie, e caule inuestono, e sono di sostan-

G

za te-

za tenere, succose, & in ogni parte al tatto aspre, trascorse da vn neruo, che nel di sotto si rileua, e lascia nella parte superiore vna solcatura fottile; queste foglie, e tutta la pianta hanno simiglianza con quella, ò almeno con l' imagine, che porta il Mattioli sotto nome di Buglosa Siluestre terza, figurata ne suoi Comentarj sopra Dioscoride, massime nell' vltima Edizione di figure grandi, anzi che à prima vista l' haueuo creduta la stessa, mà offeruata poi, che questa del sudetto Autore porta fiori disposti, dirò quasi che in forma d' ombrelle, che quella di che si parla sono spiccati, anzi questa hà le sue spiche adunche, e riuite insieme, come sono quelle dell' Echio, dell' Elitropio, e della Buglosa volgare, ch' è la seconda Buglosa volgare del medesimo Autore, quale nel crescere, che fanno s' allungano in forma di spica, ne vedendosi in questa, di che si tratta, fiori neri, ne scriuendosi iui poco, ò niente delle fatezze della di lui pianta, fui costretto à partirmi dalla mia opinione, e creder la Boragine Siluestre qui proposta, altra pianta.

Hà la seguente Boragine Siluestre qualche somiglianza ancor con vn altra, che figura, e descrive Prospero Alpino nell' Enotici, ouero nel trattato delle piante peregrine, b quale m' hà fatto similmente dubitare, che quella che qui si scrive sij la stessa, che lui propone nelle sopranotate pagini sotto nome d' Echio di Candia, mà hauendo io fatta riflessione, che la pianta dell' Alpino porta quasi ombrelle, come pure esso scrive, e porta rami con i suoi fiori disposti tutto al contrario, che spiccati, con altre qualità opposte à questa, ch' iui si leggono, mi fanno scostare di nuouo dal mio parere, e creder la mia pianta, esser dalla sopranotata dall' Alpino diuersa; varia questa Boragine Siluestre da due altre piante di Candia, descritte senza imagine dal Clusio nell' Istoria delle piante rare, e con nome d' Ecchij di Candia, portando questi fusti sanguinosi, e fiori in altra guisa disposti.

Dunque dalla corona di questa radice, e dal cespo delle foglie spunta vn fusto, & alle volte più ancora, di forma rotondo, coperto di pelo assai aspro, alto circa ad vn cubito, e mezzo, di forma rotondo, che piegato non si rompe, e rotto, e tagliato che sia, si mostra pieno di midolla verde, e succosa, da ciascheduno di questi nascono foglie irregolarmente poste sopra essi, e sono senza pedicciolo alcuno, al loro gambo annesse, e nell' arriuare, che fanno questi verso le cime tramettono molti bottoncini insieme vniti, disposti, come sopra si disse, in forma adunca, che nel crescere, e nel fiorire che fanno à poco à poco si distendono in assai lunghe spiche, quali nell' approssimarsi il fine d' Aprile, danno principio, e mostrano vn fiore della forma della sopranominata Buglosa volgare, mà però di gran lunga minore, e di colore rosso cremesino, che si rende

a Lib. 4. ca. 130
pag. 1247.

b Cap. 19. pag.
129. e 130.

c Lib. 5. cap. 50
pag. 105.

fig XX



Boragine Sil' di Cardia

con fior rosso Gemesino

rende alla vista molto vago, composto di cinque fogliette, nel mezzo delle quali stà vn Ombelico diuiso in cinque parti, di color azzurro lateo.

Caduto che sia questo fiore, rimane nel ricettacolo il suo seme della forma della sudetta Boragine Siluestre annua di Candia, mà questo è vn poco minore, e nereggiante. La sua radice è assai lunga, di color castagno, massime verso le parti superiori, contornata d'altre radici sottili, e biancheggianti, di sapor dolcetto, ch' immita quello della Faua fresca, e lascia in bocca qualche siccità, si come ancora quello delle foglie, che in questo corrispondono assai con quello della Buglosa vera, ouero della Boragine volgare. E' Pianta perenne.

Boragine Siluestre di Candia di fior morello.

Cap. 26.



Ono le foglie di questa pianta composte di vn color verde oscuro, & in quanto alla positura della pianta non è molto dall' altra diuersa, porta i suoi cauli assai più pelosi, e sono al tatto più aspri, e produce i suoi fiori nel modo della sopradetta, mà di color morello, alquanto maggiori però. E' Pianta perenne.

Boragine Siluestre di Candia di fior azzurro.

Cap. 27.



On è molto dissimile dalle sopr'accennate quest' vltima Boragine, differisce solo nella figura delle foglie, per esser queste crespe, & al tatto più aspre dell'altre. Cresce poi la pianta solamete all' altezza poco più d' vna spana, di fiore simile alla sudetta d' vn viuo colore azzurro, come quello della Boragine volgare; appreso gl'Autori non trouo di queste alcuna menzione,

saluo che ne hò vedute due registrate nell'Indice di Padoua, e stãpatol' anno 1662. dall' Illustriss. & Ecc. Sig. Giorgio dalla Torre, Professore ordinario, e del medesimo Horto Ostensore delle piãte, e dignissimo Prefetto, nominandone al mio credere di queste vna con fiore azzurro, & l' altra di fior rosso; ne uota similmente vn' altra di fior variegato, m' immagino questa sia la prima Cretica da me auanti descritta di fior odorato, e variegato.

2 pag. 17.

Bosso con foglie orlate di giallo.

Cap. 27.



A strauaganza di questo Arboscello merita d'esser accompagnata con l'Aranzo della Bizzarria sopradescritto, che se quello è marauiglioso per vn verso, questo è per vn'altro.

Di questo gl'Anni passati mi fù mandata la pianta dalla cortesia dell'Illustriss. Sig. Giosepe Cafali Dottore, e Senatore di Mantoua, Cauagliere nobilissimo di quella Città, iui in quella Corte introdotta, e portata di Fian-dra con altri Bulbi rari dall'Eccell. Sig. Dottore Nicoldù Ponchaù altre volte in questa mia Istoria nominato, e perche le foglie, che colà produsse questo Bosso il primo anno non corrisposero all'effetto della pianta primiera, e non furono al solito orlate di color giallo, anzi tutte al contrario, restando affatto verdi, diedero materia di dubitare essere così da artificiosa mano colorite, effetto partorito ancora in questo clima Bolognese; la cagione di ciò parmi procedere dall'adolefcenza della pianta nouella, che poi cresciuta alla sua perfezione, ouero almeno all'altezza di due braccia, allora se ne ritorna, come hà fatto nel mio Giardino, alla sua prima origine, con essere le sue foglie tutte orlate di giallo dorato, come à basso si descriue, bizzarria in vero strauagante, & alla vista molto vaga.

Questo non richiede molta descrizione, per esser pianta (al mio parere) dal Bosso nostrano poco diuersa, vero è, che hà molte circostanze assai dissimili dal Bosso commune, pure tuttauia dirò, che trouo differenza nell'vno, dall'altro; la pianta di che hora si tratta, porta le sue foglie maggiori dell'altra, più lucide, e di colore verde più chiaro, e nelle cime più acuminate, queste sono al tatto più dense, più crasse, e di sostanza più polpose, e più folte sopra la pianta; portano questa prerogatiua, che son nel sapore meno amare di quello, che sono le foglie del Bosso volgare, e sono circondate da vn orlo di color giallo dorato, che penetra sì nella parte superiore, come nella posteriore, e si rende ne' contorni trasparente, anzi che nell'Autunno, & Inuerno alcuna volta quel giallo dorato biancheggia, massime nelle foglie, che riguardano all'insù, anzi nella parte superiore, che verdeggia, in particolare verso le punte delle foglie, si cangia il color verde in rosso miniaceo, sì che fà vn'effetto tanto vago, che pare cosa più tosto artificiale, che naturale. Porta questo Arboscello il fiore, e frutto del volgare, e nostrale vn pecco maggiore.

Inten-

Intendo trouarsi ancora la stessa pianta, non solo con le foglie orlate, come questo, mà ancora nell' interno, ò in mezzo delle medesime penacchiate dello stesso color giallo dorato, cosa inuero, che sarebbe molto rara, & elegante; mà fino ad hora di tal Bosso non hò certezza veruna, ne (ch' io sappia) s' è ancor visto in Italia.

Non trouo del Bosso volgare appresso Dioscoride commemorazione alcuna. Teofrasto però non tralasciò di notarlo, imperòche dal Bodeo, * e da Teodoro Gazza in diuersi luoghi della sua Istoria, e particolarmente nell' interpretazione, che fà del sudetto Teofrasto, ^b così lasciò scritto *Bruxus magnitudine non excellit, folio Myrto similis est*. Plinio ne rappresenta tre spetie, anzi più d' ogn' altro Autore, ne hà lasciato scritto, come nell' Istoria del Dalecampio ^c si legge nella seguente forma. *In primis verò materies honorata Buxo est, rarò crispicanti, nec nisi radice; ceterò lenis quies materia, silentio quodam, & duritie, ac calore commendabilis: in ipsa uerò arbore topiario opere. Tria eius genera. Gallicum, quod in mentas emittitur, amplitudinemque prociorem. Oleastrum in omni usu damnatum, grauem praefert odorem. Tertium genus nostrate vocant: syluestre, ut credo, mitigatum satum: diffusius, & densitate parietum virens semper, ac tonsile. Buxus Pyreneis, ac Cytarij montibus plurima, & Berecynio tractus crassissima in Corsica; Flore non spernendo: quae causa amaritudinis mellis. Semen illius cunctis animantibus inuisum. Hac in Olympo Macedonia gracilior, sed breuis. Amat frigida, aprica. In igni quoque duritia, quae ferro, nec flamma, nec carbone utili.* Pietro Andrea Mattioli ne' suoi Commentarij sopra Dioscoride, e nell' vltima con figure grandi nel trattato del Licio ^d fà commemorazione delle facultà di questo Bosso volgare, appropriando la decotione del sudetto à quella del Legno santo, per sanare il mal Francese, reprobà perciò il Lusitano (e con ragione) che forse dà questa facultà habbia lasciato senso, che esso Bosso sia il Legno Santo, pianta tanto da questa diuersa. Remberto Dodoneo nella sua Istoria ^e scrisse, che le foglie di quest' Arbore partecipino di qualche facultà astringente con siccità, dicendo esser fuori d' ogni ragione il credere, che le cime di questa pianta s' occorriano gli apoplectici, per essere l'odore del di lei frutto molesto alla testa, e poco in vso nella medicina, mentre pure l'istesso rigetta l'opinione di quelli, che credettero, che il legno di questa pianta possi in vece del Legno santo nella medicina vsarsi, non essendo, secondo ancor l'opinione d' altri, buono se non per lauori artificiali, per riuscire vago alla vista.

a Lib. 3. cap. 19
pag. 132.
b Lib. 3. cap. 19
pag. 69.

c Lib. 16. cap.
16. pag. 320.

d Lib. 1. cap.
113. pag. 101.

e Lib. 2. pag.
783. jump. o.



Draba legitima di Dioscoride, Dryofno di Plinio,
e Nasturtio Orientale di Serapione.

Cap. 29.

Fig. 21



On nome di Arabide, ò di Draba si troua questa pianta descritta in Dioscoride nella maniera seguente, secondo la tradnzione d' Hermolao Barbaro. *a Draba cubitum alta est. Herba gracilibus virgulis, quarum latera vertimque vestiunt folia: quæ Lepidij viderentur, nisi teneriora essent, candidioraque*, dubito, che non debba leggerfi

senuiora, per la ragione, che dirò più a basso, *in cacumine umbella, ut sambuco: & in ea flos candidus: huius herba incoquitur pisanæ frequenti Cappadocum cibo seminibus pro pipere in obsonia vtuntur*.

Ma perche questi nomi di Arabide, ò di Draba non sono greci, ne meno latini, molti hanno dubitato, che questo capitolo non sia legitimo di Dioscoride, e frà gli altri lo prouano accerrimamente Marcello Virgilio, ^b il Mattioli ne' Commentarij con figure grandi, ^c e nell' Epistole, ^d massime non leggendosi questi nomi presso altro Scrittore antico. Il che auuiene perche questi non sono i veri nomi di detta pianta, la quale deue chiamarsi Braba, come si deduce dalla serie alfabetica delle piante di Oribasio, ^e & come fù interpretato da Gio: Battista Rasar da Nouara suo traduttore, il quale descrive questa pianta con nome di Braba, con le parole di Dioscoride nel tenore della stessa Braba, dicendo: *Braba herba est cubiti altitudine, tenues ramos multosque spargens: & ex utroque latere folia, ceu Lepidij, sed molliora & candidiora, in summo umbellam gerit sambuci figura, in qua candidi flores insunt*, donde segue, che il capitolo di Dioscoride è legitimo, & il nome di Draba falso. Fece la medesima offeruatione l'eruditissimo Bodeo ne' Commentarij sopra l' Istoria di Theophrasto, /oue nota l'etimologia Greca, cioè che *βράβη* dicitur παρὰ τὸ βράβηρις, quod palmam ferat, superetque sua prestantia reliquas plantas obsonio dicatas. E forsi Plinio s' intese di questa medesima pianta (come auuertì il Cordo nelle note sopra il luogo citato di Dioscoride) & nel trattato dell' Araba, anzi più tosto Braba, ^f quando scrisse il Dioscono i secondo le annotationi del Dalecampio, seruendosi de i termini, e parole proprie di Dioscoride, trattene due, ò tre, che sono in sospetione d' errore, *Dryofnon* (scrive egli dopò hauere trattato della Driopteris) *similis herba est, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumda-*

^a Lib. 2. c. 390.
pag. 45.

^b Lib. 2. c. 146.
pag. 289. &
290.

^c Lib. 2. p. 601.
& 602.

^d Lib. 4. p. 298

^e Lib. 11. pag.
414.

^f Lib. 7. cap. 4.
pag. 706.

^g Lib. 2. cap.
187.

^h pag. 46

ⁱ Lib. 27 cap. 9
pag. 608.

fig XXI



Braba di Dioscoride

*cum datis utrimque folijs, Policarij amplitudine, qualia Oxymyrines; sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sambuci, edunt cauliculos decoctos, semine vero eius pro pipere utuntur; resta d' auertire, che dubito, che quella parola Oxymyrines non sia legitima di Plinio, non hauendo similitudine alcuna la pianta di che si tratta (s' ella è il Driofno) col Rusco dal medesimo chiamato Oxymyrine, se non si volesse dire, che sendo da certi il Rusco stato detto *Acaron*, come si legge in Plinio con le stesse aggiunte del Dalecampio,^k questo nome esser stato confuso con l'Acoro, pianta più simile à questa nelle foglie de' fusti; la di cui radice alcuni hanno chiamato Oxymyrine, come nota il Ruellio^l della natura delle piante.*

Il Gesnero però nell'Istoria delle piante^m descrive il Driofno separatamente dalla Braba, errore manifesto, attesane più la diuerità de' nomi, che dell'essenza, sendo questi due nomi vna pianta stessa; ne diuersa da questa mi pare quella pianta, che li Arabi chiamano Nasturtio Orientale, descriuendola Serapione con i sentimenti di Dioscoride nella Braba, in questo modo, come fù interpretato da Simone Genouese, *est planta longa circa duobus brachia, habens ramos subtile, & multos, in quibus sunt folia, a duobus lateribus similia folijs Saccaragi* (questo è il Lepidio, come mostrò à suo luogo) *nisi quia sunt altiora & molliora: & in summitatibus ramorum sunt capitella similia capitellis plantae Actis* (ch'è il Sambuco) *& habet flores albos: coquitur autem haec planta cum Kist ordi & comeditur & proprie in Regione Flarochia, & semen eius ponitur in cibis loco piperis.* Del medesimo parere fù il Cordo in Dioscoride nel luogo mentionato, o Il Mattioli^p nell'ultima editione con figure grandi l'affermdò parimente specie di Braba, accennandola però differente dalla sua, che non è di sapore segnalatamente acuto, come il Nasturtio Orientale.

Per la Braba sudetta di Dioscoride, communemente hoggi si propogono varie forti d'Esperidi, che chiamiamo Viole matronali, contenute nel genere de Leucoij, ouero viole, di che ne diede qualche motiuo Gio: Bauino nella sua Istoria, & doue s'hanno figurate, e descritte due Esperidi Alpine, che sono la terza, e la quarta specie della Braba, da Gasparo Bauino suo fratello nouerate nella Fitopinace,^q e da esso poi accresciute, e distinte in otto classi nella Pinace,^r le quali piante non hauendo alcuna foglia laciniata, come il Lepidio di Dioscoride, che poco dopo mostrò, hauendole solo dentate, ne il seme acuto, come il pepe, non posso persuadermi, che siano la Braba del medesimo.

Il Dodoneo poi nell'Istoria, ^a per là Braba di Dioscoride, figura, e descrive vna pianta, che non può essere altrimenti quella, di che si tratta, per hauere questa le sue foglie di sapore amaro, con altre qualità, che nella Braba di Dioscoride non si ricercano, e poi per essere più tosto vna forte di

^k Lib. 15. c. 7.
pag. 355.
^l Lib. 2. cap. 2.
pag. 375.

^m In 2. p. 95.

ⁿ Cap. 359.
pag. 150.

^o Lib. 2. c. 127.
pag. 46.
^p Lib. 2. c. 146.
pag. 402.

^q Lib. 11. cap.
13 pag. 850.
^r Lib. 3. sect. 1.
in fine, pag.
174. e 175.
^s Lib. 3. sect. 2.
pag. 109.

^a Pemp. 5. lib.
4. pag. 713.
cap. 22.

te di Thlaspio, che nasce in Candia notato da Gasparo Bauino nella Pina-
ce, ^b il quale porta le foglie strette, picciole, e solamente dentate, e non
mai grandi, ne con larghe incisure diuise, come si ricerca nella pianta, del-
la quale si discorre.

Io per tanto mi faccio à credere, che la vera Braba di Dioscoride
non sia per anco stata conosciuta, il che auertì ancora il Cordo sopracitato
nelle note in Dioscoride, portate dal Riccio nella sua traduttione, *oue hà*
Draba officinis, & Germanis incognita. Il medesimo asserisce quell' Anoni-
mo, se pur non è il Cordo stesso, che notò i sinonimi delle piante iscritti
nella traduttione da Dioscoride del Ruelio, stampata con figure picciole in
Lione del 1552. in ottauo, ^d leggendouisi pur *Draba officinis incognita*, in
proposito di che, il Cordo sudetto, affermando essere vna cosa stessa, il Na-
fiurtio Orientale degl' Arabi con la Braba, lasciò scritto, *est autem Na-*
fiurcij genus, quod Arabes Orientale vocant, hodie ignotum. Di parere non
dissimile furono Amato Lusitano ne' Commentarij in Dioscoride, e l'An-
guillara nel parere. ^f

Stimo però d' hauerla ritrouata in vna pianta sotto altri nomi ben-
conosciuta, e descritta, mà non mai d' alcuno rauuifata per la vera Braba
di Dioscoride. Questa si è la terza specie di Raffano figurata dal Mattio-
li: nelle sue editioni in Dioscoride, massime nell' vltima con figure
grandi, e la quarta del Dodoneo, ^b e la quinta del Bauino nella Pina-
ce, ⁱ della quale non posso tacere quanto impropriamente si chiami que-
sta pianta Raffano volgare, non sendo ella forse alcuna di Raffano, non
che specie volgare trà quelli, mentre porta fiori bianchi, e foglie grandi,
e liscie, parte intiere, e parte laciniate, & hà le radici lunghe, sottili, e ser-
peggianti, trasmettendo varij germogli, e piante nouelle, come benissi-
mo viene espresso nella figura proposta dal Dodoneo nel luogo citato, e
dal Lobelio nelle osseruazioni nuoue, ^k per il contrario il Raffano ò bian-
co, ò nero, che comunemente si mangia nell' Europa, & altroue anco-
ra; (il quale perciò più conuenientemente si dourebbe chiamare Raf-
fano volgare) porta i fiori, ò gialli, ò purpurei, le foglie aspre, tutte inci-
se, e più corte la metà delle sudette, e non hà per l'ordinario che vna radi-
ce sola, grossa, non mai serpeggiante, le quali varietà bastano à mio giu-
ditio per mostrare, che la pianta di che qui si tratta, è di genere diuersa da
i Raffani. Pare, che accenni lo stesso anco Hermolao Barbaro nel Cor-
rolario, ^l oue afferma questa pianta essere il Lepidio di Dioscoride, come
giudicò parimente il Manardi nell' Epistole medicinali, ^m & altri ancora,
che per breuità tralascio, i quali se non colpirono del tutto nel segno, al-
meno, al mio parere, vi s'accoltarono più di tutti gli altri Scrittori, hauendo
in tale modo rauuifato nella sudetta Braba quelle note, per le quali Dio-
scoride la paragonò al Lepidio.

Che

b Lib. 3. fol. 2.
pag. 165.

c Lib. 3. f. 149
pag. 239.

d Pag. 286. lib.
3. cap. 149.

e Lib. 3. enan.
151. pag. 263.
f 11. pag. 272.

g Lib. 3. f. 104
pag. 467. 468.
469.
h Fern. 1. lib.
3. cap. 7 pag.
472.
i Lib. 1. fol. 1.
pag. 96.

k Pag. 173.

l Lib. 3. f. 409.
pag. 41.
m Lett. 9. pag.
271.

Che poi questa sia la Braba di Dioscoride, dal confronto delle di lei fattezze con la descrizione addottane, chiaramente si caua; perche questa è pianta, che cresce all' altezza d' vn cubito, ò poco più, trasmettendo hora vno, hora più cauli sottili, pieni di nodi, anzi più tosto occhietti positi egualmente sopra a' medesimi, con le foglie da basso de' cauli largamente, e sottilmente laciniate, & altre nel medesimo tutte intiere, e strette, e solamente dentate; ma però più molli, e più tenui dell' altre della pianta, e nelle cime porta i suoi fiori, comi si nota auanti, onde l' Eccell. Sig. Dottore Lorenzo Legati publico professore di lettere Greche in questa Città, il quale in Dioscoride legge *κύλλα λιπώτερη*, non *λιπώτερη* come s' hà in tutti gli esemplari, ed Autori, che citano, ò traducono questo Testo, il che è à dire, che hà le foglie nella parte di sotto grandi, lunghe, larghe, acuminate, dentate, e qualche volta incise, come s' offerua nell' imagine del Camerario nel Mattioli, ^{m pag. 225.} e meglio ancora in quella che si rappresenta, le quali sono come quelle del Lepidio, mà però maggiori, con nervi da tutte due le parti rileuati, come pur si vedono nel detto Lepidio, osservazione non più vista da me in altre piante: porta vn fusto pieno d' ombrelle, nelle quali sono i suoi fiori bianchi simili per appunto à quelli del Sambuco, à quali anco Dioscoride paragonò i fiori della sua Braba, composti di quattro fogliette, nel mezzo delle quali vi è vn' ombelico verde, che gialleggia, contornato di cinque in sei apici di color giallo, che caduti vi succedono alcune filique longhette, & ouate, con entro semi, che nella pianta non li hò offeruati, ne forsi qui non maturano, come fanno in altre parti ancora, di sapore per quanto m' imagino, acutissimi rispetto alle altre parti, che sono forti, e mordenti, conditioni tutte appartenenti alla vera Braba, i quali perciò amaccati puonno seruire per pepe nelle viuande, come vsauasi anticamente, per testimonio di Dioscoride. Nella Germania però, doue non matura il seme di questa pianta, come offeruò il Trago, ^{n Lib. 2. c. 63. pag. 734.} si seruono solo della radice ne' condimenti pistandola, & adoprandola con sale, & aceto. Non mancano tuttavia di quelli, che mangiono anco le foglie della medesima per companatico.

Non la descriuo più esattamente per essere pianta da molti à bastanza, mà sotto altri nomi, benche improprij, descritta. La figuro però, parendomi appresso alcuni non giustamente espressa, sendo fra questi stata competentemente, anzi meglio di tutti figurata dal Camerario nelle aggiunte sopra il Mattioli ^{o pag. 225.} con nome di Raffano Rusticano, e montano, dal Lobelio nell' osservationi, nelle imagini, & Aduersaria ^{p pag. 173. 210. 235.} fù con nome di Raffano Rusticano con foglia di Lapato, e di radice crassa, e di Senape Persiana, e di Thlaspio di Creteua di Dioscoride proposta, con sospitione ancora essere questa la Molibuena di Plinio, e del Trago ^{q pag. 734. l. 2. c. 63.} ne luoghi

mentouati, ma sempre per spetie di Raffano, e di Armoratia Radicee proposta. Bastami solo l'hauere toccato quelle particolarità, che me la fanno credere la stessa pianta con la Braba di Dioscoride, non sendo altrimenti questa forte alcuna di Thlaspio, ne di Raffano, ne di Senape, ne di Armoracia radice, come dalli notati Autori è stata creduta.

a Lib. 3. § 68. 2.
pag. 96.
f Cap. 255.
pag. 459.
g Pag. 416.
h Lib. 2. pag.
475.
a Pag. 160.
b Lib. 8. c. 78.
pag. 367.
c Pag. 241.
d Lib. 1. pag.
316.
e Prim. 5. l. 3.
pag. 277.
f Lib. 2. c. 148.
pag. 168. 169.
g Tam. 2. lib. 1.
pag. 412.
h Lib. 7. c. 28.
pag. 739.

Gaspardo Bauino nella Pinace *a* chiamò questa con nome di Raffano rusticano della quinta specie, dal Fuechio nell'Istoria *f* per Raffano 'Siluestre' fu proposta, il Tabernamontano nelle Imagini *g* per Raffano Marino la figurò, e similmente da Andrea Lacuna per Armoracia di Plinio creduta; dal Cordo in Dioscoride, *h* fu con nome di Thlaspio maggiore stimata. Dal Loniecro *a* fu con il sopraccennato nome delineata, e dal Cesalpino, *b* per Thlaspio grande, e Raffano montano descritta, dal Gerardo poi nell'Istoria *c* per Raffano rusticano supposta, e con simil nome viene descritta nell'Istoria Lionese. *d* dal Dodoneo *e* per Raffano grande nominata, e da Gualterio Riffio sopra Dioscoride *f* con inscrizione di Thlaspio maggiore, e di Senape Persiana. Gio: Bauino nell'Istoria delle piante *g* la propone con li sopraccennati nomi di Raffano, e di Armoracia di molti.

Gio: Budeo nella sua Istoria sopra Theofrasto *h* figura questo Raffano rusticano, e nell'indice lo pensa Rapistro, & il Thlaspio di Cretena, e poi nella descrizione della pianta lo manifesta il vero Raffano di Theofrasto, e de gl' Antichi, ch'io nol consentirei; prima perche questa pianta porta le sue radiei numerose, & in diuerse parti della terra serpeggianti, cosa inuero contraria al detto di Theofrasto, che ne hà solamente vna, come esso Budeo afferma, e poi scriue che il Raffano di Theofrasto hà le

sue foglie intiere, non hauendo auuertito, che il Raffano rusticano,

di che egli scriue, produce le sue foglie nel germogliare, parte laciniate, e parte intiere, come fa similmente il Lepidio

di Dioscoride, che à suo luogo si dimostrerà: adun-

que questa pianta per le sopradescritte qua-

lità, con altre ancora, le quali per bre-

uità si tralasciano, fanno, che

questo Raffano non sia al-

trimente quello di

Theofrasto, nè

de gl' Antichi, mà si bene

la Braba di Dio-

scoride.



fig XXII



Butua, ouero Brutua, pianta Indiana. Cap. 30.

Fig. 22.



Armi non fuor di proposito porre quì la figura d'un' Arbore Indiano, che nasce nella regione di Mozambiq; nell' Indie Orientali, pianta in vero molto rara, ne ch' io sappia appresso altri nominata, non hò però di questa relatione alcuna, benchè essa sij dottata di molte virtù, che si leggono ne manuscritti del Padre Matteo.

Questo è vn' Arbore che porta ne rami delle radici figurato il ritratto del Sole, come bene s' esprime nella figura, sò che à chi legge non sarà difficile il creder quest' arbore esser tale, perche nel nostro Clima si ritroua vn legno con simil signatura, benchè non così bene espressa, qual nasce sopra d' altri Arbori, chiamato volgarmente Visco querzino, del quale legno, oltre l' vso della medicina, che giornalmente s' adopra nelle speciarie, se ne fanno coronè precarie, chiamate sotto questo nome di coronè del legno del Sole.

Conseruo nel mio Museo vna sorte di Legno chiamato per nome Ambutua, nome in vero poco diuerso dal sopra scritto, quando non sij lo stesso, come io credo. Questo legno è di forma rotondo, mà imperfetto, coperto d' vna scorza sottile di color castagno scuro, che leuato resta il legno tutto rigato per il lungo di color canneo, & argentino, à causa di certe linee interfecate, e insieme congiunte, facili al separarsi l' vna dall' altra, quale lo rendono molto alla vista vago; è composto di varie tuniche, che sembrano esser tante canne conficcate l' vna dentro l' altra, cominciando dalla midolla, ch' è la prima, quale poscia è circondata dalla seconda, e questa dalla terza, e così di mano in mano secondo la grossezza del Legno, e tagliato che sij, mostra nel mezzo varij segni, con vna iradiatione, ouero vna elegante tessitura molto simile alle tele, che fanno nelle Case, e ne' Palazzi gli ragni nostrani, come nella imagine si mostra; e questo forsi farà il legno dell' Arbore sudetto, perche si come quello porta nella radice il ritratto del Sole, è facil cosa da credere, che ne' rami porti vn' altra simile figura non molto dalla prima diuersa, massime per essere ancora di nome consimile. Questo mio legno (per quanto narommi chi lo portò, che fù il Molto Reuer. P. Fra Gio: Antonio Montecucoli Capuccino, altre volte in questo mio volume nominato) se ne seruono gl' Indiani per risolvere le posteme interiori, & al prurito del sangue beuuto in poluere con acqua, & impastata con latte sana le medeme posteme esteriori, sò bene che masticato rende sapore amaro, con affai mordacità.

Buebenda. Cap. 31.

Fig. 23



Buebenda folia triangularia sunt, flores intus flani coloris, in basi rubicundissimi, quasi quinas cicatrices concinantes, unde flos cicatricum dicitur. Radix trita, prò renum dolore adhibetur, flos verò sanguinis profusivum sistit.

Dal P. Fra Vincenzo Maria di S. Caterina, da Siena Carmelitano Scalzo, vien descritta questa pianta nel modo seguente. Nacquero certi

a Lib. 2. cap. 2.
pag. 135.
Stampata in
Roma 1672.

fiori, per avanti non più veduti, hora irapianati, e communi à tutta l' India, perciò sono detti di S. Tomaso, vaghi, e misteriosi; la pianta non cresce più d' un cubito, con foglie triangolari, carnose, e aspre: il fiore si ripartisce in cinque foglie eguali, nel principio purpuree, nel mezzo bianche, e nel fine gialle, ciascuna delle quali porta in se gna d' una cicatrice, alla quale unita la varietà de' colori, formano un' iride assai bello. Dal centro spuntano sei verghette, come sei haste nere, lunghe, con li capi formati, come se fossero tante lanciae, frà le quali una è più lunga dell' altra, tutte cose ch' alludono alla qualità del martirio del Santo;

b Lib. 6. cap. 10
pag. 362.

Et in altro luogo ^b pure così ne ragiona, benchè sempre sotto altro nome, di Buebenda. Il fiore di S. Tomaso, è come altri il chiamano Granatiglia, è fiore delle piaghe, è molto misterioso, e vago, onde bene s' accoppierebbe col nostro della passione. La pianta è picciola, ne s' alza da terra più d' un cubito con le foglie triangolari, alquanto carnose, e aspre. La radice spolverizzata, e bevuta, è stimata rimedio sperimentatissimo per il dolore delle reni, e il fiore, qual è odoroso, quasi come le nostre rose, raffrena la mossa del sangue per urina.



fig. XXIII.



*Parcol Arbore
Indiano*



*Lamba Arbore
Indiano*



Bubenda pianta Orientale

Bulilla pianta d'Oriente. Cap. 32.



El Catalogo compreso nel Capitolo dell' Ardabar ſu già nominata queſta pianta, della quale ſi porta qui giunta la relatione, che ne hò dal Padre iui mento- uato.

Bulilla eſt bulbus ſquamoſus ſimilis Lilio, e cuius medio oritur caulis, qui erigitur ad ſex palmos aculeis circumdatus, in vertice emittens pyramidem Aro noſtro ſimilem, rotundis fructibus compoſitam, qui colore, & forma videntur coralla, inzer quos exeunt aliqua anguſta, & undofa folia Lonchiti aſpera ſimilia, colore roſaceo, ſeptenumque numerum non excedentia. Fructus duriffimi ſunt, virtutem habent ſiſtendi ſanguinem ſolo carnis tactu ubi ſunt vena, applicanturque in puluere ad fluxum ſanguinis ſedandum, & conferunt illis, qui non poſſunt retinere cibum pro ſtomaci imbecillitate.

L' Imagine di queſta pianta ſi rapreſenta nella figura 67. delle Sidorite di Candia.

Canna viua ſpinofa velenoſa, e mortifera del Perù. Cap. 33.



A relatione, e diſſegno di queſta Canna è venuto da Liſbona Città Metropoli di Portogallo traſmeſſami dal Sig. Dottor Nicolò d' Ponchaù, quale veramente parmi pianta degna di memoria per le rare ſue qualità, maſſime per non eſſerſi più vdiſto ſimil coſa in altra pianta, benchè io non l' habbia veduta, nientedimeno credo queſta eſſere frà le piante viuenti, e vegetabili, e frà i ſecreti della gran ma-

dre natura, però alcuni per quanto m' imagino faranno increduli, eſſendo queſta compoſta di qualità ſtrauaganti, e degne d' eſſere ammirate, anzi pareranno a gl'huomini quaſi impoſſibili, facendo gl'effetti quì à baſſo notati, che tale, e quale ſi riceue, tale al Lettore ſi porge, tanto più volentieri ciò faccio, quanto che vedo queſta eſſere ne gli effetti conſimile, e partecipanti alla natura delle Mimofe, ouero herbe viue, ò ſenſitiue, che ſono à ſuo luogo deſcritte, nelle quali ſi ſonò vedute, e toccate con mani, effetti, e qualità marauiglioſe, che ſe per l' auanti ſi ſoſſero raccontate ſa- riano

riano state tenute per fauole, e per cose incredibili, così voglio inferire lo stesso di questa pianta, la di cui relatione è la seguente.

Cresce questa Canna all' altezza d' un'huomo, e della grossezza del dito picciolo, piena, e spessa di nodi: è di colore più scuro, che non sono le canne nostrane, nello spuntare da terra porta sei, ouer otto foglie in tutto simili à quelle della Canna florida, eccettoche queste sono dentate, nella cima poi del fusto ne porta altre due molto più picciole, e più breui à guisa d' alette, nel di cui mezzo nasce una testa squammata, come un Carchioffo, ò Artichiocco, che termina in una spina lunga, bianca, durissima, acutissima, e uenulosa. Ha questa pianta tal antipatia con l'huomo, che quando se gli auicina si piega alla volta d' esso, e lo ferisce, sì che infiniti Abitanti ne sono morti, (ò come mi vien riferito da altri, fa quest' effetto di pungere solamente quand' è toccata.) Nasce questa specie di canna nel Perù in una gran montagna, che diuide l'Oceano dal Mare del Sur, chiamata Monte Campresso, à piedi del quale è la Città di Palama, ch'io crederci douersi chiamare più tosto Panama, che Palama, otto gradi discosti dalla Linea Equinotiale.


Canna fissa del Fiume Rheno di Bologna di Plinio. Cap. 34.



a Lib. 16. c. 36.
pag. 391.

b Lib. 1. cap.
61. pag. 166.

A Canna uiua spinosa del Perù m' h' fatto ricordare d' vn' altra pianta di simil nome, la quale si troua nell' Orto publico di questa Città, e natiua d' alcune riue del Fiume Rheno di Bologna, come riferisce Giacomo Dalecampio nella stessa Istoria ^a nel trattato delle Canne acquatiche, oue così scrisse. *Sed in hoc quoque, ut ceteris in rebus, uicis Italia: quando nullus sagittis aptior calamus, quam in Rheno Bononiensi amne, cui plurima inest medulla pondusque uoluerit, contra flatus quoque pernicasse libra.* Adunque la nostra Canna del fiume Rheno è stata lodata da Plinio per ottima nell' uso di tirare le Saette, viene similmente menzionata questa pianta dal Mattioli in tutte le sue Editioni, massime nell' vltima con figure grandi, ^b doue adduce le seguenti parole. *Quella che si chiama Nastos, la quale è tutta solida, e piena quantunque liscia, e leggiera, che per l' uso delle Saette de gl' archi loro adoprano communemente li Soriani; non s'io che naschi in Italia, se non (come disse Plinio) nel Fiume Rheno di Bologna; M' s'io deuo dire, ciò che mi pare, questa Pianta di Plinio non è altrimenti la Canna Nastos Dioscoridiana, come parmi si creda quest' Autore per non essere la Canna nostrale di que-*
sto



sto fiume Reno del tutto piena, come scriue Dioscoride della sua Canna. Nastos, e ciò dalla seguente descrizione si conoscerà.

Le medesime parole di Plinio sopranotate, porta ancora il Dalecampio nell' Istoria di Lione nel trattato delle Piantie palustri così dicendo, *sed in hoc quoque, ut ceteris in rebus visit Italia, &c.* così stimo bene, e mi dò à credere, che à simplicisti non farà discara la sua imagine, che si rappresenta nella Figura 24. della Canna viuua del Perù, si come ancora la di lei descrizione.

Dalla radice serpeggiante s' alzano molti fusti rotondi, e sottili, che piegati non si rompono, anzi sono quasi come salice arendeuoli, però verso terra, per esser i fusti più pieni, e più fissi, che in altro luogo della pianta, si frangono. Porta questa canna spessi nodi, da ciascheduno de' quali nascono foglie, che cominciando dal primo nodo da basso, e tutta la cuoprono, sono allegramente solcate, e con neruature sottili rileuate, che le rendono alla vista vaghe, al tatto aspre, mà al di dentro lisce, filose, e di colore argentino à similitudine dell' altre canne, mà queste sono molto più strette, e lunghe circa due palmi. Questi fusti sono rotondi con doga grossa, legnosa, dura, mà nel mezzo qualche poco caui, eccetto ne' nodi, ma però queste cauità sono nel fondo sottili, e nelle parti superiori più larghe, e nel di dentro candide, con scorza che facilmente si leua dalla parte legnosa, che leuata resta poi affatto di colore verde, e di grossezza, come s' offerua nell' imagine: la cima de' fusti verso il Mese d' Agosto termina in vna spica composta di molte altre spiche picciole, e piumose, alte mezzo cubito, di colore variato, cioè verde, bianco, e morello.

La sua radice serpeggia assai, si che molto infetta i partimenti dell' horto, in modo che necessita ad estirparla; nel moltiplicarsi che fa, porta tralci gialletti, grossi come la Canna medesima di doga maggiore,

si che rotti, ò tagliati mostrano nel mezzo vn buco assai picciolo, e sono ancora più spessi di nodi, à quali stanno con-

giunte radici lunghe, fibrose, sottili, e legnose, simili à quelle dell' Helleboro bianco. Produ-

ce da detti nodi molti germogli di figu-

ra piramidali, mà nel contorno

rotondi, e sotto terra bian-

chi, composti di

squamme, che nel spuntare si con-

uertono in foglie. La radice è

dolce, e poco succosa.

Canna piena delle Valli di Rauenna.

Cap. 35.

Fig. 24



Le due sopra descritte Canne, ne aggiungo vn' altra terza, ch' io ritrouai molt' anni sono verso i Boschi, e Valli di Rauenna, e la conferuo nel mio Horto. Questa porta dalla sua radice vn gran cespo di foglie, lunghe quasi due braccia, e strette, che non arriuanò à due deti per trauerfo, sostentate da vn neruo nel di sotto rileuato, e nell' altra parte solcato. Questo è bianco, e nel resto di colore verde chiaro, ch' à luogo à luogo rosseggia.


Trasmette questa radice le sue Canne, che crescono in altezza di quattro, ò cinque braccia, & ancor sei, e più, si che giungono à notabil grandezza, dritte, rotonde, sode, e nel di dentro piene d' vna midolla bianca, e spongosa, che piegate non si frangono, ne si sfessano. I suoi nodi sono più spessi presso terra, che nella cima, oue si dilungano l' vn dall' altro vicino à mezzo braccio. Ciascuno d' essi porta la sua foglia, che circonda il caule, però non tanto, che resti vnita, sendo la parte interna d' essa lustra, liscia, filosa, ò neruosa, d' vn verde che poi si conuerste in color ceruino, il resto della foglia, che dalla canna si disgiunge, oue stà congiunta col nodo, porta nel di lei principio vna gran lanugine argentina: la faccia esterna è aspra, e punteggiata d' atomi rossi, con vna grossa neruatura, che di sotto è verde, e si prolunga fino alla punta, sendo le foglie assai più lunghe, e più strette, che non sono quelle delle canne comuni; terminano ciascun de' fusti in vna spica composta di molte altre secondarie, come nelle altre simili, mà questa è con le piume bianche mischiate di morello, & in cima vi sono apici gialli, che seruono per fiori.

La sua radice è grossetta, tuberosa, di scorza esteriore aspra, sottile, legnosa, e dura, dalla quale nascono molte altre radici lunghe, grossette, ondeggianti; e piene di fibre sottilissime.



fig. XXV

Canna Indiana Arborea



Canna Arborea Orientale. Cap. 36.

fig. 25.



On è men degna d'ammirazione questa Canna Arborea Orientale di quello, che sij la Canna viua del Perù auanti descritta, per ritrouarsi questamunita d'altretante virtù, quanto l'altra di maligne qualità: onde dalla breue descrizione cauata dal Libro con figure picciole de manuscritti del Padre Matteo, potrà venir in chia-

ro ciascheduno delle di lei qualità, dal sudetto Padre nella seguente forma recitate.

Canna Indica Arborea, à Lusitanis Marbelanes dicta, habet folia oblonga multum diuisa, fructum producit rotundum, osiculum pariter rotundum, ut Cerasa, conditur cum saccharo, & sic valde refrigerat, fortificat, corroborat, & soluit.

Porta questa Canna foglie, come dalla sudetta relatione, e figura, s'offerua, vna contro l'altra disposte à somiglianza di quelle di certa Canna Malabarese figurata, e descritta da Christofano Acofta nel trattato che fà del Spodio, ^a anzi che à prima vista sembròmi la medema, se poi li frutti della mia, & il fusto della sua con altre qualità qui à basso notate non li distinguessero, oltre di che la Canna dell'Acofta non porta alcun frutto, ma ben sì certe spiche glomerate; il frutto di quest' Arbore, ouero

a Cap. 16. pag. 224.

Orientale Canna, quale (per quanto dall' Imagine, e de-

scrittione sudetta può congeturarsi) parmi molto

s' accosti alla forma del frutto del Pomo Etio-

pico descritto dal Dodoneo nella sua Istoria,

^b per essere ancor esso striato, e

rotondo come quello di que-

sta Canna, quale condi-

to col zucchero è

molto confor-

tatiuo, corroborante,

e soluente.

b Lib. 4. p. 100.
3. cap. 32. fol.
419.



Carda Arbore Indiano. Cap. 37.



Et Arbor spinosa sicut limones, cuius folia fricata dant odorem, ut folia Cedri: Fructus, & Flores distillantur ad fluxum sedandum, spirantque ambo odorem suavisimum: fructus est paulo maior limone, flores similes Cedri: cortex fructus est dura inftar granatorum, pulpa inclusa secundo cortice durissimo, & crassa est viscosa, ac sapore insipida: semen inclusum est, sicut limonis; sed non tam durum, nec amarum; hoc fructu utuntur gentiles antequam maturescas ad appetitum excitandum.

L' imagine di questa Pianta è nella figura del Zambul maschio num. 79.

Lib. 4. cap. 6.
pag. 313.

Vien descrittta questa pianta quasi con le medesime parole dal P.F. Vincenzo Maria di Santa Caterina nel suo viaggio all' Indie Orientali, « la di cui descrittione, per non rendermi tedioso, costì non agguanto ».

Cardilla Arbore Indiano. Cap. 38.



Cardilla Arbor folia habet lenia, plana, cordis figura, radicis decoctio febrim tollit: folia trita, & alio folio circumluta, subque cinere calido sepulta pro animalibus omnibus sunt proficua, cortex usta, & in cinerem redacta est optimum remedium pro ulceribus in virga virili.

L' imagine di quest' Arbore è nella figura 25. della Canna arborea Indiana.

Cece Indiano perenne Arboreo. Cap. 39.

Fig. 26.



Eri nel mio horto l'anno 1671. questa rara pianta, che vi si era mantenuta in circa ad otto anni, ne hò però raccolti, e conservati i semi, i quali mi vennero la prima volta dalla cortesia del Sig. Dionisio Ioncquet Medico, e Semplicista del Rè Christianissimo, con il sopraccennato nome di Cece perenne arboreo d' India, ben ch'alcuni, che l'hanno offeruato nel mio horto, l'habbino creduto

fig XXVI.



Cete Indiano Arboreo perpetuo

to essere il Cece siluestre del secondo genere, ò della seconda specie, che figura, e descrive Giacomo Dalecampio nell'Istoria Lionese: * ma al mio giudicio sono in errore.

a Tom. 2. lib. 4.
cap. 44. p. 403
e 404.

Prima perche il Cece siluestre secondo di questo Autore è vna pianta due volte figurata nella sudetta Istoria; onde questa vltima imagine, con la descrizione ancora vien supposta falsa al parere de gl' intendenti, massime di Gasparo Bauino negli auuertimenti sopra gl' errori di questo libro; si che questa imagine non è altro che il Cece siluestre, che figura Matteo Lobelio nelle sue osservazioni, ^b nelle imagini, * e dal medesimo parimente nell' Aduersaria, con nome di Cece vero siluestre di Dioscoride, chi si volesse accertare offerui li seguenti Autori, da quali è stato figurato, e descritto, come il Dodoneo, * che lo chiamò Cece siluestre terzo. Gasparo Bauino nella Pinace nominollo Cece siluestre trifoglio di foglia larga: il Gerardo nella sua Istoria disse à questa pianta Cece secondo siluestre di foglia larga: fu similmente figurata dal Tabernamontano nelle imagini, ^b oue la chiamò Cece siluestre della seconda specie, e tutti questi Autori, hanno la medema imagine, l'vno da l'altro trasportata, e se questa differenza alcuno vedere volesse, offerui la figura, e la descrizione, che qui propongo, che conosceranno la diuersità dell' vna; e dell' altra pianta, e verranno in chiaro, che questo mio Cece, non è altrimenti quello, che vien descritto da' sopranominati Autori.

b Pag. 510.
c Pag. 72.
d Pag. 400.
e Tom. 4. lib. 2.
p. 125. cap. 15.
f Lib. 4. fol. 6.
pag. 147.
g Pag. 1223.
lib. 1. cap. 512.
h Part. 1. fol. 6.
e. pag. 1000.

La maggiore altezza ch' io habbia notato in questa pianta durante il termine sopracennato, che si conseruò nel mio orto, è stato d' vn cubito, e mezzo, con fusto rotondo, grosso circa vn quarto d' oncia, contornato da vari rami ineguali, sempre da vn solo fusto nascenti, e posti senza ordine alcuno: sono questi vicino à terra di colore cinericio, & vn poco squamosi, e più in sù lucidi, coperti di due scorze, le quali leuate mostrano vn legno verde, il quale per ogni verso si piega, e con fatica si rompe.

Hà spessi nodi, ouero oechietti alternatamente posti, da quali nascono cespugli di foglie, e rametti di varia lunghezza, sendo le foglie di questo frutice poste à tre à tre, con vna cartilagine nel di sotto, ch' abbraccia il nodo, anzi lo soprauanza con due alette lunghe: sono dette foglie nel contorno dentate con denti duri, e quasi pungenti disposti à modo di sega, e sono queste di color verde scuro, che nel di sotto biancheggia, bscie, e in ogni parte vn poco lucide, di sostanza sode, trascorse da vn neruo di sotto rileuato, il quale di sopra le rende solcate con altre sottili nerature poco apparenti, che lateralmente le scorrono, e sono di lunghezza, e larghezza poco più di quello, che mostra la separata foglia nell' imagine.

Oltra quelle de' primi, e secondi rami del frutice, nasce ancora a pie-

di di quelli altra nouella prole di cespi, e fogliette minori, le quali nel crescere che fanno assai insoltiscono la pianta: sono queste, in quanto alla forma, molto simili alle seconde foglie d' vna certa pianta stimata oggidì appresso molti herbari essere l' Eupatorio di Mesuè, e da altri con più ragione l'Agerato di Dioscoride, come à suo luogo nel Cap. dell'Agerato, e del Eupatorio di Mesuè si discorrerà; ma però quelle dell' Agerato, sono più verde, & in punta più acute, & al tatto più sottili, e odorate, che quelle del mio Cece non hanno odore alcuno.

Nel giungere che fanno questi fusti verso il fine di Maggio, tramandano sempre nelle cime loro diuersi bottoncini adunchi disposti à modo d' ombrella, di forma simili al rostro d' vna Gallina, quali nell' aprirsi lasciano vedere vn fiore galeato, vn poco bianco di dentro, e nel resto variegato di rosso vermiglio, e senza odore alcuno, e della forma simile a quello dell' Anonide volgare; quale caduto che sia, nasce nello stesso luogo vna siliqua breue, pelosa simile à quella del Cece volgare, e della giusta misura, che si vede nell' imagine, la quale è congiunta al fusto con vn piedetto rosso, come similmente è rossa la costa della medesima siliqua, e nell' vltima estremità porta vna punta acuta, e riuolta all' ingiù.

Aperta questa siliqua, il che accade verso il fine d' Agosto, mostra nel suo interno vn seme di colore scuro, vn poco piatto, verso il mezzo cauo, con vna punta riflessa, & alquanto acuta, si che s' osserua nella figura il naturale di lui.


E' lunga la sua radice poco meno di tutto il fruttice, grossa più del fusto maggiore, di color leonato, con midolla bianca, e tramette nel suo contorno molte altre radici proliferare d' altre nouelle piante. Il suo sapore è amaretto, come anco il fusto: quello delle foglie è più gentile, che quasi niente d' amarezza fa sentire, ma ben lascia in bocca vna grana seccagine con odore di legume.

E' pianta perenne.

L' Anno 1673. hauendo di nuouo seminato questa pianta, mi nacque copiosamente, si che me ne trouo prouisto.



fig XXVII.



Chriscome vero di Dioscoride, pianta sin' hora à moderni incognita. Cap. 40.

Fig. 37.



Nni sono fummi trasmessa di Firenze dal Sig. Isidoro Fantini vna quantità di semi confusi, e senza nome della Soria, e della Persia, dal Padre Agostino Tani Fiorentino della Sacra Religione Domenicana portati al Sereniss. Ferdinando de Medici, Gran Duca di Toscana, & al Sereniss. Prencipe Cardinale Leopoldo di

lui Fratello: Principi, che per rintracciare semplici rari, non hanno risparmiato nè Oro, nè Argento, nè diligenza alcuna, mandando in varie, e straniere parti del Mondo ad inuestigare piante nouelle, per arricchire i loro Giardini di copiosissimi, e singolari Semplici. Del che ogn' vno ne due professare à medesimi eterne, & infinito obligationi, essendosi per mezzo delle loro Sereniss. Altezze venuto in cognitione di questa, & altre piante nella presente mia Istoria notate, le quali dopò il celebre Dioscoride, gran Mastro della Bottanica, e Medico di Marco Antonio Trumuirato, e della Regina Cleopatra, già scorrono mille, e settecento Anni, sono state fino à giorni nostri affatto al Mondo incognite. Io però intendo, che questa mediante la seguente descrizione resti scoperta.

Nacquemi dunque questa istessa pianta, che portaua nome di Helichriso Perùano, mà offeruando io, che non haueua le foglie simili à quelle dell' Abrotano, con altre note, che Dioscoride assegna all' Helichriso, venni in cognitione, che non era altrimenti Helichriso, ne meno spetic alcuna di quello, mà più tosto la Chriscome del medesimo, per la chioma corimbacea, come quella dell' Isopo dello stesso Autore, ch'è l' Isopo de Greci di Prospero Alpino, * chiamato ancora l' Origano bianco della Cilicia, conforme dottamente asserisce l' Anguillara, b & anco per le radici in parte simili à quelle del Cipero, & à quelle dell' Eleboro nero, come notò il Ruelio, parendomi questa, e quella di Gio: Battista Ignatio, circa l' esplicazione di questa pianta, le più veridiche, come s' offerua nel medesimo Ruelio sopra Dioscoride in foglio io, c e lo repete ancora nell' altro volume in quarto d con queste parole: *Chriscome paloni alitudine fruticat; coma spetic corymborum, hysopo simili: radice hirsuta, veracri nigri modo, tenui Cyperum equante, gustu non iniucum lo, ex austero dulci.*

Concorda anco la traduzione di Gio: Battista Ignatio, e trattando di

a Lib. 2. ca. 22.
pag. 57. 58.
b Pag. 190. pa
na duodecima.

c Lib. 4. c. 66.
pag. 72. in fo
lio.
d Lib. 4. c. 45.
p. 111. 116.

e Lib. 4. c. 66.
p. 120. folio.

di queste piante così lasciò scritto: *Chrysocome*, alij *Chrysitin*, & *Chrysanthemon*; & *Amaranton*, & *Diospogona*, *Romani Iouis barbam*. *Punici Dubach*: alij *Burchumath*: *palmi altitudine insurgit: comantibus Corymbis, figura Hyssopi, radice Veratrinigri pilosa: Tenui, Gustu non iucundo: verum dulci ex austero: Cyperi magnitudine. Inopacis petrosisque nascens, radix excalfacit, & astringit. Datur potui ad Iocinorum vitia. Item Pulmonum. Decocta verò in aqua mulsula vulvas purgat sumencium. Ne si scosta quella di Marcello Vir-*

f. Lib. 4. ca. 33.
pag. 491. 20
sesta.

gilio, se non in quanto nell' esporre queste parole *πιζανύου ἰβου Ουκτι* mostra che la similitudine trà le radici del *Chrisocome*, e del *Cipero* consiste nel sapore, come dal seguente suo Testo recitato con queste parole.

Chrysocomen (sunt qui *Chrysitin*, qui *Chrysanthemon*, qui *Amaranthon*, qui *Diospogona*, idest, *Iouis barbam* vocent. *Aphri dubach* siue *buchromat*. *Romani Iouis Barbam* appellant) *Dodrantal*is exiguus frutex est. *Corymbaceam Hyssopo similem comam* habet. *Radice* hirsutam; & *veratri nigri* modo gracilem, gustu saporeq; non insuavi: qui qualis in cypero est, sentiat: in dulci leniter austerus. Nascitur *Chrysocome* umbrosis, & petrosis locis. Habet calefaciendi, & adstringendi vim radix, iocinorosis, & peripneumoniciis accommodatam. Sumitur ea etiam in mulsio elixa ad muliebrum locorum purgationem.

g. Tom. 3. cap.
41. pag. 132.

Al che si sottoscrive ancora Gio: Bauino nell' Istoria delle piante: e Tuttauia facendo io riflessione, che *Dioscoride* trattando del *Cipero* dice, che le sue radici sono *ῥιζὸς ἰγυραιος*, cioè, come spiega il *Ruellio* nel testo del *Cipero*, *h. suauis odore, amaro gustu*, dunque sono costretto à partirmi dall' opinione di *Marcello*, e del *Bauino*, e confessare, che la *comparatione* sudetta corre per la forma, non per il sapore delle radici, che nella *Chrisocome* non sono amare, mà più tosto dolci, secondo l' autorità addotta di *Dioscoride*, e tali sono le qualità, che hà la pianta, che si descrive, che giunto il tutto agli altri contrafegni, che in detta si ritrouano, mi confermo nel parere, che sia la pianta, che quì si propone la vera *Chrisocome Dioscoridiana*, e per tale prendo à descriuerla.

b. pag. 1. ca. 3.
lib. 1. cap. 4. 20
sesta.

Da radici dunque simili à quelle dell' *Eleboro nero*, cioè quelle, che sono sotto terra, che contornano la radice maggiore, mà nella loro corona, e poco più sopra tuberose, come quelle del *Cipero*, trasmette questa pianta molti cespi di foglie, da ciascheduno de' quali nascono gli suoi fusticelli bianchicci, ondeggianti, rotondi, lanuginosi, alti, e grossi, come mostra l' imagine, ò poco più; inuestono questi cauletti molte foglie confusamente disposte, & alternate, mà rare, di figura lunga, e stretta, come di lingua, ottuse nella cima; sono queste, e quelle di tutta la pianta al tatto crassette, e carnose, molli, lanuginose, e colorite come li suoi fusti, trasferte per il lungo da vn neruo, che di sotto poco si vede, e di sopra s'abbassa in vna lieue solcatura: hanno queste molta somiglianza con quelle della

della Stecade citrina di Candia, che dal Clusio¹ nell'Istoria delle piante rare, fù propoſta per la quinta ſpetie di Chriſocome, chiamata dal volgo fior eterno, e da alcuni Elicriſo Orientale, mà impropriamente, hauendo l'Elicriſo Orientale, ch'è quello di Dioſcoride foglie ſimili à quelle del ſecondo Stratiote, buero mille foglio volgare, nel di cui genere à mio giudicio non hà luogo, come ne meno l'altre Chriſocomi iui figurate, e deſcritte, ſendo parte ſtecade citrine comuni, s'io non prendo errore, parte polijlegitimi di queſt'Autore, come altroue dimoſtraraffi con maggior chiarezza, e dilucidatione; ſono però più ſtrette, e più corte le foglie in queſta mia Chriſocome Dioſcoridiana, che nella mentionata Stecade citrina di Candia, e col piede abbracciano quaſi tutto il caule, taluolta ancora trà eſſi, & il fuſto, naſce qualche picciolo germoglio foglioſo.

Creſciuti queſti fuſti alla loro naturale altezza producono nelle cima vna chioma, ò corimbo, come Dioſcoride notò nella ſua Chriſocome, ſimile à quella dell'Iſopo. Queſte chiome, ò corimbi ſono compoſti di molti bottoncini ſcaglioſi, tondeggianti, lucidi, bianchicci, e che nella formità gialleggiano, ſoſtenuti da piccioli piedetti, che nel fuſto s'vnifcono. Dilattandoſi poi s'aprono in fiori lanuſinoſi di colore d'oro, molto ſimili à quelli della Stecade citrina Cretica, chiamata d'alcuni impropriamente Helichriſo, come ſopra fù dimoſtrato, ſe non che ſono più piccioli: e per queſto colore de' fiori coteſte piante portano il nome di Chriſocome, che è lo ſteſſo, che dire chioma d'oro.

Nata, come diſſi, queſta Chriſocome Dioſcoridiana nel mio giardino produſſe i fiori di Maggio, e di Giugno della grandezza, ch' a parte moſtra l'Image, non potendone dare maggiore notitia, perche ſopraggiunta vna pioggia abbondante patì di modo, che in breue ſeccoſſi, per eſſer queſta pianta nemica dell'acque, onde non ne potei offeruare i ſemi. Altri di queſti però venuti di Piſa portati dal medefimo luogo di Soria, e Perſia come ſopraſcriſſi, veduti col microſcopio, erano lanuſinoſi, lunghetti, ſottili, acuti in punta, e di colore roſſeggiente, che tende al giallo.

La radice ſopra la corona ſi dirama in molti fuſti, che nella baſe ſono fibroſi, e circondati ad vno ad vno da vn tubero ſcaglioſo, e taluolta da due, poco diſtanti l'vno dall'altro nel medefimo fuſto, quali ſono di forma rotondi, ouero ouati, ò piramidali, da quali ſpuntano le foglie, e per queſti credo come ſopra accennai, che Dioſcoride paragonaſſe la radice della ſua Chriſocome, à quella del Cipero, dicendo come ſpiega il mio Interprete del Greco *ἡ δὲ ῥίζη τοῦ αἰσίου ὅμοια τοῦ κυπεροῦ ἀνὰ τὴν γῆν* *Cypero aequalem habentem*; perche la Chriſocome hà ſimili tuberì nelle radici, mà entro la terra, ſotto la corona poi queſta radice è tondeggiente, denſa, della groſſezza, e lunghezza eſpreſſa nella figura, e di color ſoſco, e ſi diuide in molti rami, lunghi, carnoſi, nereg-

i Lib. 3. c. 35.
pag. 337.

nereggianti, con entro midolla bianca, legnosa, facile da separarsi dal rimanente: e per tutto ciò, come da principio si motuò, similissimi alle radici dell'Eleboro nero, mà però più sottili, e più hirsute, à cagione di frequenti fibre, che li contornano, come notò nella sua Chrifocome Dioscoride, chiamandone la radice *δυσήριος* che suona *hirsutam*: il loro sapore non è ingrato, come, che misto d'austero, e di dolce, sì che dal sapore, che rimane nella bocca s'argomenta la temperatura calda della pianta, quantunque non troppo ami il sole, come che più felicemente prouenga ne luoghi ombrosi, e sassosi, nel quale sapore sopranotato austero, è certo nõ rassomiglia con quello del Ciperò, che è amaro: e da tutto ciò mi crescono i motuii d' affermare, che questa sia la Chrifocome di questo Autore, quale pure della sua pianta asserisce, che ami luoghi ombrosi, sia di sapore non ingrato, e di temperamento caldo, aggiungendoui, che gioua à mali del fegato, del polmone, e nelle purghe della matrice, cioè secondo la traduzione di Marcello Virgilio, *h nascitur Chrysocome umbrosis, & petrosis locis, habet calefaciendi, & adstringendi vim radix, iocinorosis, & peripneumoniciis accommodata misumitur ea etiam in mulso elixa ad muliebrium locorum purgationem*: da ciò che s'è detto segue, che non sono il Chrifocome di Dioscoride le piante, che sin adesso sono state proposte dalli Herbari, le quali sono state connumerate da Gasparo Bauino nella Pinace, ¹ aducendo l'opinione del Camerario, che pensò essere la Chrifocome quella pianta hortense chiamata volgarmente Dragone, creduta dal Gesniero il Tarchon d'Auicenna, e da Simon Setthi, e dal Clusio nell' Istoria ^m per Targo volgarmente proposta, pianta al mio parere dalla Chrifocome di Dioscoride molto lontana. L'istesso Bauino poi nella detta Pinace ² registrò vn'altra pianta portata per Chrifocome di Dioscoride, e di Plinio figurata, e descritta dal Colonna, e dal Guilandino sotto questo nome, quale nasce copiosa in questi nostri colli, e monti, figurata ancora da molti Herbari, massime dal Clusio, sotto nome di Ofiride Austriaca, e dal Trago creduta per Linaria aurea, e per Helechrifo, e da altri con altri nomi, quali per breuità tralaschio: anzi ch'io direi essere questa pianta più tosto vna specie di Tripolio montano di fiore giallo, che d'Ofiride, che di Linaria, ò d'Helechrifo, ò di Chrifocome per mancare à queste piante radici tuberose, con altre qualità descritte in questa, che le rendono totalmente diuersa dalla pianta, di che si tratta.

Ne meno è quella pianta non tuberosa, che Marcello Virgilio descrisse per tale nel suo commentario, ^o oue lagnandosi con ragione, che dal non essersi conseruati i nomi antichi delle piante, se n'è perduto la cognitione di molte, esclama dicendo: *Infelix profecto atas hac nostra, quæ, nec antiqua in plantis seruaueris nomina, nec nonis appellare, & nonis eas gaudet,*

k Lib. 4. ca. 59.
pag. 491. in
sequ.

l Lib. 3. fo. 1.
pag. 48.

m Pag. 327. e.
21 l. 3.
n Lib. 6. fo. 8. 3.
pag. 213.

o Pag. 492. li.
4. cap. 13.

*deat, patiaturque sine honore aliquo nunc esse, qua in natura maiestate antiquitas admirata est, qualis, (soggionge) Chrysocome hac fuit, nullibi non in prar-
 is, & incultis locis nascens, quam sanifeca cum reliquo sano demerunt, cubitali-
 bus magis, quam dodransalibus herbam surculis, iisdemque ferè nudis, pilosis, &
 in summo comam quam hic nominat gerentem, flosculis plenam, coaceruatis, &
 in globum conferetis luteo colore. Quam cum viderit aliquis mirabitur à pretio-
 fiore omnium metallo factum ei nomen, qua nunc sine gratia, & sine dignitate
 aliqua à pueris etiam negligatur. Quale pianta, per quanto posso conget-
 turare, parmi sia l' Elicriso Italico proposto dal Mattioli nel commentario
 sopra il detto Cap. di Dioscoride, e dal Camerario nell' Epitome, p e dal
 Clusio nell' Istoria delle piante rare; mà con nome di Stratiote mille fo-
 glia di fiore giallo.*

P pag. 180.
 q pag. 330.
 cap. 28.

Mà ritornando alla mia Chrysocome, ne nascono varie specie nel Monte Sinai, che non poco variano ne colori della chioma: & a questo proposito intesi già dal Sig. Alessandro Balam Inglese, hoggidì residente nella Città di Tanger, che yn Cavalier di Londra molto pratico della professione Bottanica, hauendo peregrinato non solo in Persia, mà ancora in molte altre parti dell' Oriente, passando per il monte sudetto, ne raccolse molte specie, tutte di chiome diuersamente colorite: le quali, per quanto egli disse, amano il terreno magro, e sassoso: n' hebbi anch' io varie piante verdi mandatemi da Pisa dal sù Eccell. Tomaso Bellucci, a quel tempo publico professore de simplici in quella Città, che mandomi ancora il seme della descritta, natami però prima, come dissi, d' altri semi venuti dalla Persia, e di questa, e di quelle, ne fece mentione nel suo Indice de' semplici dell' orto Pisano con nome d' Elicriso di sette specie di Soria, mà
 queste ultime piantate hauendo patite per il viaggio si seccarono.

p pag. 22.

Hanno tuberì sopra le radici, come sono quelle della pianta, che
 qui si dà in figura, mà però minori; tutte conuengono nella
 forma delle foglie, e de' fiori con quella del colore do-
 rato, mà variano, sendo in altre più, in altre meno
 intenso il colore, in altre la chioma purpurea,
 in altre cineritia, in altre argentina, &c.
 mà però sempre con li loro fiori
 gialli. Nell' imagine à parte
 si rappresenta la va-
 rietà de tuberì,
 e la giusta grandezza del
 Fiore.

Clematide Tetraphylla Americana.

Cap. 41.

Fig. 28.



Molto tempo che viue nel mio Horto questa Clematide Tetraphylla Americana, quale al mio parere è pianta molto rara, ne per anco, ch'io sappia, d'alcun' Herbario descritta, saluo, che fù solamente con il sopradetto nome registrata nell' Indice dell' Horto Blesense, stampato in Parigi l'anno 1653. come si vede à pagine 19. quale non sò, se per l' intemperie del nostro clima, ò per altra causa, oltre le molte diligenze fatte intorno ad' essa, mai è stato possibile nel mio giardino, ridurla à lasciare vedere il suo fiore, ben che s'aggiungi quà alla sua imagine, trafmessomi di Pisa dall'Eccellentiss. Sig. Pietro Natti Dottore in Medicina, singolarissimo Semplicità de' nostri tempi, & in detta Città dignissimo professore de' semplici.

Sino hora non si è maialzata questa pianta a più d'un cubito, mà còsiderando li di lei capriuoli, cón quali mostra di volere rampicare, e sostenersi, sono costretto à credere, che nell' America natiua, sua Patria, creschi molto più di quel, che fa sotto al nostro Cielo.

Spunta dunque da questo sottofrutice vn fusto rotondo, legnoso, tortuoso, e grosso quanto vna penna da scriuere, facile da frangerli, qualità direttamente contraria all' altre Clematidi, e mostra nel suo interno midolla verde, e legnosa, che vien coperta di scorza aspra, e durezza, molto difficile a staccarsi, e questa nelle parti da basso, è di colore cinericio, che sembra essere di legno secco: mà più in sù, massime ne' rami, è di colore ferrugineo verdeggiante, e da esso nascono altri simili fusti sottili, e di forma quadrangolare imperfetta, perche nel crescere che fanno, prendono poi la forma del fusto maggiore ch'è rotondo, sendo quelli, che tramette nella parte da basso, l' vn dall' altro molto vicini, come si vede nell' imagine; mà, che nel crescere poscia portano nodi grossi, e rileuati, e frà di loro assai discosti, due de' quali sono volti in vn verso, e gl' altri due in vn' altro, e da ciascuno d' essi nascono piedicciuoli grossetti appresso il nodo, e piegati à modo di ginocchio, di forma tondeggiante, mà quadrati nella parte superiore, oue mostrano vn poco di bianchezza, sendo nel resto lunghetti, e di colore di lacca, mà oscuro; Ciascuno di questi sostiene vna foglia, e per lo più due, vna per parte, come dalla figura si vede, la maggior grandezza ch'io habbi visto nella pianta à parte si mostra nella

figura

fig XXVIII.



Clematis Thetraphila Americana

figura, e sono trascorse da vn neruo molto rileuato, dal quale procedono altre transuersali, e sottili neruature ch' elegantemente tutta la scorrono con varij giramenti, e riuolti, si che sembrano labirinti, d' tante ziffere, d' caratteri Arabici, e vedute la notte al lume sono trasparenti come vetro, di colore d'oro, a l' occhio molto vaghe; quando spuntano queste foglie dalla pianta sono affatto rosse, poi diuentano verde, e l'Autunno rossieggianno: ancora la loro sostanza è soda; si che malceggiate, di vn poco piegate, tornano al loro stato primiero. Nella parte da basso hanno due orecchie tondeggianti, e nella cima sono acuminata di forma, e figura assai somiglianti alle foglie dell' Apocino Angustifoglio serpeggiante, figurato dal Mattioli nelle sue editioni, massime nell' ultima con immagini grandi: dall' Istoria Lionesa; nel trattato delle piante velenose; dal Camerario nell' Epitome; e dal Clusio nell' Istoria delle piante rare, e da altri ancora, che per breuità tralascio; però queste della pianta di che si tratta, sono al tatto più tenui, e come sopra ho scritto nel fondo orecchiate, e di contorno ondoso, & in qualche parte somiglianti ancora alle foglie della Smilace aspera, se non fossero spinose.

Verfo il Mese d' Agosto porta certi bottoni, come riferisce il sopranotato Sig. Natti, ouero calici da quali escono i suoi fiori composti di cinque foglie, di color rosso, che gialleggia, in tutto simili a quelli del Gelsomino Hederaceo Indiano, che figura, e descrive Giacomo Cornuti nell' Istoria delle piante di Canada, e Scancora il Padre Gio: Battista Ferrari nella sua Flora / sotto il precitato nome.

La sua radice è molta, che si diuide ondosamente in altri rami rotondi, di colore, che nel ferrugineo gialleggiano, pieni di midolla argentina, di scorza, che difficilmente si leua, di sostanza soda, e contornata di radichette sottili, lunghe, ondose, e fibrose. Il suo sapore è simile a quello delle mandole amare, si come anco l' odore, ma non così graue le foglie, che non cadono dalla pianta prima del fine dell' Inverno, sono al dente resistenti, asciutte, e niente succose, vn poco amareggianti, che rotte rendono odore simile, ma più tenue. E' pianta perenne.

a Lib. 3. ca. 83.

pag. 21.9.

b Lib. 17. ca. 9.

pag. 173.1.

c Pag. 600.

d Lib. 1. p. 125

e Pag. 102. ca. 103.

f Pag. 102.

* Datura di Coccino Spinosissima. Cap. 42.

Fig. 29.



Ell' Anno 1670. si publicò la descrizione di questa Datura assieme con l'Othonna di Dioscoride, e ciò per saggio, e principio di questa Istoria, mà poscia mutato pensiero, come sovente accade, giudicai più espediente per la commodità di chi legge di valersi dell' ordine Alfabetico, e così si porta in questo luogo, che più di ragione se gli deve.

Il Molto R. P. Fra Michele di S. Eliseo Carmelitano Scalzo, Farmacopeo del suo Conuento nella Città di Milano, huomo nelle cose naturali, & in particolare nelle piante, insigne, e peritissimo, mi mandò il seme dell' herba qui disegnata, portata da vn Padre di sua Religione da Coccino, Città del Regno di Calecut nell' Indie Orientali, di doue quei Religiosi con occasione di propagarui la Santa Fede, riportano ancora, frà l' altre rarità, per arricchire la nostra Europa con indicibile vantaggio della medicina, diuersi semi non più veduti, e disegni di piante non più offeruate, la nota delle quali è registrata nel Capitolo dell' Ardabar auanti descritto.

Questo seminato in vaso produsse vn fusto rotondo, liscio, lustro, piuuoso, nella parte di sotto rosseggiante, ma più sopra verde, alle volte asperso di macchie, ouero puntini bianchi, nel modo dell' oliue, che si chiamano botarghe, e questo massime quando la pianta è esposta al Sole: porta molti fusti simili alle altre dature, de quali vn solo ne rappresento nella sua naturale grandezza, che bipartendosi dal fusto principale, si diuide poi ondofamenti in altri rami, ch' in varie parti si spandono, dilatandosi à segno, che da se sola viene ad' occupare gran spatio di terreno.

I nodi portatori delle foglie sono rari, e quelle folcate nel di sopra con nerature di sotto rileuate, tinte d' vn verde lucido, che biancheggia, e trafcorse di rari peli bianchi, e queste sono di sostanza crasse, tenere, & alquanto carnose, imitando nella loro figura quelle del Solano V. fetido, di pomo spinoso oblungo, registrato da Gasparo Bauino nella Pinace, a stimato dottamente appresso al Colonna b nel Fytobasano essere il Solano manico di Dioscoride, come ancora notò il Camerario nell' Epitome sopra al Mattioli c specie di datura, e di noce metella: però queste della mia Datura Indiana, di che si tratta, sono molto-minori, & i pomi, e frutti sono assai maggiori, e le spine più larghe, nel piede più grosse, e più pungenti onde con ragione s'è chiamata Datura, con epitetto di spinosissima.

Dal

a Lib. 1. Tab. 1.
pag. 65.
b Pag 47.
c Pag. 176.



Dal mezzo de' cespugli superiori delle foglie, spunta per ciascuno vn bottoné lungo, cartilaginoso, e di color verde, nel di cui contorno si vedono cinque coste, e cinque denti nella cima, che verso il principio d'Agosto, nell'aprirsi, che fa sul tramontare del Sole, mostra vn fiore fatto à campanella simile à quello delle altre dature, ma che non arriua à più della metà della loro grandezza: nel resto sono d'vn bianco succido, con cinque coste, nell'eterno verdette, e gialleggianti, che di dentro lasciono altrettante folcature scauate: dal mezzo del fiore sorgono cinque stami lunghi, e porta ciascuno d'essi vn' apice peloso, fatto à modo d'vna freccia, e nel mezzo di questi vi stà vn' altro stame più breue, nella di cui cima vi sopra-sede vna palotta ouata di color verde: si conserua questo fiore aperto tutta la notte, e la mattina seguente al comparire del Sole si riserra, ne mai più si riapre, cosa però comune con la maggior parte delle altre piante simili.

Nel ricettacolo, che sosteneua il fiore, nasce vn pomo picciolo, grandemente spinoso, che s'ingrossa poi al pari d'vn' ouo, ò almeno quasi al doppio di quello, che separatamente si vede nel disegno di color verde scuro, e che nel maturarsi che fa à luogo à luogo si macchia di morello. E questo armato di spine grosse, ma acutissime, alcune sono breui, l'altre più lunghe, hora à due, hora à tre congiunte, ma per lo più ad' vna sola, della grandezza, che parimente si rappresenta nell'Imagie.

Maturato il frutto verso il fine d'Ottobre, viene ad' aprirsi in quattro parti, e porta vn seme, che perfectionato resta negrissimo, lucido, e punteggiato di punti caui, & in somma in quanto alla forma simile à quello della sopracennata Datura, ma al doppio maggiore, e nel mezzo contiene vn'occhio biaco ciuo, come sono quelli de' Fagioli, che offerati col microscopio sembrano hauere la figura, quasi d'vna compressa lumaca.

La sua radice è liscia, di color bianco gialleggiante, coperta di scorza, che difficilmente si leua dalla parte legnosa, ondeggiente, e composta di molti rami trasuersali, e piene di fibre sottili, e tenere: stropicciata, che sia tramanda vn succo vn poco glutinoso, e rende odore acuto, e forte, ch'imita quello del Raffano volgare, ma non già di quel Raffano volgare, che si troua descritto appresso gli Herbari, quale non è altrimenti Raffano, come à bastanza à suo luogo in questa Istoria si è dimostrato nel Capitolo della Braba di Dioscoride, ma si bene di quello che si mangia nelle salate, comunemente da tutti chiamati volgarmente Rauanello, ouero Rafanelli. Le foglie rotte rendono odore fetente, simile à quello dell'Ebullo, ma molto più ingrato, anzi intolerabile, e che come pianta velenosa, e mortifera sforza l'huomo à leuarsi da lei, facendogli dolere il capo se la maneggia.

Riferisce il medesimo P. Fra Michele, che gli habitanti di Coccino chia-

chiamano questa pianta Truco, e si seruono del suo seme dandolo in poca quantità in cibo, ouero in beuanda à gl'huomini per instupidirli, onde costretti à fare mille pazzie restono esposti alle altrui risate, e si risanano, col mangiare melanzane cotte: vedonsi cose simili, e maggiori ancora in altre piante, & in particolare in certe spetie, che pure sotto nome di Datura, vengono da Christofoero Acofta Africano nella sua Istoria delle piante Indiane descritte. Et io conferuo nel mio giardino vn'altra pianta simile, che hò offeruato nascere in diuersi luoghi d'Italia, & ancora in questi contorni del Bolognese, della quale non mi pare essere memoria appresso ad' Herbario alcuno, riseruandomi di ciò fare in altro luogo, oue si discorrerà di tutte le dature, vedendo appresso alcuni varie opinioni nel descriuere, e dichiarare, che cosa, & in che concetto siano state queste piante appresso à gl' Antichi.

d Pag. 66. fua
à 70. cap. 1.

Dauco Siciliano con foglie di Pastinaca.

Cap. 43.

Fig. 30.



a Lib. 4. f. 134.
pag. 160.

b Lib. 4. f. 134.
pag. 150.

Olti sono li Dauci hoggi di appresso gl'Herbari noti, de' quali noue spetie ne annouerò Gasparo Bauino nella sua Fitopinace, ouero Enumeratione delle Pianta, che sono descritte, e figurate appresso diuersi Autori. Il medemo Gasparo Bauino portò ancora registrate le sopra accennate nel suo Pinace, ò Teatro Botanico, & anzi à queste nello stesso luoco ne aggiunse quattro di più, le quali similmente sono appresso gl'Herbari cognite; Dunque oltre alle sudette spetie, ne hò quiui alcuni altri, quali stimo di noua offeruatione, cioè cinque forti, trè delle quali sono con foglia di finocchio, vno di Sicilia, vno di Candia, & l'altro de' nostri Monti dell'Apenino del Bolognese, che altrove si daranno in figura con le loro Istorie: gl'altri due seguenti, sono similmente di Sicilia, vno con foglie di Sofia latifolia, l'altro con foglie di Pastinaca, che qui di presente si tratta; I semi de' quali mi furono mandati di Palermo dal Sig. Paolo Boccone, nella cognitione de' Semplici intelligentissimo.

Tramanda questo primo dalla sua radice molte foglie sopra il terreno distese, sostentate da gambi rotondi sì, mà che nel di sopra sono però solcati, e nel mezzo caui, da ciascuno de' quali escono le foglie à due, vna incontro all'altra, eccetto l'ultima, che resta sola, & alle volte porta trè faccie:

fig XXX



Daucus con foglia di Paspinara Siciliano

faccie oltre alle due solite foglie, spuntano nelle di loro canità due breui rammetti con foglie simili, e parimente disposte, & altre ancora à quattro insieme, e frà queste ve ne sono sempre due minori, massime quelle di sotto, come nell' imagine s' offerua, e sono senza piede alcuno al caule annesse, ò pure se in alcuno si troua, è tanto breuè, che à pena si vede. Sono queste foglie nel di sopra di color verde, nel di sotto bianchiccie, lisce, cartilaginose, crassette, vn poco lucide, in ogni parte dentate, e senza peli: trascorse poi da nerature bizzarre, che rapresentono ziffere à modo di laberinti, e sono più verdi, che non sono le foglie, e vedute col microscopio appariscono in ambe le parti solcate, cosa non più offeruata, ch' io mi ricordi, in altra pianta, sendo in quanto alla forma simili à quelle della Saffragia Ircina minore, la quale dal Cordo nell' Istoria, fù per Dauco Selinoide proposta, e dal Tabernamontano nell' Imagine, fù per Tragoselinio, e Pimpinella minore figurata, e da Fabbio Colonna nel Phitobasano, ouero Istoria d' alcune piante per Tragio seconda creduta, mà le foglie di questa mia pianta sono più larghe, e più apuntite, e senza odor cattiuo.

Produce questo cespo di foglie vn fusto alto più d' vn cubito, liscio, rotondo, sodo, e da vn nodo all' altro ondeggiente, che piegato non si rompe, è pieno di midolla argentina, circondata da sottile materia legnosa, e coperta di scorza verdeggiante, & alquanto lucida: portano questi fusti rari nodi, eccetto che nella parte inferiore, da ciascuno de' quali nasce vn gambo congiunto al caule con vna larga cartilagine, come fà il finocchio volgare, nel qual gambo sono le foglie particolarmente quelle de' nodi da basso, più ramosche, che in altre parti della pianta. Da tutti questi nodi, etian dio da quelli, che sono appresso terra, nascono i suoi rami; ò fusti, e sopra d' essi stanno le foglie molto minori, e più dentate, e nella cima d' ogn' vno di questi germogli vn' ombrella, che sostenta i suoi bortoncini oblonghi, quali à poco à poco apprendosi mostrano i loro fioretti composti di cinque fogliette, nel mezzo delle quali sorgono due linguette, e tutte sono d' vn colore viuogiallo dorato.

Caduti questi fiori restano in suo luogo i semi oblonghi, come corrette, di forma ottangolari, senza peli di color di paglia, mà oscuro, i quali aperti, si diuidono in due parti, e ciascuna di queste in altre due.

La sua radice è grossa quasi come vn doto picciolo, alquanto annellata, e lunga mezzo piede, verso la cima alle volte s' ingrossa à foggia di Rauanello, & è trascorfa, mà in rari luoghi d' altre radichette sottili, e poi nel fondo si diuide, se bene non sempre, in due, e taluolta in altre tre radici, non sendo in questa, come ne pure in tante altre radici, ne regola, ne giusta proportion; Il suo colore è bianco succido, & hà nel mezzo anima tenera, che facilmente si separa. Gustata non rende sapore ingrato, mà caldo,

c Lib. 2. c. 121.
pag. 145.
d Pag. 88.
c Pag. 79.

caldo, & aromatico, che lascia nel palato, e nella gola alquanto d'acre; le foglie sono di sapore simili à quelle del nostro volgare petroselinolo; Il fiore è più acuto delle foglie, e morde vn poco la lingua; nel seme si riscontra vn poco d'aromatico. E pianta perenne, benchè sotto questo nostro clima vi duri poco.

Dauco secondo Siciliano con foglie di Sofia.

Cap. 44.

Fig. 31



Rasmette questo secondo Dauco di Sicilia nella superficie terrena molti gamboni congiunti alla radice, con vna larga, e neruata cartilagine, nel modo ch'hanno le ferule, finocchi, & altre simili piante, e sono di forma rotondi, nelle parti superiori solcati, tenui, e succosi, & vn poco lucidi, e caui nel mezzo: da ciascheduno de' qua-

li nascono altri simili gamboncelli minori, sono però tutti apportatori di sua prole, quali nel crescere che fanno s' allargano, e portano vn gran cespo di foglie di forma minute, e crespe, quali sono coperti d' vna lanugine, che le fa biancheggiare più sotto, che sopra, e sono di sostanza tenere, succose, nel contorno dentate, e nel crescere che fanno, sì gl' vni, come gl' altri si stendono sopra al terreno, e ne occupano assai spatio d' esso, e portano le loro fogliuozze alla stessa parte riuolte, & hanno forma, e similitudine con quelle della Sofia di foglie larghe, figurata dal Tabernamontano, nelle sue Imagini,^a e descritta dal Cesalpino^b sotto nome d' Accipitrina seconda, ne molto si scostano, in quanto alla dispositione, e forma da quelle di certa pianta, la radice della quale hoggidi si mangia nelle salate, chiamata comunemente dal Volgo Carotta rossa, che fù da Gasparo Bauino nella sua Phitopinace, ouero Enumeratione delle piante, e per Pastinaca tenuifolia con radice rossa proposta, e dal Trago nell' Istoria^d per Stafilino terzo figurato, e descritto, e dal Lobellio nell' osseruazione, e nell' Imagini^e per Pastinaca fatiua, con radice rossa, e di Dauco nero di Teofrasto creduta: mà le foglie di questo mio Dauco Siciliano sono vn poco odorate, e di color bianchiccio.

Da questo cespuglio di foglie nasce vn fusto alto circa ad vn cubito, e mezzo, & al più ch' io habbia offeruato nel mio horto, due, di forma rotondo scanellato, ouero solcato, che da vn nodo all' altro ondeggia, coperto di scorza lanuginosa, e rosseggiante, grosso quanto si sia il dito minimo,


^a l. 1. fol. 1.
pag. 17.
^b l. 2. cap. 66.
pag. 361.

^c l. 4. fol. 4.
pag. 103.
^d l. 1. c. 147.
pag. 442.

^e pag. 417. del
primo, e pag.
418 del se-
condo.

Dauco con foglie di Suphia Siciliano

fig XXXI



nino, pieno di midolla verde: hà speffi nodi, massime nelle parti da basso, che poscia nel crescere del fusto maggiore verso le cime si rarificano, e portano foglie simili alle sopraccennate, mà però più bianche, e minori di quelle, del cespo maggiore, congiunte al nodo con la sopraccennata larga cartilagine; che tutto il caule abbraccia, come bene s' offerua nell' imagine, essendosi figurata ancora nella medesima vna foglia della pianta primiera della loro giusta grandezza naturale, & oltre al fusto maggiore, nascono nelle loro cavità altri fusti minori, quali nel crescere soprauanzano ancor' al fusto maggiore, che nel giungere (sì l' maggiore, come il minore) verso il fine di Maggio, trasmettono vna ombrella per ciascheduno, piena di bottoncini lanuginosi, e di color verde, che gialleggia, quali nell' aprirsi che fanno mostrano i suoi fiori candidi, composti di cinque minutissime fogliette, con vn poretto verde nel mezzo contornato da stami, & apici bianchi, quali fiori spirano odore molto grato simile à quello delle rose bianche, che fioriscono l'Autunno, mà però l' odore de' fiori di questo Dauco è minore; caduto che sia questo, virimante in suo luogo à perfettionarsi vn seme oblungo, ch' offeruato col microscopio si vede solcato, peloso, lanuginoso, e ratto si diuide in due parti.

La sua radice è gialeggiante, spongosa, scanellata più grossa di quello, che non è il fusto maggiore, la quale poco discosto dalla sua corona si diuide in quattro, ò cinque altre larghe radici minori. Questa gustata hà sapore simile à quello del Finocchio volgare, però assai più acuto, le foglie hanno sapore simile à quelle del Selere che si mangia, superando il seme in mordacità, e in acutezza tutte l' altre parti d' essa.

E' pianta di radice perenne, anzi che per piante forastiere non hò trouato che duri più nel mio horto di questi due Dauci descritti, e del Siciliano medesimo sopra notato con foglie di finocchio da desciuerfi, che tutti tre viuono nel mio horto sono dieci anni in circa.



Erismo di Dioscoride. Cap. 45.

Fig. 32



Iue nel Giardino Publico, e nel mio priuato ancora questa sorte di pianta, venuto il seme sotto nome d'Irione annuo di Candia, mà trouandola io accordarfi meglio d'ogni altra pianta da moderni fin'hora descritta all' Erismo di Dioscoride, hò giudicato più espediente col stesso nome chiamarla, massime vedendosi proposto appresso questi, da chi vna spetie di Eruca siluestre, da altri l'Eruca istessa satiuua, e d'altri vna spetie di Senape, e di Nasturtio aquatico chiamati volgarmente Barbarea, e da certi vn Rapistro, quali sono al mio parere tutte piante poco, ò niente corrispondenti con quell'Irione, che descrisse Dioscoride con nome d'Erismo.

Spunta questa formando vn cespo di foglie alla corona della radice con lunghi, e rotondeggianti picchetti annessi, de quali li più esteriori sono leggermente folcati, e gl'altri tutti nel di dentro del foglioso cespo sono di folcatura larga, e caui, & à luogo à luogo di macchiette sanguigne segnati, che seguendo l'Estate suaniscono.

La foglia, ch'è laciniata, allargandosi due deti trauerfali incirca, s'allunga talora più d'un palmo, e finisce con punta riuolta all'ingiù, stendendo di quà, e di là dal neruo maggiore senz'ordine alcuno molte rileuature, che non hanno figura determinata, ondeggianti, e taluolta ricciute, e complicate di sostanza tenera, e succosa, di colore di sopra verde, e di sotto pallido: per le quali farezze queste foglie si trouano molto simili à quelle dell'Eruca siluestre, di cui vna specie dal Bauino nella Pinace, ch'è la quarta nella serie di queste, ^a chiamasi *Erismo pelato di foglia larga*, figurato, e descritto dal Colóna nell'Istoria delle piante meno cognite ^b cò nome d'Irione di Puglia, nel che questa nra pianta confronta mirabilmente con quella di Dioscoride, che della sua così scriue, secondo Marcello Virgilio, *et folia habet siluestri Eruce similia*; & a questo proposito Plinio, secondo la traduzione del Dalecampio, ^c così parla, *Irionem inter fruges sesama similem esse diximus, & à Grecis Erysimon vocari, Galli velarum appellant. Est autem fruticosum, folijs Eruce angustioribus paulo*; anzi alcuni lo chiamano Eruca nobile, come scrisse Hermolao Barbaro nel suo Corollario sopra Dioscoride; *e Erysimon nostri herbarij significant, quæ vulgò nobilis Eruca dicitur, quam & Eruca vera præferunt.*


E questi trastagliamenti a modo d'Eruca nel mio Irione sono condizioni

⁵ Pag. 100. l.
3. fr. 17.
^b Pag. 165.
cap. 103.

^c Pag. 190. lib.
26. cap. 147.
^d Lib. 22. cap.
25. fol. 577.
^e Cap. 391. lib.
22. fol. 557.



Fig. XXXII



Striptanti Arb. Onon.

Liukha Frutice Orien.

Eriogonum uero di Dioscoride

tioni legittime, per le quali appresso i Greci vien chiamato Erisimo; poi-
che come notò il Bodeo sopra Theophrasto *ἐρίσιμος quod inter olera recensetur* f. pag. 921. ca.
nomen accepit, ἀπὸ τῆ ἐρίσου à multiplici foliorum sectione, Eruca enim 3. lib. 6.
modo laciniosa sunt.

Dal cespo foglioso, che s'è descritto, spunta vn fusto ramofo pieno
di midola verde, succosa, che piegato non si rompe, mà per ogni verso si
riuolta, il che confronta col detto di Dioscoride parlando del suo Erisi-
mo, *παστάτωμα τὸν σπον, che da Marcello, e dal Rueglio de natura stirpium fù*
interpretato Caule obsequioso, ac lento, quasi lorum. E' questo fusto di scorza
liscia, & vn poco lucida, di color verde chiaro, che ne' nodi, oue stanno
attaccate le foglie, è macchiata, come i loro gambi di picchie sanguigne;
Porta questo spessi nodi, massime appresso alla radice, posti senza ordine
alcuno, da ciascheduno de quali nasce vna foglia, e come sopra si disse, vn
fustarello, con altre foglie simili alle sudette, mà minori, e più incise.

Nella cima di ciascheduno caule, circa il fine d' Aprile, apparisce vn'
ombrella di bottoncini, ch'apprendosi mostrano vn fiore giallo, come di-
ce Dioscoride, *ἀνὰ μὲν ἔσθρα*, che al dire del Barbaro significa *floribus lu-* f. Cap. 391.
teis, ciascuno di questi è vn composto di quattro, ò cinque fogliette, con pag. 45.
apici nel mezzo dello stesso colore, le quali cadendo lasciano in loro luo-
go le silique cornicolari, della forma di quelle del Fieno greco, mà più sot-
tili, delle quali Dioscoride, al raporto del Barbaro nello stesso *b* suona: *in* f. Cap. 391. R.
cacumine siliquas sustinet graciles, & corniculis similes, ut silicula: ò come 2. pag. 45.
spiega Marcello Virgilio, *Feno greci siliquarum specie.*

Questa ombrella di bottoni crescendo si trasforma in vna spica di
silique assai lunga, che riescono vn poco piate, e lunghe, come nella fi-
gura si vedono rappresentante al naturale. Maturandosi queste, mostra-
no le protuberanze de' granelli, che contengono, e circa il fine d'Agosto
apprendosi, lasciano cadere vn seme giallo, lucido, longhetto simile à
quello del Nasturcio, à cui paragonò Dioscoride quello del suo Irione,
dicendo delle di lui silique: cioè come interpreta il Barbaro: *in quibus se-*
mina continentur parua, nasturcij specie, mà minore, e più minuto ancora di
quello dell' Erisimo Italico descritto, e figurato dal Dodoneo nell' Ilio-
ria, tche à mio giudicio e più tosto specie di Rapistro, che d' Irione.

La sua radice è lunga, bianca, nodosa, & al tatto aspra, grossa nella
corona circa mezz' oncia, e verso il mezzo s'assottiglia, e come il fusto si ri-
in varie parti senza rompersi, mà rotta à forza, e contusa spira odore vn-
poco acuto, e forte, gustata rende non poco amarezza, & acutezza,
lasciando la bocca non poco arida.

Parimente le foglie sono d' vn sapore vn poco amaro, e mordente,
non tanto però come la radice. Il fiore, & il seme riescono più acuti, e

mormenti, quasi come se fossero senape. Nel che si rauuifa assai bene quella qualità, che Dioscoride attribui à semi del suo Erisimo, dicendo che siano, *πρωτόν καὶ ἀπὸ τοῦ γούρου*, cioè come espresse il Barbaro, *gustu ardeni*.

Cadendo questi semi d' Agosto, come s'è accennato, nascono spontaneamente d'Autunno, e di Primavera, e non solo in terra, mà ne vasi, e particolarmente trà le pietre in tanta copia, che necessita i Giardinieri à cauarlo, per la qual cagione Teofrasto nel libro delle cause delle Piantte, traduzione del Gazza annouerò il seme del suo primo Erisimo, ch'è lo stesso di Dioscoride, trà le sementi fertilissime. Nasce questo Dioscoridiano Erisimo frequentemente nell'Asia, e nella Grecia, come scrisse Plinio, ^m secondo l'interpretatione del Dalecampio, benchè iui (come notò il Ruelio *de natura stirpium*) confonda l'Erisimo secondo di Teofrasto con quello di Dioscoride, l'vno, e l'altro paragonando con troppo seruire al Sesamo di quei tempi, mentre trattando di questo, dice, *Huic simile est in Asia, Greciaque Erysimum, idemque erat, nisi pinguius esset, quod apud nos vocant Irionem, medicaminibus annammandum potius, quam frugibus*.

Per tutte le fattèzze dunque di questa pianta sin qui adotte, stimo di potere con sicurezza asserire, che questo Irione sia l'Erisimo di Dioscoride, quadrandò per appunto al mio la discretione, che l'Anazarbeo porta del suo, così tradotta da Marcello Virgilio, *° Erysimon nascitur circa Prætes, domorum arces, ruderaque, & hortos: folia habet siluestri Ruca similia: cauliculos vitilium corrigiarumque modo lentos, & lutos flores, in summa siliqua corniculorum sunt figura graciles; sænu greci siliquarum specie: in quibus cantilla sunt semina, nastureio similia, seruido sapore* (tutte facoltà similissime à quelle della pianta di che si scrive) *in pectoris distillationibus vitilia, purulentis excretionibus, tussientibus, suffusis felle, coxendicis doloribus cum melle lincta. Bibuntur eadem Irionis semina, contra lethalia venena, & ex aqua, mellene vitiliter contra latentia carcinomata, secundum aures abscessus, quas parotidas dicunt, durities, testiumq; & mammarum inflammationes. emplasti modo imponuntur, extenuant, in vniuersumq; calefaciunt Irionis semina, mitiora fiunt cum clystere infundenda fuerint aqua prius madentia, mox per se cremata, aut in linteolo colligata, tum crusta ex pistorio opere innoluta.*

Oltra le quali facoltà, non è da tacerli, che questa pianta verde, riesce bona nelle insalate, alle quali serue di condimento come l'Eruca; onde hebbe à diuine il Ruellio, *et olus vero recens ubique non aliter, aquam eruca, suo perquam acris sapore fatua commedat acetaria*.

A Bruti però riesce ingrata di sapore, e con fatica ne mangiano; poi che datone ad alcuni giumenti de più stolidi, questi di primo impeto ne gustarono la sommità delle foglie d' vn cespò per ciascheduno: mà poi come

k Lib. 3. ca. 17.
pag. 358.

m Lib. 18. cap.
10. pag. 448.
n Lib. 3. cap.
90. pag. 543.

o pag. 90 lib.
3. cap. 147.

p De natura
stirpium cap.
90. pag. 543.

me nauseabondi lasciarono il restante, quantunque non sia d' amarezza eccedente. Il medesimo successe dandone ad alcuni Boui per altro famigliari, de quali vi fù chi non ne volse assaggiare, benché altri ne mangiassero, mà poco. Cade anco à proposito di ciò l' offeruatione fatta; poichè gettatone vn gran cespo ad alcuni Porcelletti d' India, quelli vi si gettarono impetuosi; mà a pena ne gustarono l' estremità, che non ne volsero altro, ancorchè audissimi di verdura, & auezzi à rodere sino le sommità de ramifecchi de gl' Alberi, & altre materie più dure ancora. Ne ciò le successe vna volta sola, mà la seconda, e la terza, replicando per alcuni giorni la proua con altri cespi di questa.

Ne solo ne gli Animali perfetti, mà ne gl' insetti ancora s' è offeruata la medesima auersione di questo Irione. Imperòchè hauendo io ritrouato sù questa pianta certa Ruca, e lasciateuella sopra dalla mattina sino alla sera, che ritornai nell' Orto, ritrouai la pianra intatta, e la Ruca partita segno, che quel cibo non se le confaceua. Il che mi fa souenire ciò, che Teofrasto asserisce del suo primo Erismo, che verde nõ è mangiato da alcuno animale, mà ben sì secco: e ne porta la ragione, perche il Sole concocce, e ne caua ciò, che in esso era d' amaro, & ingrato, e graue al sapore. *Nonnulla* (dic' egli nel libro delle cause delle piatte, giusta l' interpretatione di Teodoro Gaza) *etiam dum tenera sunt, à nullo gustantur. Sicca autem cibo idonea properea sunt, quia quantum in his amaritudinis, difficultatisq; fuerit per eorum, et excrementumque est solis opera, ut Sesama, ut Erysimum. Hac enim viridia tangi à nullo anim. li videntur propter amaritudinem, & grauitatem saporis: sed siccata acceptiora euadunt, fructusque eorum suaves efficiuntur.* E quindi Plinio. *Hoc (scilicet Hormino) & Irione, nullum animal vescitur virentibus.* Nel qual luogo il Dalecampio, celeberrimo Commentatore di Plinio, notò che ciò sia scritto da Teofrasto, come opinione del volgo, scriuendo egli, *(Teophrastus id quidem vulgò narrari tradit, sed non sibi constare.*

E se bene Dioscoride non fece mentione alcuna delle macchiette rosse, perche *de minimis non curat prator*, come di sopra fù scritto ritrouarsi ne gamboncelli delle foglie di questa pianta: non però le trascurò Gio: Ruellio *de natura stirpium*, che, come credo, per cagione di quei punti rossi, chiamò le medesime foglie sanguigne, dicendo, *Sesama, & Irionis sanguinea*, il che viene replicato dal sudetto nel medesimo volume, con le stesse parole, ne fù senza questa cognitione Hermolario Barbàro nel luogo sopra citato, & oue sottoscriuendosi a Plinio, e portando queste sue parole: *Folij Eruca angustioribus paulò*, vi aggiunge, *& sanguineis*, che poi questo *sanguineo*, non di tutta la foglia, mà come s' è detto de gamboncelli, si debba intendere; chiaramente si proua con l' esperienza, che se ne hà dalla vera pianta in questo luogo descritta.

Eruca

q Lib. 6. ca. 19.
pag. 384.

t Lib. 18. ca. 10.

t pag. 449.

t Lib. 3. cap. 8.
pag. 32.u Lib. 3. ca. 19.
pag. 427.x Lib. 3. cap.
39. pag. 55.

Eruca fruticosa con foglie di Tanaceto Indiana. Cap. 46.

Fig. 33



a Lib. 7. cap. 4.
pag. 140.

b Lib. 2. c. 119.
pag. 474.

c Lib. 3. fol. 1.
pag. 145. fine
n. 150.

d Lib. 3. fol. 1.
pag. 145. e 149.

e Lib. 3. cap. 7.
pag. 39. fine
430.

f pag. 35.

N genere solo d'Eruca si troua nominato appresso Teofrasto, che così stà notato nella traduzione di Teodoro Gaza suo Interprete, a quale afferma connumerarsi ella frà quelle piante, che non ne producono di più forti, niente dimeno Dioscoride al riferire di Marcello b ne numerò di due spetie, come dall'esperienza hoggidì manualmente si conosce, cioè vna hortense, e l'altra siluestre, con tutto ciò l'Eruche hoggidì conosciute appresso li moderni Herbari sono molte: ritrouandose registrate da Gasparo Bauino nella sua Enumeratione delle piante c di sedici spetie, portate ancora dal medesimo nel Teatro de' Semplici, d la maggior parte delle quali sono à Professori cognite, essendo state diuise con vari nomi, come d'Eruca satia siluestre latifolia, fetida, maggiore, minore, palustre, maritima, Italica, Cretica, Echinata, Austriaca angustifolia, Monspelienfe, con siliqua quadrangolare, & altre ancora, che qui per breuità tralascio, rimettendomi à ciò che ne dice di più il sopranominato Autore, mentre alcune di queste vengono ancor comprese nel di lui Prodromo, e stampato in Franchfort l'anno 1620, le quali come piante d'altri osseruate, qui si pongono in silenzio, & oltre di queste, ne hò quiui di due spetie, che mipaiono degne d'essere annesse nel numero dell'Eruche, nele penso all'altre inferiori, come piante, che per l'auanti al mio credere, non prima d'hora stante osseruate, solo questa fù registrata nell'Indice Blefense, stampato in Parigi l'anno 1642. La prima dunque di queste mie due, per esser pianta Indiana, parmi molto rara, massime per esser grande, e fruticosa, onde la stimo frà tutte l'Eruche la maggiore, e la più memorabile, che frà queste spetie si sij veduta, ne soggiungo quiui la sua imagine, cioè vn ramo fiorito, bench'io habbi tutta la pianta intiera in disegno, come anche tutte quelle notitie, che di questa Eruca hò potuto cauare, bench'ellà sia stata non più di due anni viuia in quest'horto publico, come nel mio priuato ancora, causato da questo Clima nemico delle piante Indiane, e forestiere, massime di quelle, che sono di natura, e temperamento calido.

Crebbe questa fruticosa pianta in progresso del tempo sopraccennato all'altezza d'un braccio con molti fusti, che verso la radice sono grossi qua-





Eruca Indiarum con foglie di *Tanacetum*

quali quanto è il dito minimo della mano, di forma rotondi, scanellati, legnosi, e pieghevoli senza rompersi, coperti di due scorze, l' esteriore delle quali è fortile, e di color biancheggiante, che con facilità dalla compagna si leua, l'altra è verde, che ricuopre la parte legnosa, ch' è bianca, quale aperta che sia, si troua piena di midolla, che nel colore verdeggia; sono questi fusti pieni d' occhi da ciascheduno de quali nascono cespi, e foglie irregolarmente posti sopra la pianta, anzi, che da ciaschedun di questi, oltre al cespo maggiore, ne nascono altri minori, sì che affatto infoltiscono la pianta, in modo tale, che difficilmente può essere bene dal Pittore ridotta in disegno.

Da questi fusti occhietti nascono foglie alternatamente poste sopra i fusti, massime verso le parti da basso, oue sono più frequenti, che non sono nelle parti superiori della pianta, quali sono nel loro contorno dentate, come nel disegno s' offerua: la loro larghezza è vn' oncia, & la lunghezza è vn' oncia, e mezza in circa: son queste trascorse per il lungo da vn neruo, che nella parte di sotto si rileua, lasciando nelle parti superiori altre tante solcature: queste sono al tatto moli, e lisce, e di color bianco cinericio, anzi che in bianchezza sono come quelle dell' Assenzo nostrale, e sono inquanto alla forma assai somiglianti con quelle del Tanaceto volgare, mà però minori, ne molto si scostano da quelle di certa specie d' Eruca siluestre stimata d' alcuni essere la Raseda di Plinio (pianta hoggidì à Semplicisti cognita) cetto che quelle di questa Reseda non sono nel contorno incise, ne frastagliate, nè di color cinericio.

Nel giungere, che fanno questi fusti maggiori verso le parti superiori, trasmettono altri fusti minori, sopra ciaschedun' di questi nascono vna massa di bottoncini biancheggianti disposti, dirò quasi in ombrelle; quali nell' aprirsi, che è verso il fine del Mese d' Agosto, mostrano i suoi fiori di color giallo, composti di quattro fogliette ouate, nel di cui centro spuntano altrettanti stami bianchi, nella cima di ciaschedun di loro vi soprastondono altri tanti apici gialli, alla caduta de' quali surescono altrettante silique, che verso il fine di Settembre lasciano cadere vn seme oblungo di color gialletto della forma, e similitudine di quello dell' Agrctto volgare, ouero Nasturtio.

La sua radice principale è di grossezza eguale de' fusti, e produce nõ meno della corona, che dell' altre parti laterali d' essa, altre radici minori, e tutte copiose di fibre sottili, che sono tutte di forma rotonde, tortuose però, & in varie parti ripiegate coperte di scorza biancheggiante, e sono di sostanza legnosa: questa gustata lascia in bocca sapore amaro, e tant' ancora è quello delle foglie. Tutta la pianta stropicciata rende odore forte, acuto, simile à quello del Raffano, che si mangia. E' pianta, che viuẽ più anni.

Eruca

Eruca Serpeggiante fruticosa Alpina.

Cap. 47.

Fig. 34



Rattaremo hora d' vn' altra Eruca, non meno della sopradescritta rara, e nouella, benche natia d'Italia, che fù da me trouata già anni sono su' Monti del territorio Bolognese, e Modonese, massime sù quelli delle scale, e sul Monte Cimone, oue nasce frà Balzi, e sassi.


Non arriua questa serpeggiante Eruca all' altezza d'vn palmo, crescendo dalla corona della radice, che è grossa, e grumosa, anzi quasi tuberosa, molti germogli di foglie, che serpeggiano nel modo, che sotto si dirà.

Sono queste foglie di color verde scuro nel di sopra, e nel di sotto bianchiccie, in ogni parte lucide, di sostanza carnosae, e crasse, frequentemente, e profondamente incise da merli tondeggianti, e distinti l'vno dall'altro, quasi fino al neruo, massime le superiori de' fusti, e questi merli sono parimente diuisi in altre incisure. Portano le foglie del germoglio i loro piedetti assai breui, che di sotto tondeggiano, e nell' altra faccia restano piani, con folcature poco euidenti.

Da ciascuno di questi fogliosi germoglij, massime da i maggiori, pullulano vno, ò più fusti sottili, legnosi, che piegati si rompono, coperti nelle parti inferiori d' vna scorza biancheggianti, che poi verso le cime si cangia in verde: tramandano questi cauli da ciascuno de' nodi, che sono frequenti, massime nelle parti da basso, vna foglia simile alle inferiori, già descritte, mà più corte, e meno merlate, alternatamente sù per il caule disposte, e nell' estremità sono senza gambo, mà vnite à detto caule con due alette, ouero sogliose orecchie, vna per parte, con le quali vengono li fusti d'ogni intorno, abbracciati insieme, con altri germoglietti di foglie crespe, e dentate, ma molto minori, come bene dimostra l' imagine; l' vltime situate verso la cima de' fusti, sono più largamente incise delle sotto notate inferiori, & i loro merli hanno più del lungo, e dell' acuto, non vedendosi in queste incisure veruna.

Frà questi nodi, e foglie superiori, nascono molti fusti apportatori di numerosi bottoncini verdi, sottratti da' piedetti breui, che formano quasi vn' ombrella, ouero vna breue spica, piena di bottoncini, quali, nell' aprirsi che fanno, verso il fine del mese di Maggio, mostrano i suoi fioretti candidi, composti di quattro, in cinque foglie, di forma (si potrebbe dire)

fig. XX. XIV



Erica Alpina serpeggiante

dire) tondeggianti, se nel contorno della cima non fossero leggermente incauati; dal mezzo poi di ciascuno di questi fiori spuntano filetti sottili, e gialli, quali cadendo à misura che s'aprono gl' altri bottoncini, si dilungano la spica, lasciando in suo luogo vna suliquetta lunga, e sottile, simile à quella del mio Erisimo Dioscoridiano, la quale contiene vn seme minuto, ouato, e giallo.

La radice è assai lunga, e di sostanza legnosa, coperta di scorza beretina, rotonda, mà ineguale, e grossa nella superficie terrena, in modo che come sopra s'è detto, riesce quasi, che tuberosa, hauendo di più in altre parti gruppetti, e grossezze ineguali, e radichette sottili con numerose fibre, dalla quale oltra le accennate foglie, trasmette d'ogn' intorno nouelli tralci, ch'apportano molti germogli d' altre foglie, ch' in varie parti della terra s'estendano, e sono assai diuerse da tutte l'altre della pianta, anzi molto simili à quelle di certa herba tenuta dal Pona, come s' osseruaua nella descriptione del suo Monte Baldo, ^a essere vn Thlaspio con aspetto di Miagro, ch'io sempre dirai, ò crederei più tosto esser questa pianta vn Miagro, che vn Thlaspio, rispetto a i semi, che sono più di questi, che di quelli, mà le foglie seconde della mia Eruca sono tenui, e nelle cime vn poco più larghe; masticate queste radici, e le foglie rendono sapore non dissimile à quello dell' Eruca, e del volgare Nasturcio, ouero agretto, ma niente trattenute in bocca partecipano alla lingua, & al palato mordacità, poco meno acuta di quella del Pepe commune, con molta siccità; si stenta à conseruarla in questi Giardini, perche ama luoghi sassosi, e freddi, si che sopraggiungendo il caldo, facilmente perisce la Pianta.

Le virtù dell' Eruca sono oggidì note; hauendone Dioscoride, così trattato, secondo ch' interpretò Marcello ne' suoi comentarij, ^b sopra questo Autore. *Euzomon (Ægyptij et breicen. Aphri asurich. Romani Erucam dicunt) Stimulat Venerem multus cruda Erucæ cibus Potest idem, & semen, quod cienda vrina accommodatum est. Adiuuat concoctionem Erucæ, & bonam facit aluum. Vtuntur, & semine in condiendis obsonijs, seruant que id ut diutius perennet; aceto, lacte ve maceratum in pastillos conformantes. Nasctur & agrestis Eruca, præcipueq; in occidentali Iberia, cuius semine profumapi incolæ vtuntur. Estq; huius Erucæ semen satiuæ illius semine acris, & ad ciendam urinam multo efficacior potestate.*

Galeno trattando della facoltà di questa pianta nel secondo libro delli alimenti conforme viene interpretato d' Andrea Lacuna Tom. 1. e 2. così dell' Eruca lo fa parlare, ^c *Hoc olus manifestissime calefacit, semenq; genere creditur, & coeundi excitare appetitum. Capiti etiam dolorem infert, præsertim si quis ipso solo vescatur.*

Dunque se la nostra Eruca, si domestica, come siluestre hà le qualità

M

sopra-

a Pag. 182.

b Lib. 2. cap. 129. & 174.

c Lib. 2. pa. 52.

sopraccenate da questi Autori, come hoggidi in diuersi medicamenti si consuma, essendo publicamente vsate ancora ne' cibi, che cosa si può dire di queste due, che di gran lunga in acutezza, & in calidità superano le volgari Eruche? quindi io argomento, ch'ogni pianta benchè straniera, e di lontane reggioni, purch'ella sij della stessa spetie, porti più, e meno le stesse facultà delle piante à lei congeneri, come più volte con l'esperienza s'è conosciuto.

Falangio ramoso Virginiano con foglia larga Serpeggiante. Cap. 47.

Fig. 35



Re forti di Falangio di Virginia si trouano nel mio horto, il primo de' quali apporta vn fior grande composto di tre foglie di color azzurro violaceo, e porta le foglie come di Gramigna, benchè più larghe, e più lunghe, sono di sostanza mucilaginose, crasse, ne sono dissimili da quelle de gl'Agli, e Porri nostrali, e credo que-

a Pag. 120.

b Lib. 7. ca. 11
pag. 371.

sta esser quella pianta, che Gasparo Bauino descriue nella sua Pinace, o sotto nome d'Aglio, ouero moli Virginiano, e lo figurò Gio: Bodeo ancora nella sua Istoria sopra Teofrasto, b dichiarando hauerne cauato la relatione dal sopranotato Gio: Bauino, oltre di questo ne hò vn' altro poco diuerso dal sudetto, cioè di foglie alquanto più larghe, e di fior candido, mà quiui si tralascia per esser tutto simile al sopranominato, la descriptione del quale si troua appresso al sudetto Bauino, & al sudetto Gio: Bodeo nelle pagine sopranotate.

V'è poi il terzo similmente di Virginia, molto diuerso dalli due sopra nominati, come da tutti gl' altri Falangi, ch'io habbia mai offeruato appresso ad altro Autore: questo cresce, e si moltiplica assai per essere di radice serpeggiante, e dalla corona radicale porta vn fusto liscio, alto poco più d' vn cubito, di forma rottondo, che piegato non si rompe, & aperto che sia si mostra pieno d'vna midolla verde, densa, e succosa, mà di succo non viscoso, com'è quello delli sopra nominati Falangi, vestito di scorza sottile, tinta di verde, e morello, massime nel fondo, coperto di piuma sottile biancheggianti, porta questo fusto rari nodi, anzi nel mezzo si scollano l'vno dall'altro vn smesso in circa, mà più in giù, e più in sù si rendono assai vicini, da ciascheduno de' quali nascono le sue foglie, vna per nodo;




fig. XXXV



Salvia di Virginia, con foglie larghe

do; Sono queste foglie annesse ad vna gran cartilagine naturalmente serrata à modo di scartoccio, che circonda non solo il nodo, mà vna buona parte ancora del fusto, sì che resta questo da vn nodo all' altro assai inuestito, come dall' Image s' offerua, sopra della qual cartilagine, ò scartozzo puntano le foglie sottili al tatto, trascorse da vn neruo nel di sotto rileuato, che lascia nel di sopra folcatura sottile, con altre sottilissime neruature, che tutte le foglie scorrono, e sono à breue, e largo pedicciolo congiunte, della forma, e similitudine d' vn ferro d' vna lancia, e sono aspre al tatto nel modo, che sono quelle della Canna volgare, di sostanza cartilaginosa, nel di sopra sono di colore verde scuro, e nel di sotto bianchiccie, & vn poco piumose, rigate con le medesime linee verdi, che dal fondo scorrono fino alla cima tanto minute però, ch' appena compariscono; trasmette questo fusto maggiore altri fusti minori, quali ancor loro fanno prole de medesimi, sì che nel crescere di questi, e delle foglie ancora, assai tutta la pianta si infoltisce.

Da questi fusti, massime i maggiori, nascono nelle loro cime molti ricettacoli, ò pelicole herbacee, di sostanza membranosa, e cartilaginosa, che serrate hanno la loro forma di semicirculo, nel mezzo di ciascheduno de' quali nascono i suoi fiori composti di tre foglie, costume de sopranotati Falangi Verginiani di color azzuro chiaro, con tre stami nel mezzo, e tre apici sopra; mà se ben mi ricordo, sono di color giallo, che prima d' aprirsi del tutto si mostra in figura d' vna bocca mezza aperta, che in vero rappresenta la forma d' vna bocca (dirò quasi) di Drago, e di Serpente, come dall' Image separatamente si vede; mà aperto che sia del tutto, si vede in forma triangolare, nel modo come sopra si scriue delli sopranominati Falangi di foglie strette di questo luogo: di raro però questo Falangio Latifoglio produce i suoi fiori, il che crederei cò procedere dalla multiplicatione, che fa la sua radice molto abbondante, che solo attende à serpeggiare, e generar nouelli tralci, e piante, non hauendo nel termine d' otto anni, ch' è nel mio horto, portato fiori, e semi, saluo che vna volta sola, hò però offeruato, che ristretta, & inuafata che si j la pianta gli produce ogn' anno.

Caduto che sia questo fiore, vi rimangono li sopraccegnati ricettacoli, herbacei della forma, che si offeruano nell' Image, essendo figurati sì serrati come aperti, e sono sì elegantemente variegati di linee inarcate, che riguardano all' insù, che rimirate contro l' aere, sembrano sottili rete, ò tele de Ragni. Queste sono serrate in ogni parte, eccetto che di sopra, dentro li quali spunta vn pedicciolo rotondo, sottile, nodoso, sopra del quale hano hor' vno, due, e tre altri rotondi, e sottili pediccioli ritorti, sopra ciascheduno de' quali stà situato vn ricetacolo in forma di testa di Serpente, atto cò tanta eleganza, & artificio, che sembrano formalmente essere tanti

capi, con la bocca aperta di Vipere, Draghi, & altri animali velenosi, entro ui nel capo la sua lingua annessa al palato, quale poi si forma in vn seme di color berettino, che di sotto gialleggia, & nel resto tutto simile ad vna lingua. La figura mostra il seme sì nudo, come vestito, con tutte le naturalità di questo particolare, & ancor di più di quello, che qui non si scriue.

La sua radice è lunga, serpeggiante, tenace, sì che ritorta non si rompe; non è più grossa del fusto, nodosa, da ciascheduno de' quali nascono tralci, & fibre lunghe, che serpeggiano in varie parti della terra, queste sono di forma rotonda di colore bianco, che inclina al giallo, che facilmente si scorza, con anima soda, e succosa; Il suo sapore è nel principio dolce, lasciando in fine qualche mordacità, che partecipa di quella del Rauanello, che volgarmente si mangia.

6 Lib. 3. pag.
421. cap. 112.

Marcello Virgilio in Dioscoride, trattando del suo Falangio, gli attribui virtù contro alle punture de Scorpioni, & alle molicature di quei Ragni, che si chiamano Falangi, beuuto ne la poluere delle foglie, seme, e fiore col vino. Maggiormente direi, che questa fosse dotata d'altretante virtù, non solo contro detti animali, mà ancora contro il morso delle vipere, & altri Serpenti velenosi, mostrando la natura in questa pianta segni tanto euidenti di virtù simili, & anco maggiori, che in quanto al mio parere, non se ne deve dubitare, come meglio di me giudicaranno i più dotti, e più periti nella professione.

Foglio, ouer Phillo Maschio, e Femina Indiano.

Cap. 48.

Fig. 36
Fig. 37



Rà le Imagini delle Piante, che si ritrouono ne' tre Volumi parte dissegnate, e manuscritte nel Sacro Monte Libano, nella Soria, & ancora parte di queste nella Persia, & India dal sapientissimo Padre Fra Matteo di S. Giosepe Carmelitano Scalzo, hò trouato queste due piante descritte nella seguente forma.

In Insula Sailani versus Austrum reperitur Planta, seu herba serpens super terram, habens folia sicut illa cuiusdam plantae nascentis iuxta mare in arenario, quae vocatur pos Capra. Ista planta, turpe est dicere, quod genus fructus producat, qui lingua Lusitunica vocatur membrum virile, propter ipsissimam formam, & similitudinem, sed quia talis planta tenuis est ad sustentandum talem fructum,
qui




fig. XXXVI



Phillo-marchio Indiano





Fig XXXVII



Philo ouero Foglio

Femina Indiano

qui superat longitudinem palmi, & amplius iunctis testibus caterisque naturalibus seu necessarijs ad formandam membri virilis formam, antequam aperiatur capsula, seu locus in quo talis fructus producit, emanant à pede fructus tres, vel quatuor radices, quæ terræ defixæ possent deferuire ad sustentandum talem fructum, eundemque ad talem magnitudinem peruenientem, valeant alere, aut alimentum præbere.

Et, est alia Planta etiam in honesta, sicut & ista, quæ speciem rappresentat famineam, habens folia sicut Karambola, & flosculum iridem, estque frutex: altitudine ferè duorum aut trium cubitorum, rappresentans Veneris immunda verenda.

Sed alia quoque opera consideranti non erunt huiusmodi Plantæ admirationi nam in Monte Libano vidi Mandragoram famineam, & masculum, versissimas formas tum viri, tum mulieris representantes altitudine cubiti vnius cum dimidio, quarum vnam Venetias iam à multis annis transmisit.

Queste piante non sono altro, che specie di Philli, ouero Foglij, i quali si diuidono ancora in maschio, & femina (come Teofrasto, e Dioscoride descriuono de' suoi Philli) quali non solo sono da quelli di Dioscoride diuersi, mà ancora da quelli di Teofrasto, benchè siano di foglie assai simili à quelle dell'Occimo, com' il medesimo descrisse de' suoi Philli, mà questi, che qui si descriuono, sono piante diuersè, e degne d'essere ammirate, come nella descrizione manuscritta del sudetto P. Matteo si legge; M' immagino ch'alcuni si crederanno, che queste due herbe siano cose fauolose, e dalle naturali lontane; anzi sò che riputaranno chi scriue di poco prudente in trattare di piante non più vedute; s'ingannano però, perche nel tempo dell'Ecc. Sig. Dot. Bartolomeo Ambrosini, allora Lettore, & Ostenfore de' Semplici nell'Horto publico di questa Città di Bologna, e Custode dello Studio di questo Illustriss. Senato, chiamato volgarmente dell'Aldrouandi, frà certi Libri di Pianta secche, & in Carte agglutinate mi mostrò (strauaganza dal Phillo di Dioscoride diuersa) vna pianta, ò foglia simile nella forma di queste, che si rappresentano nella seguente Imagine, con nome di Phillo maschio Indiano; Ond' io scorgo da questo, che le due piante descritte, e figurate in questo luogo essere i veri, e legittimi Philli Indiani non più d'alcuno Herbario, ch'io habbia offeruato, descritti; Non è marauiglia alcuna, che queste due sorti di piante tanto naturalmente rappresentino in se stesse figure di parti humani, poiche ancora molte altre nostrane fanno il simile, come sono le Mandragore maschio, e femina, e la Brionia, le quali nelle radici portano figura, che mostrano (al più delle volte) dal capo, ò dalle mani in giù quasi figura humana, & altre, come sono i Satirioni, ch' hanno due radici congiunte insieme in forma di testicoli, alcuni delli quali ne' fiori portano varie sorte d'Imagini, cioè la figura intiera dell'huomo,

si maschio, e femina, come fanno gl' Orchi Oreade *Anthrophophora*, & gl' Orchi seconda Oreade *Cercopitecophora*, e ciò s' offerua appresso Fabbio Colonna nell' Istoria delle piante meno cognite, ^a & in altre piante ancora da molti Autori figurate, e descritte, che portano varie sorti d' Imagini, come sonò Mosche, Vespe, e simili. Altre, che nelle medesime radici hanno due mani congiunte insieme, come sono l' Orchi palmata, maggiore, e minore, e molte ancora di queste chiamate dalli herbari, ^c dal Volgo *Palma Christi*, piante à Semplicisti ben note, altre ancora, che nelle medesime radici tengono l' Imagine de' Scorpion, come li Doronici, e qualche Aconito, altri ancora, che ne semi portano l' effigie de' capi di Serpenti, e Vipere, come sono gl' Ecchi, & il terzo Phalangio di Virginia di foglie larghe auanti notato, diuerse, che mostrano il capo d' vn Vecello, come sono i Miagri à suo luogo descritti varie spetie d' Antirhini, che mostrano ricettacoli, ch' han similitudine di capo, ouero narici d' vn Vitello. Non vi mancano ancora Arbori, che nelle loro foglie rappresentano simili marauiglie, frà quali vi si troua l' Arbore del Sangue del Drago in Occidente descritto dal Monardo nella sua Istoria, ^b il qual porta nel mezzo delle sue foglie vn seme effettiuo, che rappresenta l' Imagine d' vn Dragone scolpito dal naturale, & ancora vn' altro Arbore descritto dal sopradetto Padre quale nasce nel Nagapaton, e nella Costa di Coramandel, e questo doppo il fiore cadutoli, produce vn frutto siuile ad vn vecello, dentro del quale vi si racchiude il di lui seme; come meglio à suo luogo si scriuerà, & altre simili, che per non rendermi tedioso tralasciarò.

Trouo descrittà vna pianta dal Molto R. P. Fra Vincenzo Maria di Santa Catterina da Siena nel suo Viaggio all' Indie Orientali sotto nome di Pianta serpeggiante, la quale dalle proprietà, che questo Padre descriue (benche nelle foglie differenti) parmi essere la medesima col Philo maschio sopra descritto.

Resti però auertito il Lettore, che de' sopra notati due Philli Indiani non si rappresentano nelle Imagini li loro frutti, ne meno sono specificati nelle loro descrittioni tutte le circostanze, e dichiarazioni à loro spettanti, e ciò per più modestia.



Fragaria Arborea con fiore herbaceo.

Cap. 49.

Fig. 38



Arie sono hoggidì le opinioni intorno alle Fragarie, imperocchè alcuni vogliono, che sianotte da Dioscoride inserite nel capitolo del Pentafilo, ouero Cinque foglio, mà al mio credere la sentenza di questi è vana, e senza fondamento alcuno. Plinio però secondo la traduzione del Dalechampio^a nel trattato che in

questo luogo si fa del Pentafilo, scrisse di questa pianta le seguenti parole.

*Quinque folium nulli ignotum est, cum etiam fraga gignendo commendetur. Graci vocant pentapetes, siue chamezelon, siue pentaphylon cum effoditur, rubram habet radicem. Hac inarescens nigrescit, & angulosa fit. Nomen à numero foliorum habet. Et ipsa herba incipit, & desinit cum vire. Adhibetur & purgandis domibus. Aduersus serpentes bibitur, & eius radix, quæ sparganion vocatur, ex vino albo. Quiui Plinio scriue, che dal Pentafilo nascono le Fraghe, cosa dal vero molto diuersa, come ben asserisce il sopranotato Giacomo Dalechampio suo commentatore nelle annotazioni, che iui si fanno del Cinque foglio^b con le seguenti parole. *Incogitantur foliorum similitudine deceptus Plinius, cum pentaphyllo, quod edulem fructum nullum gignit, miscet herbam fraga ferentem. Folio sanè diuersam à Pentaphyllo cum huic triplex tantum sit, Pentaphyllo verò quincuplex.* Onde da questa relatione*

parmi hauere à bastanza dimostrato essere di spetie diuersa la Fragaria dal Pentafilo, ne vi màcano altri, che come riferisce Gasparo Bauino nella sua Pinace, si sono creduti essere il Chamebato di Plinio, & altri vna spetie di Moro terrestre, come pure alcuni la giudicarono per il Rouo Ideo non spinoso (cosa ch' io non direi) però tutte le tralascio come quelle, che poco, ò nulla concludono à mio proposito; soggiungo ben sì ch' oltre le cinque spetie di Fragarie dal sudetto Bauino nel prefatto luogo annouerate; & à bastanza conosciute appresso gl'herbari, me ne trouo due altre dalle sudette diuersè, e non prima d' hora appresso d'altri descritte, delle quali ne porgo in vn fol ramo le loro Imagini.

La prima di queste, che da me viene chiamata col nome di Fragaria Arborea con fiore herbaceo, porta sopra terra vn cespo assai grande di foglie in tutto, e per tutto simili à quelle della Fragaria volgare, mà però queste sono vn poco maggiori, & in ogni parte più pelose, e nel di sotto ancora più biancheggianti, anzi quasi argentine, da questo cespo di foglie

^a Lib. 23. cap. 9 pag. 633.

^b pag. 634.

^c Lib. 3. fol. 6. pag. 324.

glie nasce vn sol fusto diritto, legnoso, & alto circa ad vn cubito, quale nella cima si diuide in due, & alle volte in trè rami disposti, quasi à similitudine d'vn ombrella: portando nell' vltimo nodo sotto la diuifura de' rami foglie simili à quelle, che stano à piedi della pianta, mà minori, cosa, che in altre Fragarie non s'offerua, ò almeno da me non più veduta.

Sono questi superiori ramicelli inuestiti di rari occhietti, e foglie solitarie, picciole, e molto strette nelle di cui cavità nasce vn sottil pedicciolo, & alle volte due, benche di rado, sopra di ciaschéduno de' quali nasce vn bottone tódeggiante, ouero vn capitello herbaceo, quale nell'aprirsi che fa (il che succede nel principio di Giugno) lascia vedere vn fiore herbaceo composto della medesima sostanza dell'altre foglie della pianta, cosa da me non mai più veduta in altra Fragaria, ne meno in altro fiore di spetie ancor diuerso da questa.

Viene composto questo fiore di cinque in sei picciole foglie larghetate, e vagamente dentate, nel di cui mezzo vi scaturisce vn disco pieno di pelli di color verde, il quale nel crescere che fa si solleva, e si cangia in vn frutto, che nel maturarsi diuene rubicondo, e di color verde, à cagione de' sopranotati pelli, si che riesce all' occhio non meno strauagante, che bizzarro, mà di figura, e forma simile à quello delle volgari Fragarie, essendo che questo è più lungo, più apuntito, e tutto di pelli lunghi, verdi coperto, effetti assai dissimili dall' altre Fragarie, la di cui forma mostrasi à battanza nell'Imagine.

Gustato rende sapore acido, & ingrato, e similmente le foglie, che sono amareggianti, efficaci, & astringenti. Il suo seme è sottile in punta, e grossetto nel di sotto, disposto in varie forme, mà per lo più curuo, è di colore rosseggiante.

La sua radice è larga, dura, e legnosa, contornata d' altre simili, pure lunghe, sottili, ondeggianti, legnose, leggermente coperte di due scorze, delle quali l' esteriore è nera, e la seconda rossa, con anima bianca. Il suo sapore è astringente, e molto efficace. E' pianta perenne.

Parerà forse strano al Lettore, il sopradetto nome, che gli hò tribuito d' Arborea, non già, che non sappia, che questo epiteto non se gli conuenghi, e gli sij improprio, mà per distinguerla dall' altre, con vn termine, che confacesse alle qualità, che auanti li sono notate.





fig xxxviii



Fragaria Arbuta

con fiore herbaceo

Fragaria Inglese di Fiore mezzo pieno.

Cap. 53.



Enne questa pianta d'Inghilterra, d'onde già molt'anni sono fù portata dal Sig. Nicolò di Ponchaù Dottor Fiamingo, la quale per essere di fiore mezzo pieno, & d'altre qualità dall'altre diuersa, come pianta nouella si propone, hauendone della medesima figurato due rami, quali nella figura 37. à parte s'osservano.

Questa nelle sue foglie è tutta simile all'altre Fragarie, eccetto, che sono vn poco minori, e più tenui, e meno crespe, e d'vn verde più chiaro, & al tatto più liscie, questo produce i suoi cauli più ramosi, e bassi, che la nostrana, e per consequenza rende maggiore abbondanza di frutti.

Produce questi suoi fiori, e frutti nello stesso tempo, che fioriscono l'altre, e sono l'vno, e l'altro conforme si vedono figurati nelle due parti laterali dell'Imagie, composti di fogliette, che tondeggiano, molto curiosamente disposte in giro intorno ad vn disco giallo con ordine duplicato, e d'vn purissimo candore, benchè alcune volte, questo colore, nel fine del fiorire si trasforma in colore carneo, cosa molto elegante, e vaga.

Il discogiallo nel crescere che fa, si conuertere in vn frutto simile à quello delle Fragarie nostrane, alle volte però porta questa pianta in vn sol fiore più dischi, che circondano il maggiore, e che nel crescere, e maturarsi diuentano rossi, e formano come vna rosa composta di tanti rubini, nella quale nascono più frutti di Fraghe in vn sol disco, come nell'Imagie osservasi.

Nel sapore non differisce niente dalle nostrane Fragarie: quello delle foglie è asciutto, essicante, & astringente, la sua radice è lunga quasi come è il dito minimo, grossa nel mezzo, e fatta (per così dire) quasi à fuso, coperta di due scorze, e nell'interno di queste sta vn'anima dura, e legnosa di colore rancio, tutta intornata d'altre radici sottili, e queste d'altre fibre sottilissime. Il colore della radice maggiore è nereggiante, e quello delle seconde castaneo: il suo sapore è molto essicante, & astringente, e più di quello delle foglie.

Fulfel Arbore Indiano. Cap. 51.



Fulfel habet folia magna, satis lata, crebrisque nervis ad verticem tendentibus transcusa, & unicusque folio iuncta sunt alia duo angusta, longa, & aliquantulum sursum spectantia. Que omnia habent odorem acutum, ut piper, producit capsulas rotundas in virgulis racematis, in quibus est semen ad modum Piperis, eiusdemque saporis: dum est viride conditur in aceto, vel aqua, & sale, & ponitur cibis vice piperis; multum comeditur à Gentilibus: semen est ex sua natura calidum.

L'Imagine di questa pianta si ritroua nella figura 76. della Tosunda, ouero Castlunda.

Garofano Indiano Velenoso. Cap. 52.



Alla cortesia del Signor Alessandio Balam Inglese (prima d' hora nominato) fui favorito di questo frutto col sopranotato nome, com'anco d' vna specie di Pepe dello stesso luogo nella sua classe descritto. Qual Garofano per la similitudine, e forma che hà cò l'altro oggidì nelle Speciarie commune (benche di qualità contrario) nò ardirei diuersamente chiamarlo, per essergli, mediante però la forma, tal nome adeguatamente appropriato: Anzi di questo, e del sopradetto Pepe, come ancora d' vn certo legno, ch' io teneuo nel mio Museo, nel mezzo del quale eraui scolpita, vna faccia humana, ne fui richiesto dall' Eccell. Ouidio Montalbani Dottore Collegiato in Filosofia, e Medicina, huomo eruditissimo, & in quel tempo Custode, e Sopraintendente dello Studio Aldrouandi, al quale tanto più volentieri glie li consegnai, quanto che dal medemo intesi voler questi inferire nel libro, che destinaua alla luce ne Capitoli del Garofano Aromatico, e Pepe comune sopra li discorsi dell' Aldrouandi, il che poi per la mancanza del Soggetto non successe, lasciando solo memoria nella Dendrologia ^a del soprascritto legno, in cui staua naturalmente scolpita l' imagine humana. Onde accioche di questo ne resti qualche memoria, non m' è parso improprio il soggiungerne quiui quella poca relatione, che del sudetto Garofano mi trouo, tanto più, come penso, non prima

prima d' hora appresso ad alcun Scrittore motivato.

Non era questo di maggiore grandezza di quello, che nell' imagine 47. del Leandro Cretico minore si figura , mostrandosi di forma quadrangolare , e nell' mezzo del corpo alquanto grosso , con punta però tondeggiante , e quasi bipartita nel fine , essendo di sostanza soda , e di color giallo scuro . Non osservai ne di questo , ne del Pepe Indiano altre particolarità , ne tampoco dal sudetto Balam ne' ricercai più distinta historia , come quello , che non mi credeuo douere nauigare per questo vasto mare della Bottanica , e se non saranno di profitto à studenti , seruiranno almeno di materia à poterli nell' affaticarsi in dilucidare ciò , che in sì poco tempo non si potè compire .

Genestra Arborea di Candia con foglie sempre verdi. Cap. 53 .

Fig. 39.



A pianta , che qui si disegna , e descriue nel spazio di più anni è cresciuta nel mio horto in forma d'Arboscello all' altezza di trè cubiti , & in grossezza trè quarti d' oncia , con fusto , che dal bel principio , che esce dalla terra , fino alla cima della pianta produce molti rami tersti , pieghevoli , tenaci , di varia lunghezza , e molto to difficile da romperli , e che biforcutamente scorrono , e circondano tutta la pianta : la sua scorza è scabrosa , facile da leuarsi dal legno ; di colore ferrugineo , strisciata di vene gialle oscure , che continuano fino alla metà del frutice : il colore del legno spogliato dalla scorza è verde nel di fuori , e di dentro colore di paglia , che sfuma alquanto in rosso , maneggiato lascia alla mano certa viscosità , nel modo che fanno le foglie della volgare liquiritia de Speciali chiamata dal Trago nella sua storia , Radice dolce .

a pag. 931. f. 1.
cap. 130.

Si dividono questi rami in altri minori , parimente pieghevoli , & in varie parti inclinati , pieni di spessi occhi , da quali nascono altre propagini di varia lunghezza , tutte nel loro contorno vestite di cespi , & infinite foglie , che rendono la pianta molto folta , quali nel giungere che fanno verso la parte superiore , trasmettono altri ramicelli molto più sottili , vn poco lanosi , e per lo più nudi di foglie , di colore verde , che biancheggia , per causa della lanugine accennata , e questi sono apportatori de fiori , e semi , come qui sotto li dimostrerà .

Produce questo frutice le sue foglie poste senza ordine alcuno, & alle volte vna sopra dell'altra, massime quando la pianta è ancora nouella, ma giunta, che è al suo vltimo termine del crescere, allhora tramanda le foglie vnite insieme, & in altre varie maniere strauaganti, sì che la loro positura è molto difficile da esplicarsi: sono queste foglie di forma piccole, lunghette, e strette, sode, carnose, e crasse, & in varie parti piegate, e riuolte, e mezze riserrate; sì che gli orli, che sono bianchi, anzi argentini, si riguardano insieme in modo, che le foglie sono disposte in forma d'vna conca, con le punte però tondeggianti, & all'indietro riuolte, nelle quali s'ouasta vn breue aculeo di color rosso, e sodo, mà però che non punge.

Sono anche queste foglie coperte d'vn pelo piumoso, che nel di sopra le fa biancheggiare con vn neruo, che poco, ò nulla si lascia vedere, & alcune di dette foglie nell'istesso piedetto sono accompagnate da altre due fogliette minori, vna incontro l'altra: la forma, e grandezza delle maggiori, e minori, sono nell'Imagie separatamente figurate.

Nel mese di Maggio, e di Giugno, tramanda i suoi fiori in tutte le cime della pianta, massime ne' rametti nudi, che sono posti à due, à tre, & à quattro vniti insieme di colore giallo, molto piccoli, che spirano vn'odore grato, imitante quello della Genestra volgare; la forma, e grandezza di questi fiori è in tutto simile (saluo, che nel colore) à quelli d'vna certa specie di trifoglio, che hò visto nel territorio di Sassuolo, e di Montecchio Dominio del Serenissimo di Modena, volgarmente detta da' Paesani, herba medica, e con ragione, essendo questa pianta al mio parere la vera medica di Dioscoride, per corrispondere in tutto, e per tutto alla descrizione del medesimo, come conferma il Clusio nella sua Istoria delle piante rare, b che per tale la figurò, e la descrisse, & altri ancora, i quali per breuità tralascio.

b Pag. 143. &
d. cap. 52.

Caduti questi fiori, rimane nel ricettacolo, vna sola siliqua molto piccola, e breue, colorita d'vn giallo, che rosseggia, nella parte di sopra appuntita, contenendo ciascuna vn solo seme, rotondo, piano, lucido, e di colore scuro, mostrandosi à parte l'vn, e l'altro nell'Imagie.

La sua radice è rotonda, lunga, di colore di Tabacco, che si diuide in più parti, con qualche fibre nel contorno; Questa è della natura del legno; mà più molle, e più piegheuale, lasciandosi riuolgere in ogni parte senza romperli: il suo sapore è grato, quasi simile al seme di Melone: le foglie hanno dell'astringente, accido, & essicante, e quello del suo fiore tira al gusto delle faue fresche; è pianta perpetua, che mantiene tutto l'anno le sue foglie sempre verdi.

Alcuni però, ch'hanno osseruato questa nouella Genestra nel mio orto, si sono creduti sia lo Spartio secondo spinoso, che figura, e descrive Piospero




fig XXXIX.

Cenestra arborea di Candia con foglie perpetue

spero Alpino nel libro delle piante peregrine, e à quali si risponde, che la Genestra, che quì si rappresenta, non porta altrimenti spine nelle cime della pianta come scriue Prospero Alpino del suo Spartio, benchè restino nelle parti superiori di questa rametti sottili doppio che li sono caduti i suoi fiori, e semi, i quali poi si seccano, e restano acuti, che sembrano spine, mà non sono nè meno mai state spine, e ciò interuiene ancora ad altre piante, quando sono secche, benchè sopra quelle non siano mai nate cose pungenti di sorte alcuna.

C Pag. 26 d 27
cap. 13.

Lo Spartio spinoso dell'Alpino porta le sue foglie al numero di cinque in sei da vn' istesso occhio, è nodo, che sia, & alla mia Genestra sono ad vna sola per pedino, e molto diuersamente disposte, come s'è detto nella descrizione, e portato nell'Imagie, e queste al più delle volte ne portano altre due più piccole sotto di loro, e tutte di sostanza erasse, sode, pelose, di colore argentino, che biancheggia, e sono perpetue, e dureuoli, etiamdì l'Inuerno sopra la pianta, oue quelle dello Spartio dell'Alpino sono sottili, e verdi, e cadono ogni anno per quanto io hò offeruato nel mio Giardino in termine di due anni, che vi è vissuta la pianta del medesimo.

Le filique del secondo Spartio spinoso, essendo simili à quelle del primo Spartio del medesimo, e queste parimenti simili à quelle del secondo Aspalato di Dioscoride, come afferma Francesco Pona, d ch'è stato figurato appresso ad alcuni, e con errore, per la seconda Acacia, la quale porta le sue filique irsute, lunghe trè quarti d'oncia, e larghe mezzo quarto, e contengono in se molti semi. Si che lo Spartio primo, e secondo dell'Alpino, sono di filique lunghe, e larghe, come sopra si descriue, oue quelle della mia Genestra sono breui, e ciascuna di loro non contiene altro, ch'vna seme solo.

d Pag. 55 d 56

I fusti della pianta dell'Alpino, scriue esso medesimo, essere molto neri, e quelli di questa sono d'altro colore, comè già s'è detto nella descrizione.

In somma il sapore di questa mia Genestra è astringente, & efficace, qualità direttamente contrarie à quelle dello Spartio dell'Alpino, ch'egli stesso dichiara essere soluenti.

Da tante qualità diuerse, anzi contrarie, che si ritrouano in queste due piante, vna sola delle quali è da se stessa più, che troppo bastante, per riconoscerle l'vna dall'altra differenti, potrà l'erudito Semplicità, alla di cui prudenza, e pratica, sotto-metto sempre il mio parere, giudicarla.

Helxine Cifsampelos di Dioſcoride.

Cap. 54.

Fig. 40



N molti teſti di Dioſcoride, oltre la deſcrizione dell' Helxine murale, che è la noſtra parietaria, eui da parte quella d'vn' altra Helxine cognominata Cifsampelos, e queſta da alcuni interpreti vien collocata nel ſecondo, da altri nel quarto libro di Dioſcoride, molto prima di quella della Parietaria: in altri la mentione di

queſta Cifsampelos viene inſcritta nel Capitolo della murale, il che parmi aſſai diceuole, non eſſendo verifiſimile, che Dioſcoride trattaſſe in due luoghi, l'vno dall' altro poco diſcoſti, di due piante d'vn' medefimo nome: oltre che ſoggiungendo il detto Autore, doppo la deſcrizione dell' Helxine parietaria, quella dell' Elatine, e paragonando le foglie di queſta à quelle dell' Helxine, con chiamarle minori, e più rotonde, non può dirſi, che ſ' intenda di quelle della Parietaria, perche l' Elatine di Dioſcoride ne vâ molto diſſerente, non ſendo ella altro, ſecondo il giudicio del dottiffimo Bauino nella Pinace^a, che la Veronica femina del Mattioli; benchè lo ſteſſo Autore figuri vn' altra Elatine. Eſſendo dunque l' Elatine di Dioſcoride ſimile di foglie all' Helxine detta Cifsampelos, ne riſulta, che lo ſteſſo Scrittore ne habbia poco auanti trattato, e che ſia legittima la mentione del Capitolo precedente à quello dell' Elatine, come nota il Manardi^b nell' Epistoſe medicinali, & obiettionij ch' egli fa alla traduttione, e commentarij in Dioſcoride di Marcello Virgilio, c^o dicendo, *Si Helxine, cui Elatine ſimilis dicitur (vi ait Marcellus) eſt ea, quæ Cifsampelos dicitur, atque eam ob cauſam poſt Helxinem tractata: ſequitur neceſſariò, vi de ea quoquè, quæ Cifsampelos dicitur, ſcripſerit Dioſcorides, & propterea non erat caput illud breue, tanquam ſuppoſitiuum prætermittendum*; come in effetto ſ' offerua nell' interpretatione di detto Marcello^d, e l' iſteſſo pur fece, il Ruellio nel ſuo Dioſcoride d' Argentina^e. Eſſendo per tanto due piante diuerſe preſſo Dioſcoride l' Elatine, c^o l' Helxine Cifsampelos, di cui trattano ancora Galeno nelle ſacoltà de Simplici medicamenti^f, e Paolo Egineta^g, parmi, che con poca ragione le confondeſſe il Trago portandone deſcrizione, e figura come d'vna pianta ſola.

Quale poi delle piante moderne ſia veramente queſta Helxine Cifsampelo, non credo, che per anche ſia ſtato indouinato, perſuadendoſi al-

cuni,

^a Lib. 7. ſec. 1.
pag. 152.

^b Lib. 2. cap. 15
pag. 17. edi-
tione di Baſi-
lea del 1. 40.
^c Lib. 4. ca. 37.
pag. 153.

^d Del 1529 in
ſol. lib. 4. c. 41.
pag. 324.
^e Lib. 6. pag.
810 della tra-
duttione di Trago
ed. Gerardo in
h.

^f Lib. 6. pa. 119
Tom. 4. diſtin-
tione di Andrea
Lacuna.

^g Lib. 7. pag.
723. edit. di
Lione 1714.

fig. XL



Helix aspersa di Dioscoride

cuni, che sia il Viluccio, ò Conuoluolo maggiore del fiore bianco, trà quali Gualtiero Riuiò in Dioscoride ^b con le note di Valerio Cordo; molti affermano, ch'ella sia il Conuoluolo minore, ò sia Scamonea tenue di Plinio, e trà questi è il Fucchio, ⁱ il Ruellio nel suo Dioscoride con figure piccole, & il Cordo sudetto in Dioscoride ^l, il Gcfnero nell'horto ^m, l'Anguilara ⁿ, il Mattioli ne' Commentari latini ^o, e ne' volgari con figure grandi ^p, e nell'Epitome accresciuta dal Camerario ^q, il Gerardo ^r, Gio. Bauino, & il Cherlero nell'istoria loro ^s; Altri vogliono che sij il Còuoluolo nero, come il Dodonco ^t, e prima di lui il Lobellio nelle osferuationi ^u, e ne gli aduerfarij ^x, il quale Autore però oltre il Còuoluolo nero assegna per Helxine Cissampelos il Conuoluolo angustifoglio, che nasce à Scio di Venetia, & altrove, pianta, che non può essere la stessa di Dioscoride, per essere le foglie come le mentionate, dissimili à quelle dell'Hedera. Ne mancano di quelli, che per l'Helxine sudetta assegnano il Conuoluolo argenteo con foglie d'Althea, figurato, e descritto dal Clusio nell'istorie delle piante rare ^y, i quali mi paiono essersi più accostati al segno, essendo le foglie in questa più ederacee, che nelle sudette.

Le quali conditione verificandosi più, che nelle accennate, in vna pianta ch'io conseruo nel mio horto, hauuta già dalla bona memoria dell'illustriss. & Eccell. Sig. Nicolò Leoni nobile Venetiano, che possessore d'vn famoso Giardino di fiori, e piante rare in quella Nobilissima Città, con nome di Conuoluolo con foglie hederacee, mi faccio à credere, che questa sia l'Helxine Cissampelos di Dioscoride per portare le sue foglie, che partecipano non solo dell'Hedera, mà della vite ancora, come spiega dal Greco il mio interprete, e non d'Hedera solo (come alcuni hanno inteso, e come auanti si dimostra) il quale così descriue, come si legge nel testo di Basilea del 1529. capitolo 4. *ἡλξίνη ἔχει φύλλα ὅμοια κίσσου, ἡλαττοῖα δὲ, καὶ πλεονά μικρὰ περισπλούμενα ὅτε ἀνέχου φύλλον δι' ἐπ' αὐτοῖς, καὶ ἀμπλώσι, καὶ σίτη.* e secondo l'espositione del Mattioli, *Helxine, cognomento Cissampelos, folijs est hederae, minoribus, ramulis exilibus, quibus amplectitur quodcumque conigerit adminiculum: nascitur in sepibus, vineis, & segetibus, foliorum succus potus deiecit aluum.*

Cresce adunque questa pianta all'altezza di tre braccia, e d'auantaggio ancora, auuicchiandosi come i Conuoluoli à ciò che incontra con molti fusti rotondi, lunghi, e sottili, i quali trafmettano altri ramoscelli, che crescono poco meno de' primi, dalli quali nascono le foglie vna per ogni nodo, mà queste sono per lo più simili à quelle dell'Hedera, però proportionatamente più picciole, e più acuminate, di sopra verdi, e di sotto bianchiccie, vn poco merlate nel contorno, e vestite di pello briue, mà sodo, che rende non solo le foglie, mà tutta la pianta aspra al tatto, con

nerua-

h Lib. 4. c. 31.
pag. 306.

i Cap. 97. pag.

319

k Lib. 4. c. 31.

pag. 303. 304.

l Lib. 4. cap. 39

pag. 34.

m Pag. 355.

n Parere 5. 30.

o Pag. 294.

p Lib. 4. c. 35.

pag. 646.

q Lib. 4. c. 410

pag. 1065.

r Pag. 753.

s Lib. 3. cap. 3.

pag. 803.

t Lib. 15. c. 32.

p. 338. Tom. 2.

u Lib. 3. cap. 6.

ram. 3. pag.

396.

x Pag. 343.

y Pag. 271.

y Pag. 49. c. 10

lib. 4. cap. 34.

nerature di sotto rileuate, che dall'altra parte paiono solcate: quanto più s'auuicinano alla sommità, tanto più incise, e dentate si vedono, e prendono somiglianza di quelle dell' Alcea de gli Herbari, ouero Althea di Teofrasto, eccettuatene poche nel tralcio maggiore, come solamente dentate, se più tosto però non sono da paragonarsi con quelle della vite, per la similitudine delle quali non meno, che per quella delle foglie hederacee, questa pianta corrisponde esattamente al cognome Greco di Cissampelos, che stimo douersi intendere più della figura delle foglie mezzane trà quelle dell' hederà, e della vite, che del luogo natale, come altri hanno giudicato; perche altre piante ancora oltre li Conuoluoli nascono nelle vigne, e non perciò hanno hauuto il cognome di Cissampelos.

Verso l'estremità de rami nasce nel piè d' ogni foglia vn bottone alquanto lungo, sostenuto da sottile piedetto, che s' apre all'apparire del Sole in vn fiore di figura, e grandezza simile à quello della Scamonea, mà di colore delle rose comuni, & all' occaso si riserra, ne mai più si riapre, immitando in ciò il costume de fiori della stessa Scamonea, e d' altri molti Conuoluoli, e presto cade, dando luogo ad' vn frutto, ò siliqua breue, mà grossa, come si rappresenta à parte nella figura, nella quale frà il mese d' Agosto, e Settembre si maturano quattro semi neri, triangolari, della grandezza, che separatamente s' offerua nell' Imagine.

La radice, che serpeggiando trasmette nuoui germogli, e foglie nella superficie della terra è bianca, rotonda, sottile, nodosa, e che di sotto inclina al giallo. Masticata insipida, e rende succo mucilaginoso senza odore: le foglie hanno sapore dolce, simile à quello del Cece fresco, e maneggiate, che siano, inuiscchiano qualche poco le mani, come fanno quelle della Mercuriale, Scamonea, e Viole; e quindi ne cauò, che questa pianta, come la Cissampelo di Dioscoride habbia del purgante.



fig. XLI



Sacca di Candia con la Radice



fig XLII



Sassa di Candia Ramo fiorito

Iacea Spinosa Cretica, anzi specie di Hiosiride
Pliniana. Cap. 55.

Fig. 41
e 42.



Apitò il seme di questa prima con nome di Iacea di Candia, se bene alcuni dicono, impropriamente però, che fosse portata dalla Pannonia, & altri dall' America, la quale si rappresenta con due Imagini per essere pianta molto folta, e grande, come può vederfi in questo

Horto publico, che si conserua ancora mediante il fauore del Cielo: nella prima adunque si figura la radice con li suoi cespi di foglie, le quali nel crescere, che fanno, occupano del terreno assai; nella seconda si rappresenta vn ramo fiorito, acciò si possino meglio osservare le sue vere fattezze, e qualità.

La sua radice è lunga, e grossa quasi quanto vn braccio humano, rotonda, gruppofa, che dal mezzo in giù si diuide in varie radici, che scorrono ondosamente in diuersi parti della terra, raramente contornate d'altre simili radici, benché minori, coperta d'vna scorza grossa, e succosa, e nel maneggiarla viscosa, con molte scauature, che variamente la solcano. Il suo colore è simile alla terra d'ombra, che inclina vn poco al giallo, con anima bianca, e tenera: Nell'esterno dalla parte superiore d'essa spuntano diuersi tuberetti ineguali della medesima sostanza della radice, li quali crescendo trasmettono nouella prole.

Da questa gran radice spuntano molti germogli, li quali allargandosi mostrano foglie simili à quelle della volgare, e domestica Cicorea, maggiori però, e che s'alzano alle volte più di due spanne su la terra, larghe più di quattro dita per il trauerfo, massime le superiori, che sono sopra il ramo foglioso, l'altre sono minori, e largamente, e senza ordine alcuno diuise l'vna dall'altra, lasciando però il neruo delle foglie alato, effendo poi nel contorno merlate con denti larghi, ineguali, breui, e nella cima spinosi, e da ogni parte coperte d'vn pelo bianco, & aspro, il lorò piedetto è rotondo, e taluolta riesce triangolare.

Più fusti sorgono da questi germogli, la cima florida d'vno de' quali viene rappresentato nella seconda figura, pieno di midolla verde, grosso circa vn quarto d'oncia, rotondo sì, mà ineguale per causa di certe nerature grosse, e risseate, che lo scorrono per il lungo, in maniera che si mostra alato, e con cinque faccie, ò angoli, massime nella parte superiore, alto
O quasi

quasi vn braccio, e mezzo, con rari nodi, l' vn dall' altro discosti circa d'vn deto, da quali nascono le sue foglie senza alcun piedetto annesso, si che dalle due bande figurano vna forma d'orecchia, e ne resta il caule à luogo, à luogo alato.

Frà questi nodi, e foglie nascono altri fogliosi cauletti, e da questi secondi escono pure i terzi, quali nel crescere portano in capo bottoni spinosi, e foglie simili, non però diuise con tante incisure, mà solo vn poco détate, e per lo più nelle cime, sono senza alcuna merlatura, ne incisione; il bottone è oblungo coperto di squame, da ciascuna delle quali esce vna spina lunga, accompagnata d'altre cinque, ò sei, che la contornano, mà ineguali, riuolte parte all'in sù, e parte all'ingiù: questi durano gran tempo à fiorire, e nell'apprirsi, che è dal principio di Giugno fino al fine di Settembre, trasmettono vn globo di molti fiori, nel modo dell'altre Iacee, e Ciani, cioè con cinque fogliette ineguali per ciaschedun fiore di colore morello, i quali contornano vn' altro fiorino molto minore dello stesso colore, mà nel fondo riesce carneo, con apici appuntiti.

Caduto questo fiore rimane nel ricettacolo vn seme variegato, che si matura d'Ottobre, e questo riesce lunghetto, liscio, lucido, coronato nella parte superiore di peli breui, e sottili, trascorso di linee, ò striscie lunghette, di color giallo scuro, poste sopra à campo bianco, si che riescono molto vaghe, di forma simili à quelli della Centaurea maggiore, come nella seconda figura si vedono, & ancora il fiore, l'vn, e l'altro separati dalla pianta.

Questa Iacea di Candia, ch'ora si è descritta, non è la Iacea Pannonica, che porta il Clusio nell'Istoria delle piante rare ^a, ne meno la terza, ne la settima Cretica dello stesso Autore, benchè questa sia ancora lei di capo spinoso, come dal confronto delle descrizioni di queste, e della mia si può manifestamente conoscere: nè meno è la Iacea, che descrive Gio: Bauino ^b con capitelli spinosi, e seme variegato, perche quella del Bauino hà le foglie larghe vn palmo per il trauerso, e tutta dalla radice sinò al fiore con incisure diuise; se bene in questo particolare non dimostra l'immagine ciò, che lui si descrive, che sono sempre incise à somiglianza delle foglie del Ciano, e del Hierasio, con capitelli pure di Ciano, e della volgare Iacea, la quale è di squame hirsute, pelose, e ricciute, mà le foglie della mia sono la metà più strette, e nel contorno spinose, e le più discoste da terra, menò incise, anzi quelle, che s'auuicinano al fiore sono senza alcuna incisa.

La di lei radice sul principio gustata è di sapor dolce, mà nel fine mordicante con siccità, qual stropicciata rende odore noioso simile à quello dell'Aro volgare: il sapore delle foglie è amaro, secco, e mordace. Nelle vir-

^a Pag. 6. cap. 2. lib. 4.

^b Tom. 3. pag. 33. lib. 25.

fig XLIII



le virtù è questa pianta simile all'altre Iacee, posciache se la volgare di queste specie, detta su l' Bolognese Lambruna, e dall' Anguilara, e dal Dalecampio in Plinio ⁴ ancora Hiosiride Pliniana, è di singular remedio all' uicere della bocca, & applicata alle ferite contuse, potrà con ragione affermare essere nella mia queste, e maggiori ancora, mentre mi son scruito delle di lei foglie nell' uicere delle gambi con felicissimo successo, riducendole à perfetta sanità: soggiungo al Lettore, che queste specie di piante le chiamarei più tosto col nome di Hiosiridi, che di Iacee, per corrispondere alle virtù dalli Antichi alle Hiosiridi assignate.

c. Par. 72. pag. 116.
d. Pag. 670.

Iacea Arborea Argentea di Ragusi, parimente specie di Hiosiride. Cap. 56.

Fig. 43



Rasmette sopra terra questa seconda Iacea vn' fusto, che cresce alcuna volta all' altezza di quattro deti, come bene si vede nell' imagine, cioè dalla radice sino oue comincia à diramarsi, di forma ineguale, mà però, che tondeggia, grosso quasi che il deto minimo, e coperto di scorza gialla, e ruginosa, sopra del quale si diuidono molti altri fusti parimente grossetti, lanuginosi, candidi, inarcati, e d' vn nodo, all' altro ondeggianti, pieni di midolla verdeggiante, e succosa, circondata di legno sottile, e filoso, sono spessi li nodi in questo luogo, massime nel fondo, oue comincia à diuidersi la pianta, da quali trasmette le sue foglie senza ordine alcuno, essendo le prime totalmente intiere, e simili à quelle della Scabiosa arborea di Candia, che descrive, e figura Francesco Pona ² nel suo Monte Baldo: le seconde poi nel fondo delle foglie cominciano a diuidersi con due denti, e poi con quattro, continuando così fin tanto che sono intieramente frastagliate, come gli succede, massime verso la metà del fusto.

a. Par. 48.

Oltre la solita prole fogliosa germogliano ancora altri cespi folti, e parimente fogliosi, ch' apportano in esse strane incisure, & iui le foglie per lo più s'allargano, e tondeggiano nelle cime, & in varie parti si piegano, e si rinoltano, sì che per il loro lanoso candore rendono vn' effetto molto vago.

Giunti che sono questi fusti verso la parte superiore apportano molte foglie simili alle prime della pianta, cioè tutte intiere, niente intagliate, e più di quelle appuntite, & altre ancora simili alle seconde diuersamente

O 2

acute,

acute, & incise; nel giungere che fanno questi fusti verso le loro cime tramettono molti bottoni grossi, e bislonghi, coperti, come tutto il resto della pianta, cioè d'vna lanugine bianca, & argentina, la quale maneggiata si leua con molta difficoltà, massime nelle foglie, e leuata che sia, tutte le sue parti restono di colore verde scuro.

Sono questi bottoni coperti di squame nell' interno gialle, e lucide, come oro, nel fondo larghe, nel contorno dal mezzo in sù ferrate con denti sottilissimi, e pungenti, e nella cima porta vna spina acuta, e similmente pungente.

S'aprono del mese di Giugno, e lasciano vscire vn fiore vago, e non senza qualche poco d'odore non ingrato, il quale è composto d'vna gran quantità di fistule ritorte, che sembrano cornette, quali tutto il loro contorno circordano: sono questi fiori, molto sottili, e lunghi di canna, e nella cima s'aprono in cinque sottili, & acute fogliette, dal mezzo di ciascuna delle quali spunta vn filamento, ouero stame lungo, e corniculato, e fuori di questo ne spunta vn' altro, che riesce molto sottile, e tutti nella cima si curuano, e si diuidono in due punte sottili, come à parte si dimostra nell' Imagine con la loro grandezza naturale di tutto il capirello, caduto il fiore rimane verso il fine di Luglio nel ricettacolo il suo seme, il quale parimente si vede nella figura, & è simile à quello dell' altre Iacce di colore gialleggiante, e lucido.

La sua radice è breue, sottile & ondeggiante, e si diuide in molte altre simili, mà più sottili, e fibrose, niente piegata si rompe con stridore, come se fosse composta di sottilissimo vetro, o vero di ghiaccio, di colore giallo rosseggiante, con anima bianca nel mezzo, la quale difficilmente si separa; e questa radice hà odore di Brassica hortense: il suo sapore è aromatico, come di Tartufo, che si ritroua ne monti del Modonese, mà alquanto pungente, & efficante; quello delle foglie è molto amaro, anzi amarissimo, e simile à quello del cardo, e lascia nel palato gran siccità. E' pianta perenne, che si moltiplica di seme, e di propagine ancora, come fanno li Garofani, la Stecade Citrina, & altre piante simili.

sss

ss

s.

fig XLIV



Igli & Ende Terra dell'
Isola di Solor.

Igli d'Ende Terra dell'Isola di Solor.

Cap. 57.

Fig. 44.



I questa Pianta ne' Libri manuscritti del Padre Matteo non vi ritrouo descrizione alcuna, salvo che il sopranotato nome, e la propria Imagine, che qui si rappresenta, dalla quale (per quanto dalla medesima si vede) parini douersi argumentare, che gl' Abitanti di quell' Isola, tagliandolo gli cauino qualch' oglio, liquore, gomma, ò altro per vso della medicina, ò pure, come in altri simili vsasi, si seruino della di lei scorza col cauargli qualche materia tenace, ò filosa atta al fabricare tessiture, il che non ardisco à firmarlo, per non hauerne (come hò detto) alcun raguaglio. Godi intanto ò Lettore la sua Imagine, finche d' esso ne venghi più chiara relatione, sperando in breue possi seguire (come per lettere il Sette mbre passato venutemi da Goa, e dal Malabar) hauerne sì di questo, come d' altri più distinta informatione, che seguendo, non mancherò di darle alla luce, accioche, rieschino d' vtile, e profitto à Studenti.

Kanadi pianta dell'Indie Orientali detta
anche Konade. Cap. 58.



Rà le piante, che scrissi nel Capitolo dell' Ardabar, ritrouasi ancora questo Kanadi, la cui figura nell' Imagine 71. della Siderite Cretica si rappresenta assieme con la di lei relatione dal Padre Fra Matteo nel seguente modo descritta.

Hae planta est pulcherima visu, cuius radix est tuberosa, valide crassa, & scabrosa, quae plurimas radices emittit, in vertice verò multa folia, parua quidem, sed longiora, inter quae aliquot assurgunt virgulae, iunctorum instar, ad altitudinem quinq; sexue palmarum, quorum in vertice flos eminet luteus simplicis rose non absimilis, e floris medio tria flamina prodeunt, apices in summae ferentes aurei coloris, & figura cordis caelestem verò hi flores spirant odorem, ut langè sentiatur, & per totum palatinum in quo repositi fuerint odore suauissimo redolent.

keiri

Keiri con foglie dentate, Alpino di fior giallo odorato. Cap. 59.

Fig. 45.



I troua questa pianta nelle Alpi del Bolognese ne' balzi delle scale, frà il terreno, e le fissure de' sassi, alla quale per la similitudine, che hà col keiri, ò sia la viola gialla commune, tanto nell'odore, come nel fiore, e nelle stesse foglie, eccetto, che più strette, e dal mezzo in giù dentate, come dimostra nell' Imagine, hò posto nome di kieri Alpino; benché gli conuerrebbe ancora quello di Viola Siluestre sassatile, per hauer parimente qualche similitudine con la viola siluestre, che figura, e descriue il Clusio nell' Istoria delle piante rare ^a, & anco dal Bauino notata nella Pinace ^b, con nome di Leucoio giallo siluestre angustifoglio, mà tale pianta, al mio parere, è da questa assai diuersa, e similmente da gl'altri keiri, ò siano Leucoij siluestri, dalli herbari descritti, dalle seguenti sue note si conoscerà.

Questo nouello keiri Alpino sassatile, da vna sola radice, trasmette sopra terra molti cespi di foglie di colore, che nel verde biancheggiano, di forma lunghe, e strette, ondegianti, sode, & al tatto aspre, piumose, e dalla metà in giù raramente dentate, restando l'altra parte delle foglie superiori senza denti alcuni, queste sono trascorse da vn neruo più bianco, che non sono le stesse foglie, che nel di sotto si rileua, e restano nell'altra parte, con solcature rare.

Portano questi cespi, ciascun di loro i suoi fusti, i quali non sono molto grassi, trascorsi da neruature rileuate, che gli rendono aspri al tatto, alti circa d'vna spanna, dello stesso colore delle foglie, nel di sotto curuati, duri, legnosi, che piegati si rompono con stridore, pieni di midolla bianca, di forma rotondi, mà assai ineguali per causa delle sudette coste, ò neruature riluate. Sono folti di nodi, se più tosto non sono occhierti posti senza ordine alcuno, con foglie simili alle sopradescritte, benché più strette, e più acuminate, e senza piedetti à medesimi congiunte.

Frà queste foglie, & il fusto, nasce altra simile prole, della forma delle antecedenti; benché minori, e senza denti, e da questi escono i secondi, e tutti insieme, con i maggiori portano nelle parti superiori vn mazzetto di bottoni verdi, disposti quasi in forma d'ombrella, annessi con piedetti breui, e bianchi, simili à quelli della sudetta viola Clusiana, quali nell'apprirsi, che fanno verso il principio di Luglio lasciano vedere vn fiore di colore

^a Lib. 3. pag.
399 cap. 6.
^b Lib. 6. fol. 3.
pag. 101.

fig XLV

Keiri con foglie dentate Alpino



colore giallo, simile à quello del *Keiri* volgare, come ancora nell'odore, che spira. Sono questi fiori composti di quattro fogliette, nel di cui mezzo esce vna filiqua verde con vn bottoncino in capo circondata da quattro stami bianchi.

Cadute le foglie de' primi fiori rimane la detta filiqua, che poi s' allunga, e così à poco à poco nel fiorire di quelli, e nel cadere di questi, formano vna spica assai lunga, piena di filique sottili, nella punta acuminate, lunghe quasi il doppio di quelle, che s' osservano nell' *Imagine*, le quali del Mese di Settembre maturano, e portano vn seme rosseggiante, e lungo, che visto col microscopio da vna parte appare più grosso, e dall' altra, in tutto simile à quello della detta viola siluestre del *Clusio*, mà più grosso. benchè questo mio *Keiri* sia pianta minore.

La sua radice è soda, bianca, piena di midolla legnosa, che rosseggia, e tramanda d' ogn' intorno molte altre radici fibrose, che rende odore di rape, & hà sapore molto amaro, & asciutto. Le foglie, & il fiore, oltre all' odore accennato, sono amarissime, mà però con meno siccità. E' pianta perenne.

Lamba Arbore Orientale.

Cap. 60.



Lamba est Arbor valde alta, nasciturque in locis sylvestribus, cuius folia sunt parua, Parietaria nostra similia, ramos habet longos, equali proportionem distantes, fructus vero sunt similes Nuci, saporis accidi, ut Cerasa nostra Marasche dicta, coloris aurci, ideoque mulieres eos colligunt ad tingendos capillos eodem colore, sed id secretum, nam punirentur, cum prohibeantur colligere, & id, ut

Aues illis vascantur, nam deficientebus fructibus, Aues morirentur, & sic videtur in magna copia super arbores istos, & nemo audet illos tangere timore supplicij.

L' *Imagine* di questa pianta è nella figura 23. della *Bucbenda*.



Lamio Arboreo perenne di Candia.

Cap. 61.

Fig. 4.



On è gran tempo che mi nacque questa pianta nel mio orto, che poscia cresciuta la trasportai nel publico di questa Città, il di cui seme mi fu mandato sotto nome di Galeopsi Cretica del Maranta, cosa in vero ch'io non direi, nè sò come possi attribuirsi simil nome à questa pianta, che non è ne meno da connumerarsi nel genere d' esse; anzi, se deuo dire il mio parere, credo che il Maranta stesso non l'abbia mai veduta, e che à tempo suo, che fù à mezzo del secolo passato, non fosse ancora nota, essendo solo da pochi anni in quà venuta à notizia de' Semplicisti, appresso alcuni de quali è in concetto di nuoua osservatione, & in questo sentimento più mi confermo, vedendo, che lo stesso Scrittore nel suo metodo di conoscere i Semplici, non fece alcuna menzione di questa pianta, mà solamente tocca alla sfuggita la Galeopsi, nominandola solo; in quanto egli con ragione riprende coloro, che credono, & hanno scritto, che la Galeopsi di Dioscoride sia quella pianta, che dal Volgo vien chiamata Ortica fetida, figurata dal Lobellio nelle Immagini à sotto nome d' Ortica inerte seconda, e dal Dodoneo Ortica non mordente fetida purpurea, e così con tali nomi vien descritta vna pianta, che tanto si discosta dalla vera Galeopsi di Dioscoride, la quale si troua, non solo in questo publico, e nel priuato mio orto, mà offeruasi ancora nascere nella nostra Italia, anzi in alcuni nostri luoghi circonuicini:

Trà tanto per tornare alla mia pianta, quantunque il primo seme, ch'io n'hebbi fosse venuto di Candia, oue intendo essere assai famigliare, nulladimeno da Marco Nanni mio huomo solito à mandarsi in varie parti d' Italia in traccia di piante fù ritrouata à caso presso il mare di Toscana alle radici del Monte Argentario in vn luogo chiamato il Tombalo. E perche, come s'è accennato, non corrisponde in conto alcuno alla Galeopsi di Dioscoride, nè d' altro Autore, per mancare d' odore fetente, di fiori purpurei, e d' altre note, che si ricercano nella sudetta; anzi che più tosto gli conuiene il nome di Lamio fruticoso senza macchie di Candia, che di Galeopsi, e per tale apunto hora si rapresenta in figura, & in descrizione.

Sono molti li fusti, che tramanda dalla radice, parte de quali si alzano à più d' vn cubito, e mezzo, essendo li maggiori grossi quanto è vna penna da scriuere, rotondi, benchè per certe coste sottilissime, che sono nella

a Pag. 97. lib.
2. cap. 5.

b Pag. 120.
c Lib. 1. pag.
351. cap. 35.
pempte de 2.

fig XLVI



Lamio fruticoso senza macchie all'andrea

nella scorza, che gli ricuopre, paiano quadrati; la quale leuata che sia rimangono i cauli rotondi, coperti però d'altra scorza, che è verde, e difficilmente si toglie dal legno, che riesce molto frangibile con midolla verdiccia, circondata da sottile dogia legnosa.

Tutti però questi cauli partecipano la natura del legno, eccetto quelli, che sono nelle parti superiori della pianta, dalla quale, quanto più si scostano, tanto più tengono dell'erbaceo, il che appare ancora nel colore; essendo verso le sommità più verdi, che non sono da basso; tanto parimente s'osserva ne gl'altri fustarelli, che da questi principali per ogni parte si diramano in copia, e la rendono molto fissa di rami, e di foglie.

Sono li suoi nodi rari, massime ne' gambi legnosi, mà assai più frequenti negl'altri minori; tutti spiegano le sue foglie, delle quali le prime nate, e specialmente quelle della parte inferiore de' cauli principali, si fanno assai maggiori dell'altre, & in particolare in quei luoghi, ne' quali per l'abbondanza dell'alimento proportionato, può la pianta lussuriare.

E quindi forse è venuto, ch'altri habbiano creduto questa essere vna Galeopsi, considerando la grandezza delle di lei foglie maggiori, che veramente sembrano hauere qualche similitudine con quelle della vera Galeopsi; le altre più piccole sono di grandezza, e di forma simili a quelle del Camédrio, o sia la volgare Trissagine.

Essendo queste foglie gentilmente solcate al di sopra danno a vedere nella parte opposta rileuate le nerature, non lasciando però d'essere lisce nel rimanente, si come sottili, tenere, e succose: fanno ancora tal volta, pompa di qualche lucidezza: le sostentano piedi breui, e sottili, che rottondeggiano, e nella parte inferiore presso la foglia si scorgono parimente solcati, & alquanto pelosi: alternano quelle a vicenda le loro faccie, nascendo à due à due opposte; non si seccano, e non cadono per il freddo, mà tutto l'Inuerno si conseruano con la loro verdura.

Ne gl'ultimi nodi verso la cima de' gambi nascono alcuni calicetti rotondi, che terminano in cinque raggi, o siano ale, che nelle loro estremità portano vna piccola incifura: da questi verso il mese di Maggio spunta vn fiore bianco galeato, il di cui labro superiore hà due punte bipartite, e l'inferiore ne hà tre tripartite, e crespè con le punte, che riguardano all'ingiù, e variegato nell'interno di linee giallette, e dal mezzo manda fuori alcuni stami con apici incuruati di color giallo: caduto questo rimane il calice col seme nero simile à quello del Melantio siluestre, quale appresso di noi arriua à giungere alla sua perfettione.

La radice lunga, rotonda, e ritorta, facendo molte diramazioni lascia partire da se quantità grande di filamenti molto fibrosi: riesce di colore, che partecipa del bianco, e del tannè, si chiama volgarmète cauellino

chiaro: la di lei portione più soda è piena d'vn legno bianco, e duro, mà molto facile à romperfi. Gustata lascia il sapore di faua fresca: le foglie hanno odore come quelle del moro Gelfo, quando hanno seruito di letto à bacchi di seta: masticate rendono la bocca secca con vn debole sapore d'Eruca.

Esposta questa pianta all'aria aperta del mio giardino non passò l'inuernata, mà piantata che fù poi a canto alla muraglia, oue dalle tramontane non puote essere offesa, campò felicemente, e crebbe in altezza di più d'vn braccio, e mezzo, crescendo abbondantem nte in tutte le sue parti, e propagandosi non solo col seme, mà ancora con li proprij rami. E' pianta, che viue più anni.

Leandro di Candia fruticoso maggiore fetido. Cap. 62.

Fig. 47.



2. Tab. 12. fig. 47.
3. pag. 409.

Ve specie di Nerio, ouero Leando trouo notate presso gl'herbari, quali per essere quasi à tutti cognite, e registrate da Gasparo Bauino nella Pinace, non mi diffondo in spiegarle. Tengo ben sì nel mio horto vn frutticetto, del quale venne il suo seme di Candia sotto nome di Cneoro nero, qual parmi degno d'esser collocato più tosto f' à le specie de' Leandri, che de'

Cneori, massime vedendosi appresso gl' Herbari di questo Cneoro nero varie opinioni, credendolo chi vna pianta, e chi vn'altra, mà io, se deuo dire il mio parere, lo stimo p' r' anco à gl' huomini incognito, benchè questo mio frutrice, ò più tosto sottofrutrice, che qui si propone per vna specie di Nerio à comparatione de' sudetti rieschi molto piccolo, e quasi rassomigliante altra cosa, nientedimeno è vn genere di pianta, che porta fiori à quella simiglianza, anzi di quel colore, e dello stesso odore cattiuo, e consta ancora di simili qualità maligne, e venefiche, onde lo crederei essere vn genere d' essi, come conoscerà chi legge, e perciò hò pensato bene il dargli nome più tosto di Leandro, che di Cneoro.

Da radice perpetua, fibrosa, sarmentosa, e serpeggiante, sparge questa pianta sopra terra molti fusti ondeggianti, alti circa vna spanna, sottili, rotondi, legnosi, e nodosi, nel di sotto coloriti di berctin chiaro, alquanto lucidi, i quali poco più sopra si cangiano in colore gialletto, mà i rami

fig XLVII



Leandro frutifero di Cardiafendomag

i rami superiori sono del tutto verdi: s' estendono questi fusti per il largo, e formano vn notabile giro, e se alcuni d'essi vëgono à toccare terra, iui tramettono le loro radici, & ogni nodo germogliano due, ò tre ramoscelli fogliosi l'vno contro l'altro, e questi ancora ne tramettano altri più piccòli, in maniera che rendono la pianta molto folta, e piena di foglie con breue piedetto al fusto congiunte, & insieme vnite, e nell' istesso occhietto, ò nodo, che supera in grossezza il medesimo fusto, nasce altra prole, e cespi di foglie minori: il loro colore è verde scuro, che sotto s' impalidisce, di sostanza grossette, e dense, solcate nel mezzo, e sottilmente delineate in modo, che paiono quasi scritte.

Sono queste foglie alquãto lunghe, e nel mezzo larghette, che finiscono in acutezza in ambe le parti, di forma simili à quelle di certa pianta, chiamata dal Cesalpino nel suo Volume ^b Cento grana, la quale fù impropriamente proposta d' alcuni sopra Dioscoride per Paronichia seconda, mà io direi più tosto, ch'essa piãta fosse la vera Paronichia del medesimo Autore, rassomigliandosi assai più questa, che quella, come fù parimente osseruato dall' Anguillara nel parere decimo, chiamandola ancora nel duodecimo, Gramigna seconda di Plinio, mà le foglie di questa pianta, ouero Paronichia vera sono di sostanza più tenere, e più sottili.

^b Cap. 4. pag. 166.

^d Cap. 164. d pag. 118.

Nel giungere, che fanno questi fusti maggiori verso le cime, tramandano vn cespo di foglie, nel mezzo delli quali germogliano molti bortoncini verdi, ciascuno de quali nel mese di Giugno trasmette molte fistule lunghe, che apprendosi mostrano gli suoi fiori rosseggianti, incisi nella cima, e composti di quattro fogliette riuolte all' in giù, della forma, e colore simili à quelli del Leandro volgare, ma ragioneuolmente molto più piccòle, anzi sono della grandezza stessa, che s' offerua nella figura, ch' esprime al naturale tutta la pianta, e questi imitano assai quelli del volgare Gelsomino; benchè vn poco minori, e sembrarebbero gl' istessi, se il colore non ne palesasse la differenza, come anco certe linguette rossigne, che gli stanno nel mezzo con quattro stami bianchi, che portano apici rossi, li che paiono tanti dardi insanguinati; nel mezzo poi del canale, ò fistola, che riesce vn poco quadretta, siede vn stile, la di cui base cuopre il ricetracolo del frutto, che del mese d' Agosto s' incammina alla maturità.

Stà questo seme nascosto in certi piccòli frutticini vniti insieme, di colore verdeggiente, e in forma d' vn pero, come ben si mostra nell' imagine, nella cui cima risiede vna sottile codetta ritorta: maturati che sono questi frutti, diuentano morelli, e succosi, come sono quelli del mirto, e perfettio nato poi riesce nero, e lunghetto, che sembra il seme del Gelsomino Indiano pennato, chiamato ancora con nome di Quamoclit, benchè minore.

La radice è assai grossa, legnosa, perpetua, ondeggiante, ò variamente curua, la di cui scorza si diuide in tre, l' esteriore è nereggiante che facilmente si leua dalla sua vicina, la media è tenera, e gialla, la terza leuata dalle altre rosseggia, come pure fa l'Eritrodano, ouero Rubbia de tintori, con anima legnosa nel mezzo, che parimente tira al giallo: da questa radice maggiore, massime verso la superficie della terra cadono molte serpeggianti catene, che si estendono nel contorno della medesima, e moltiplicano i germoglij, & in nouelle piante.

L' odore di tutto questo frutticetto è spiaceuolissimo, rendendo vn gran fetore, alla simiglianza di quello del fiore della volgare Serpentaria, ouero Dragoncello maggiore degli Antichi, creduta d' alcuni, ma con errore, essere la Serpentaria minere, e per questo suo cattiuo odore, offende il capo, e l' adolora: in oltre nuoce à gli occhi, causandogli vna certa arsurà come parimente fa il volgare Leandro, qualità, che me lo fa creder vna specie di questo: il sapore è ingratisimo, & amaro; portata in mano offende la respiratione, e conturba tutta la natura, e però non è fuori di ragione il credere, che ella sia velenosa, anzi secondo il mio parere velenosissima.

La di lei Patria è Candia; benchè altri affermino essere ella di Ragusi, nè questi, nè quelli stimo s' ingannino, non essendo impossibile, che naschi in ambidue questi luoghi, massime essendosi offeruato, che molte altre piante venute di Candia si sono trouate ancora intorno à Ragusi, e parimente ne' monti Marittimi men freddi d' Italia.


Nel Regno di Candia pure si troua vn' altra specie di questo Leandro, mà minore, la descrittione, e figura del quale è la seguente.



Lean-

fig XLVIII.

Leandro frutifero minore fetido di Candia



Leandro minore fruttifero di Candia.

Cap. 63.



Opo il Leandro maggiore sopranotato, ne segue vn' altro del medesimo luogo, bench' esso sij di foglie, fiori, e di frutti minori, qual s'erge alla stessa altezza del primo: e se la natura gli fù scarfa in farlo crescere, non gli fù però parca di vigore in farlo germogliare copiosamente, posciache diedegli modo di produrre dalla sua radice vna gran quantità di fusti

disposti senza ordine alcuno sopra la pianta, questi sono di forma rotondi, tortuosi, & ineguali, di scorza, e di legno simile al Leandro antedescritto: nel crescere che fanno cominciando dal principio della corona radicale si moltiplicano in altri fustarelli, i quali nel giungere che fanno verso le parti laterali, e superiori, si diuidono bifurcatamente in altri tanto minori. Da ciascheduno de' quali nascono le sue foglie interciamamente poste sopra questi, e qualcheduna ancora vna incontro l'altra, eccetto nelle cime, che si riducono in varij cespugli di foglie. Sono queste simili à quelle del sopracennato Leandro, mà però più strette, più lucide, e di colore più palide. Sono di sostanza carnosae, e pelose, tengono ancora queste foglie molta somiglianza, oltre à quelle del sopranotato Leandro maggiore, massime se fossero lucide, con quelle di cert' herba, che figura, e descrive il Clusio nell' Istoria delle piante rare, la quale fù dal Tabernamontano nelle Imagini ^b, e dal Gerardo nell' Istoria ^c per Poligono montano proposta.

^c Lib. 6. cap. 3. p. 8. 86.
^b Fig. 412.
^c cap. 171. pag. 360.

Giunti che sono li sopracennati rami al tempo del fiorire loro nascono dalli sopra mentouati cespugli li suoi bottoncini di color verde, nell' aprirsi che fanno frà Maggio, e Giugno mostrano li suoi fiori, mà però non in tanta quantità, come nel primo, mà à due, à trè, & al più (ch'io habbi notato nella pianta) à quattro insieme, simili di figura all' ante notato, mà non così lunghi, e quali dello stesso colore rosso, che sfuma in persichino.

Dopo la caduta di questi restano nel cespuglio altri tanti frutti, che maturati si lasciano vedere simili alli sopradescritti del Leandro maggiore. Rotta, e stropicciata che sij la pianta, esce appunto da lei vn fetto così puzzolente, come quello della pianta auanti descritta, per il che mi fà credere constare delle stesse qualità maligne di quello, al quale ancora si rassomiglia nella perennità.

La

La sua radice è lunga, intrecciata, serpeggiante, contorta, e piena d'altre sottili radicette parimente (come sono i rami) bipartite; queste sono di color ceruino, e nell'interiore tinte di giallo scuro, maneggiata che sia, oltre al di lei cattiuo fetore sopraccennato, manda più dell'altro non sò che di forte, & acuto come di rape; tolera però questa pianta molto meno il rigore del freddo di quello che non fa il sopradescritto, sì che poco più d'vn' anno e mezzo nel mio horto vi durò.

Lepidio di Dioscoride.

Cap. 64.

Fig. 45.



V' questa pianta à tempo di Dioscoride tanto commune, e tanto nota, che questo Autore trattandone stimò superfluo il descriuerla, contentandosi della sola narratione delle di lei virtù, con le parole seguenti, secondo la traduttione di Marcello ^a. *Lepidiū nota cunctis herbula est. sale inter salgama cum lacte seruatur: habent fo-*

lia acrimoniam & exulcerant: ideoque in dolore coxendicis ad exulcerationem, eritum cum inule radice quarta hora vnus paric impositum dimittitur. Imponitur, & lienosis similiter: pellit idem lepras: crediturque lepidij radix collo al- ligata, dentium dolores comescere.


Mà perche oltre il tacerli da Dioscoride le fattezze di questo Lepidio, come allora volgare, il di lui nome fù d'alcuni attribuito à due altre piante di genere differenti, non è marauiglia, se molto confusa poi se ne sia resa la cognitione. Vna di queste si è il Gingidio, che Dioscoride notò à suo tempo essere stato chiamato lepidio, come espresse descriuendolo in questa forma, secondo il Mattioli ne' commentarij latini ^b *Gingidium aliqui Lepidion, in Syria, & Cilicia plurimum nascitur: herbula est syluestri pastinace similis, tenuior, & amarior, radice parua, candicante, subamara, olus hoc coctum, crudum, conditumue estur magna stomachi utilitate; & urinam cit. decoctum ex vino potum vesicae prodest*: offeruasi però questa pianta in tutto differente del Lepidio sudetto, sì per essere stata descritta separatamente, e con note diuerse da Dioscoride, come per essere ella stata scoperta nel secolo passato dal Cortuso, e proposta in figura dal Mattioli ne' discorsi volgari ^c, e ne' latini ^d, e trouata in tutto, e per tutto corrispondente all'adotta da Dioscoride.

L'altra pianta, che vn tempo fù chiamata Lepidio, e che rende più diffici-

^a Lib. 2. c. 169.
pag. 308.

^b Lib. 2. c. 131.
pag. 371. id.
Vnora del
1370.

^c Pag. 553. ta-
nole grandi.
lib. 3. cap. 126
^d Pag. 375. c.
131. lib. 2.



difficile il conoscerlo, si è l' Iberide, oggidì molto nota, e quasi da tutti, ma con errore, creduta la stessa col Lepidio di Dioscoride, ancorche presso di lui si troui separatamente descrittà in questo modo, secondo la traduzione di Marcello Virgilio sopracitato, *Hiberida siue Cardamantica, Romani pariter Grecis Hiberida appellant. Nasturtio similia habet hiberis folia, uere tamen speciosiora, quam Nasturtij sunt. Cubitali longitudine herba est, & aliquando minore: nascitur locis incultis, florem astate locum profert, quo tempore efficacior habet usus: habet præterea radices duas nasturtio similes, quæ calcificiando, & urendo sinz; probantur radices hæ contra coxendicis dolores, emplastrum modo cum salso uulgo adipe quatuor horis illiri post quod tempus, qui id fecerit, in balneum descendat, & lana ex oleo locum inungat.*

Lib. 1. c. 151
pag. 102.

I motiui poi di credere, che l' Iberide sia il Lepidio, s'hanno dalla simiglianza delle facoltà di questa, e di quello, e dal vedere la di lei descrizione presso Dioscoride trà gli Alberi in vn luogo, oue non hà ella che fare, contro l'ordine consueto di quell' Autore; oltre che Galeno, secondo la traduzione d' Andrea Lacuna, *de compositione medicamentorum secundum locos*, trattando de rimedij della Sciatica, propone per singolare l' Iberide, giusta l' esperienza del Poeta Damocrate, soggiungendo sembrarli questa quella pianta, che da Greci chiamauasi Lepidio, così scriuendone, come riferisce Amato Lusitano: *Damocratis extat libellus Clinicus inscriptus, in quo versibus iambicis, quemadmodum solet, de tribus differet medicamentis; ac primo quidem de eo quod ex herba, quam ipse Iberidem appellat, constat: secundo ex semine dolores sedante composito: tertio uero purgatorio, & ab ipso hicra appellato. De primo in Ischiadicorum curatione in eo libello hac scripsit: In Iberide, inquit, medicum quemdam amicum suum, per hanc herbam curatum esse, quam herbam, ut dixi, ipse Damocrates Iberidem appellat, ut qui ipse visus herbam cognorit, nomen autem eius nullum audierit, cum etiam id ipsum ignoraret is, qui cum usum eius docuit.*

Lib. 10. p. 146.

Lib. 1. Enar.
107. pag. 100

Sortoscriue poi à Galeno Paolo Egineta, tutti i rimedij per la Sciatica, antepoendo l' Iberide, con dire, come traduce l' Andernaco: *in totum uero hos sanitati restituit Iberidis herba usus, quam lepidion quoque, alij agriocardamon, hoc est syluestre nasturtium appellant: & altroue, i parimente giusta l' interprete citato: Lepidion, quam, & Iberida uocant, ex quarto calefactum gradu est, nasturtio proximum uiribus: minus autem eo desiccat, il che haueua lasciato scritto ancora prima Galeno^k, e l' haueua parimente motiuato Oribasio ne Collettanei medicinali^l, per le quali autorirà confermate da qualche ragione uole congettura il Matrioli fù di parere, che ne sudetti due luoghi dell' Iberide, e del Lepidio presso Dioscoride si desicriuesse vna sola pianta, e che perciò il primo non fusse legitimo, onde ne suoi commentarij portò ne' due capi vna sola figura, che è quella dell' Iberide;*

Lib. 7. ca. 77.
pag. 4104

Lib. 7. cap. 3.
pag. 744.

Lib. 7. pag.
850. de simpl.
med.

Lib. 15. pag.
502.

m Lib. 4. pag.
298. 10. 564.

n Lib. 101. p. 48
o Lib. 1. d. 1. 7.

p Lib. 1. c. 46.
pag. 664.

q Lib. 9. Ep. 3.
pag. 251.

r Pag. 110 de
virdis plant.

f Lib. 14. ca. 17.
p. 616. c. 17.
e Lib. 6. c. 11.
pag. 6. 3. lib.
27. c. 10. 11.
t Lib. 19. c. 1.
p. 459. c. 500

u Lib. 17. c. 17.
p. 322.

x Cap. 133. p.
299.

y Serm. 3. cap.
194. pag. 131

z Ser. 12. cap. 2.
pag. 106.

1 Lib. 10. c. 17.
2 Pag. 112. d.

3 Lib. 1. p. 120
c. pag. 78.

d Lib. 1. p. 142
c. 1. 9

e Lib. 1. pag.
64. cap. 2. 10.

ride; lo stesso egli diffese nelle sue epistole medicinali, ^m in vna lunga lettera scritta à Bartolomeo Maranta, che nel suo metodo di conoscere i Semplici, haueuà dato indicio d' approuare ambedue i capi sudetti di Dioscoride: del medemo sentimento del Mattioli furono il di lui emolo Amato Lusitano nel luogo sopracitato, Valerio Cordo nelle annotazioni sopra Dioscoride ⁿ nel capitolo del Lepidio, e dell' Iberide ch' egli supresse, e nelle notte parimente inserite dal Riffio nella sua traduzione di Dioscoride ^o, l'herbario di Lione ^p, il Manardi nell' Epistole medicinali ^q, il Lonicero ^r, & altri, che per breuità si tralasciano.

Ma dall' altra parte, per credere, che il Lepidio di Dioscoride sia pianta in tutto differente dall' Iberide, ne tengo non men forti motui da proporsi in contrario, perche amendue queste piante si trouano separatamente descritte, non solo presso Dioscoride, ma presso Plinio, secondo la traduzione del Dalechampio, il quale nominò l' Iberide à parte, hauendo prima trattato del Lepidio con i sentimenti di Dioscoride ^t, scriuendone: *Peregrinum fuit & Lepidium. Seritur à fauonio: dein cum fruticauit, iuxta terram praciditur: tunc truncatur, stercoraturque: per biennium hoc. Postea iisdem fruticibus videntur; si non saeuia hyemis ingrauat, quando impatientissimum est frigorū. Exit & in cubitale altitudinem, folijs laurinis, mollibus: vsusq; eius non sine lacte, & altroue ^u Lepidiū inter vrentia intelligitur, sic & in facie cutē emendat exulcerando, vti tamen cora, & rosaceo facili sanetur, sic & lepras & pforas tollit sēper facili, & cicatricum vlcera. Tradunt in dolore dentium ad alligatū brachio quā doleat, cōpescere dolorē.* Così parmi, che credesse Aetio, che nel primo, e nel decimoterzo de suoi sermoni ^x, nominò il Lepidio sēza dire nulla dell' Iberide, e pure di questa ne trattò diffusamente à parte, col chiamarla ancora Cardanina herba, così credettero ancora Vincēzo Beluancense nello Specchio naturale ^y, e Simon da Genoua, i quali pure descrissero l' Iberide à parte: & i RR. PP. Censori di Mesue nel cap. del Scitaragi ^z, e l' Anguillara ¹, e Francesco Alessandri nel suo Apolline medico ², e Gio: Agricola nella sua medicina herbaria ³, & il Maranta nel suo metodo di conoscere i semplici ^d, indicando legitimi i due capi sudetti dell' Iberide, e del Lepidio, contro quelli, che stimarono, che il primo fosse stato aggiunto.

Mà questa controuerfia può facilmente risoluersi à fauore della seconda parte, col riflettere, che legià citate parole di Galeno, contengono più tosto vna congettura, che vna asserzione di quel gran Medico, che l' Iberide fosse il Lepidio, il che è tanto più euidente, quanto che Galeno stesso mostra di non hauere conosciuto l' Iberide, mà solo per relatione di Damocrate ne' suoi versi, ne' quali rauuifandoui molti segnali del Lepidio de' Greci, che mi dò à credere fosse quello di Dioscoride, non è marauiglia,

glia, che la stimasse il medesimo, *Verum ex signis*, iui dice intendendo di Damocrate, *qui scribit, videtur Iberidem appellare, quæ à Græcis lepidium nominatur, à regione in qua amicus eius curatus est, appellatione ducta, describit autem ipsius signa per hos lambos.*

*Herba hæc ubique multaque frequens nascitur
Monumenta iuxta antiqua muros, & veteres,
Tritasque quondam publicè pedibus vias,
Quas iuxta aratrum duxit hæud quis agricola,
Semper virescens, solijs nasturcij,
Florentibus vere, attamen maioribus.
Caulem cubitalis longitudinis gerit
Paulò minorem, aut rursus ampliorem, ab hoc
Æstate pendent folia, donec multa hyems
Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, &
Deiecta, & exsiccata depereant gelu,
Adnata radici, tamen cernes alia.
Æstate florem fert colore lacteo,
Multum tenuem, variumq; valdè cauliculum.
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,
Visum ferè, ut fallens, oculos quoque effugiat.
Odorem habet radicis, at inde acerimum,
Vero similem, quam maximè nasturtio.*

Ne quali versi viene così esattamente descritta l'Iberide, in conformità di ciò, che ne scrisse Dioscoride, che pare, che non si possa desiderare di meglio per rauuifarne le fattezze, e conoscerla insieme differente dal lepidio di quello, ancorche Archigene la chiamasse Lepidio, & Hygieno Ipparco affermasse parimente essere ella stata chiamata con lo stesso nome, soggiungendo perciò Galeno à gli addotti versi *de hac Iberide, etiam Archigenes scribit, lepidium ipsam appellans, dicit autem, & splenicis, & Ischiadicis ipsam conuenire, ad Ischiad as, & perfrigerationes, Hygicni Hipparchi, herbam Iberidem, quam aliqui lepidium vocant, aut apicardamon colligito.*

Contuttociò si può rispondere à questa autorità, concedendo, che il Lepidio, e l'Iberide presso Galeno, e gli scrittori da lui citati, sia vna cosa stessa con l'Iberide di Dioscoride, e che perciò questa possa chiamarsi Lepidio di Galeno, e così negando che sia tutto vno il Lepidio dell'vno, e dell'altro di questi Autori: non essendo inuerisimile, che l'Iberide sia vn tempo stata chiamata Lepidio per la similitudine delle facoltà, come quella, che empiastrata sopra le coscie ne dolori di sciatica esulcera, non tanto però come il Lepidio, leuando nella cute le scaglie, le quali da Greci chiamansi Lepides, d'onde pure trasse il nome il Lepidio di Dioscoride, pare che ciò

- e Lib. 12. c. 18.
 p. 413. e 414.
 f Lib. 1. ca. 30.
 pag. 106. e 107.
 e 101. p. 163.
 g Lib. 1. c. 193.
 h Pa. 145. e 146.
 traduttione
 del Ruellio.
 i Lib. 3. c. 77.
 pag. 410.

Venga insinuato da Columella *, che nominò due forti di Lepidio, il siluestre, & il satiuo, intendendo forse per questo quello di Dioscoride, e per il siluestre l'Iberide, come notò pure il Ruellio *de natura stirpium* f, & il Barbaro nel Corollario g, lo stesso pare, che voglia inferire Paolo Egineta b, trattandò di due forti d'Iberide (nome, che presso di lui significa lo stesso, che Lepidio) corrispondenti alli due Lepidij di Columella; la prima spontanea, per cui si può intendere l'Iberide d'oggi, la quale però nata da se, è pianta piccola, ma coltiua ne vasi, diuene così grande, che sembra mutare specie, benché sia sempre la stessa; l'altra, che nasceua in Egina, con foglie di Lauro, e che però corrisponde al Lepidio di Dioscoride, come si mostrerà à basso, se più tosto per questa non si volesse intendere quella pianta ch'oggi di si chiama peuerella, o piperite, (ma non è quella di Plinio da lui chiamata Siliquaastro, che con tale nome denota più tosto vna specie di Capsico, che altro) la quale Piperite veramente è vna specie di Lepidio, e come tale da molti è stata proposta, come dal Trago i, dal Fucio l, dal Dorstenio nel suo Herbario m, dal Cesalpino n, dal Mattioli, che la chiamò Lepidio di Paolo, e di Plinio o, dal Camerario nell'Epitome del Mattioli p, dall'Anguillara r, dal Dodoneo r, oue la fa essere il Lepidio di Paolo, come fecero Gio: Bauino, & il Cherlero nell'Istoria vniuersale s, il Chabreo t, & altri quali per breuità tralascio, il quale Lepidio nasce copioso nella nostra Italia, che porta foglie sempre intiere, onde Lepidio volgare può chiamarsi, ma non già quello di Dioscoride, che porta foglie parte laciniate, e parte intiere, come nell'Imagie s'offerua, e come nel capitolo della Braba à bastanza si è descritto.

- i Lib. 20. c. 17.
 pag. 531. tra-
 duttione del
 Dalecampio.
 k Lib. 1. c. 26.
 pag. 88.
 l Cap. 183. p.
 483.
 m Pag. 214.
 n Lib. 8. c. 73.
 pag. 364.
 o Lib. 1. c. 105.
 pag. 643. e ne
 discorsi latini
 lib. 2. ca. 170.
 pag. 418.
 p Pag. 378. e
 379.
 q Par. 7. p. 110.
 r Pomp. 5. lib. 4.
 e 25. p. 716.
 s Lib. 11. cap. 8.
 pag. 940.
 t Pag. 296.

Mà che questa pianta non sia il Lepidio di Dioscoride, facilmente lo conuince il non hauere ella in alcun tempo foglie incise, quali deuono essere nel Lepidio di questo Autore, hauendo egli paragonato alle foglie di questo, quelle della Braba, che per essere vna specie di Nasturcio, cioè l'orientale di Serapione deue hauerle qualche volte le sue foglie frastagliate, come si è descritto à suo luogo: concorda in ciò il Ruellio * scriuendo, *Lepidio prima foliorum rudimenta, quamplurimis segminibus laciniata prodeunt, sed qua in lauras frondes, in pubertate figurentur.*

- * De natura
 stirpium. lib. 3.
 c. 6. pag. 27.

D'altro parere furo i RR. PP. Cenfori di Mesue, i quali nel discorso che fecero del Seitaragi, la di cui descrizione presso di Serapione x, secondo il Plateario, quadra al Lepidio di Dioscoride, per cotesta pianta. intesero quella, che nella Sicilia, & altroue chiamasi Carpinella, o Crapinella, & in Roma herba di S. Antonio, da altri dentaria, o dentellaria, che secondo l'Anguillara, è la Molibdena di Plinio, e dal Colonna nelle piante meno cognite, sù per Tripolio di Dioscoride proposta, benché con errore, non trouandosi in questa pianta facoltà alcuna di soluere il corpo, come

- x Cap. 371. p.
 353.

- y Pag. 211. p.
 12.

me notò Dioscoride del suo Tripolio, ch' à suo luogo si mostrerà, e fù ancora da Gasparo Bauino nella Pinace ⁊ notata per terza specie di Lepidio, essendo appresso di lui la prima specie di questo la piperite, e la seconda vna pianta con foglie di Glasto, figurata, e descritta per lepidio non repente da Gio: suo fratello nell' Istoria vniuersale^a, mà contro queste due seconda, e terza, per non crederle il lepidio di Dioscoride, milita la stessa ragione addotta contro la Piperite, che non portano queste piante in tempo alcuno foglie incise.

Altri poi furono di parere, che il Lepidio di Dioscoride, fusse il Rafano Rusticano de moderni, come il Barbaro nel Corollario^b, il Manardi^c, & Vgone Solerio nelle sue note sopra le piante d' Aetio, i quali à mio giudicio più d' ogni altro s' accostarono al vero, prendendo per Lepidio di Dioscoride quella pianta, che più d' ogni altra l' assomiglia essendo ella, come nel proprio trattato mostrossi la Braba del medesimo, la quale dallo stesso Dioscoride fù paragonata al suo Lepidio.

Offeruandosi dunque, che tutte le piante fin' hora proposte per Lepidio non corrispondono in tutto à ciò, che ne lasciò scritto Dioscoride, hò hauuto motiuo di cercare il suo in altre, e spero d' hauerlo ritrovato nella seguente pianta Persiana, rauuifando in essa quanto si richiede in vn rigoroso confronto: fummi il di lei seme trasmesso di Firenze dell' Ibba dalla cortesia del Signor Isidoro Fantini, come scrissi nel Capitolo della Chrysocome, di semi venuti di Persia, ò Siria à quelle Serenissime Altezze, sotto nome di Rapistro di quel luogo, e natami, che fù, li palesò di foglie parte intiere, e parte laciniate come nell' Imagine s' offerua, delle quali l' intiere sono tutte dentate, e le altre pare dentate, e largamente incise, eccetto le superiori de rami, che sono intiere, e senza denti, come nel primo nasturcio del Mattioli, e nella Braba del medesimo, e tutte le posteriori sono da lungo, e solcato piedetto sostenute, e trascorse da nerature da ambedue i lati rileuate, come pure nella stessa Braba Dioscoridiana s' offerua, la principale delle quali di sopra fà vn solco eguale, massime nelle foglie da basso, e nelle stese per terra, con le quali note, questa pianta per manifestarsi vero Lepidio di Dioscoride, conuiene di modo con la Braba del medesimo soprad. scritta, che le foglie dell' vna sembrano quelle dell' altra, se in questo Lepidio non fossero minori, più poltose, e più dense, come espresse Dioscoride, dicendo di quelle della Braba, secondo la relatione addotta à suo luogo: *folia, quae lepidii viderentur, nisi teneriora essent, tenuioraque*: oltre di che nell' essere minori le sudette foglie del mio Lepidio di quelle della Braba, hanno questo di vantaggio per palesarlo la pianta pretesa, che non poco si rauuifano à quelle dell' endiua minore, da altri chiamata Seride angustifolia, nel che concordano

^a Lib. 3. fol. 4.
pag. 97.

^b Lib. 11. cap. 3.
pag. 241.

^b Lib. 1. c. 409.
pag. 52.
^c Lib. 9. Epist.
3. pag. 271.

col Lepidio d' Aetio, e ce lo manifestano per vna cosa stessa con quello di Dioscoride, trouandosi presso d'amendue col medesimo vso, e facoltà. *Olus est in Syria*, scrisse Aetio, come fù interpretato dal Cornaro ^d, *folia habens Seridis angusto folio pradiu. Vocatur autem Lepidium & cum lacte conditum seruatur &c. Hoc ipsum olus tritum, & impositum, cutem lucidam reddit, & attollit, vt excoriata similis videatur.*

d Serm. 13. ca.
133. pag. 199.

Spunta poscia da questa radice, ouero germoglio di foglie vn fusto, & alle volte due, che cresce rotondo, ondofo, liscio, lucido, di colore verde chiaro, con scorza facilmente separabile dalla parte di sotto, che è legnosa, e piena di midolla candida. Questo se la pianta è coltiuiata nel terreno grasso, passa vn cubito d'altezza, se altrimenti non ci arriua, e si verifica il detto di Dioscoride, che chiama questa pianta piccola. Hà rari nodi, ouero occhi, massime nel fondo, e questi alternatamente disposti trasmettono le foglie sempre intiere con piedetto parimente solcato come nelle prime, mà più corto, e che abbraccia la metà del gambo. Hanno queste gran similitudine cõ quelle della Piperite nostrana, che si disse essere specie di Lepidio, e non minore con quelle del lauro, onde conuengono col Lepidio di Plinio, e lo fanno conoscere per vna cosa stessa cõ quello di Dioscoride, apparèdouì tutte le altre note, *exiit & in cubitalem altitudinem*, disse Plidio, *folijs Laurinis mollibus*; le quali note attribuendosi da Paolo Egineta alla sua seconda Iberide, che presso di lui porta ancora il nome di Lepidio, è probabile, che questa sia il Lepidio di Dioscoride, come s'accennò di sopra, dicendo l'istesso Paolo / secondo l'interprete addotto: *qua verò apud nos fruticoso nascitur, similibus Laurifolij, & multò amplioribus, respondere multa experimenta testantur, non solum in coxarum, sed in alijs quoque diuturnis affectibus.*

e Lib. 19. ca. 8.
pag. 496. tra-
duzione del
Dalscam.

f Lib. 3. ca. 77.
pag. 110.

Nella parte superiore del medesimo fusto si vedono più frequenti i nodi, da' quali oltre le foglie consuete, spuntano alcuni ramoscelli con fustarelli, e fogliette, e tutti nella sommità portano floridi bottoncini disposti, non in spiche, mà in ombrelle mal fatte, come s'è espresso nell' Imagine, i quali del mese di Giugno apprendosi mostrano vn fiore composto di quattro fogliette bianche, con apici simili nel mezzo; caduti che siano questi fiori vi rimangono altrettante capsule con i semi inclusi, in tutto, e per tutto simili à quelli del Nasturcio volgare, mà però assai minori.

La sua radice è sempre vnica, grossa, & alle volte come notò Aetio, quanto il deto minimo, lunga due palmi incirca, e più ancora, con scorza grossa, di colore, che biancheggia, e di matrice sottile, bianca, arreduole, e molto difficile da romperli: presso la corona poi è alquanto tuberosa, di colore verde, al tatto aspra, contornata di molte fibre lunghe, e sottili, & ondeggianti; le quali serpeggiando frà le commisure dell' horto, passo-

no

no sotterra, e si portano in altre parti, trasmettendo souente nuoui germogli, per i quali si propaga la pianta, come nell' imagine s' offerua, in modo, che oue si radica vna volta mai più si leua, ò almeno difficilmente si può estirpare.

Il sapore di questa pianta, sì nella radice, come nelle foglie, e semi e molto più acre, e mordicante di quello sia in tutte le altre sin hora portate per Lepidio; il che serue di ragione più conuincente delle addotte per confermarla il vero Lepidio di Dioscoride, aggiungasi di più, che la di lei radice appesa al collo, ò applicata in altre parti sopra la carne nuda, come notò Dioscoride del suo Lepidio, seda mirabilmente il dolore de' denti, e m' è riuscito più d' vna volta prouandolo in altri, onde mi persuado che habbia ancora le altre facultà mentionate da Dioscoride, cioè che la di lei radice sia rimedio potentissimo contro le sciatiche, la lebbra, & i mali di milza, la medesima radice hà facultà di tingere nero bollita con vetriolo, nel che corrisponde à ciò che scrisse del suo Lepidio Actio^g, nel sermone

già mentouato: *cum radice vero eius lana tinguntur, & nigrum induunt colorem*: la quale radice era bianca, e di grossezza d' vn doto, come s' è detto della mia, soggiungendo egli, *est autem radix eius alba crassitudine digitali*, e di questa se ne feruiua per fare vn linimento, sopra le pustole grosse, e mandarle via proseguendo dirne: *ex qua in Sole siccata corticem detrahare oportet, & per diem vnum in aceto macerare, deinde mane, probe & constanter terrere, asusque aceto sufficienter ad strigmentitiam crassitudinem redigere, atque ita repositum adseruare; ubi vero usus exegerit, locum nitro defricum paulisper transpirare finito, atque ita pharmacum ipsum, ad calentissimum solem illito, & quodammodo adfricato, deinde acetum paulatim ad illitum instillato: cum vero eger vellicationem, ac morsum perceperit, cum ad to-*

g. Sermon. 13. ca.
133. pag. 122.

lerantiam inhortato bulla namque succedent, quas aricula penetratas, excoriare oportet. Vbi itaque excoriata fuerint, siquidem affectus locus excoriatus concolto appareat, ipsum, ut secundum naturam habentem, & restitutum finito: si verò non rursus ad duos, & tres dies, idem pharmacum illinito, donec omnino perfectè videbis locum.

ipsum sanatum.



Lichnide Siluestre Viscosa peregrina, con fiore più odorato di notte, che di giorno.

Cap. 65.

Fig. 50.



a Lib. 6. fol. 1.
pag. 380. fino
379.

b Lib. 6. fol. 1.
pag. 303.


c Lib. 19. pag.
349.

Asparo Bauino nella sua Phytopinace, ouero enumeratione delle piante portò 33. specie di Lichnide ^a descritte, e notate appresso diuersi herbari, le quali dal medesimo furono ancora registrate nella Pinace ^b, come parimente da Gio: Bauino suo Fratello nel terzo Tomo della sua Istoria ^c, mà perche frà tutte queste, per quanto hò offeruato ne sopracitati Autori, non ritrouo la qui proposta, mi porge occasione d'aggiungerla in questo luogo à beneficio de professori.

Frà li semi, che mi lasciò il Sig. Aleſſandro Balam, come già disſi nel Capitolo dell' Acetosa di Ragusi, vi fù ancora quello di questa pianta, con nome di Lichnide con fiore, che di notte hà bon odore, la quale nata che fù nel mio horto, partorì la pianta, che qui si vede disſegnata, e descritta, che tramandando dalla sua radice vno, ò più cespi di foglie, di forma, e similitudine di quelle di certa herba descritta, e figurata dal Clusio nell' Istoria delle piante rare ^d iui proposta con nome di Sessamoide grande di Salamàca, mà le foglie di questa mia Lichnide sono assai simili à quelle del Sessamoide maggiore del Clusio, eccetto che vn poco minori, più crasse, sode, e più cartilaginose, lisce, e lucide in ogni parte, e le prime, che nascono dalla radice sono larghe, e tondeggianti nelle cime, benchè nell' Imagine s' offerua tutto il contrario, trascorſe, e sostenute da vn neruo rileuato, che nella parte superiore lascia le foglie sottilmente folcate, con altre laterali nerature nel di sotto, che poco, ò nulla compariscono; son queste foglie circondate da vn' orlo sottile, trasparente, che biancheggia, e che imita il colore argentino.

Da ciascheduno di questi cespi nascono molti cauli appresso terra inarcati, i quali poi nel crescere s' estendono, mà però mai dritti, e sempre nel fondo curui, alti poco meno d' vn braccio, grossi come vna penna da scriuere, e se niente si piegano si rompono, e mostrano di se scorze, delle quali l' esteriore è sottilissima, dalla seconda infeparabile, di color verde terreo, liscia, glutinosa, massime verso i nodi superiori, e nel tempo estiuo, imperòche rifuda da quel fusto humore viscoso talmente, che volandoli

d Lib. 3. cap. 4.
pag. 295.



landoli sopra gl' insetti restano inuiscchiati, e presi, come fa similmente la Lichnide viscosa di fiore muscoso, sopranotata con nome di Sessamoide grande.

La seconda è grossetta, membranosa, legnosa, di colore verde chiaro, come parimente la midolla. Hà speffi nodi, massime verso terra, i quali sono biancheggianti, ben che verso l' autunno rosseggiano, essendo rileuati tanto, che di grossezza superano assai il caule: da ciascheduno di questi escono sempre due foglie vna contro l'altra, sì che tutte due insieme col loro ginocchio grosso abbracciano tutto il caule, & oltre alle sudette due foglie, alle volte germoglia ancora vn cespuglio, ouero due, ch'infoltiscono la pianta, da quali sorgono fusti, con foglie sopra, sempre à due per nodo, & questi fusti portano nelle cime cesticioli di foglie che sono à guisa della latuca nascente.

I fusti principali nel giungere verso la parte superiore producono molti bottoni lunghi, posti sopra ad vn breue picdetto, à due, & alle volte à tre insieme sopra vno stesso gambo; sono questi di forma oblunga, coperti d'vna membrana scannellata, con le escauature bianche, e le rileuature verde, vestita di pelo piumoso, le quali prima d'aprirsi mostrano nelle cime loro con cinque foglie ristrette, & insieme vnite, di colore giallo: aperte poi, che siano, ch'è verso il fine di Giugno, si tramutano in colore bianco, e sono nel contorno larghe, e rotonde, saluo che nel colmo, oue fanno vna larga escauatura nel mezzo, che le rende gentilmente folcate, come si mostra nell' Imagine, oue sono ritratti al loro naturale, essendo queste floride fogliette strette, verdi, e nel mezzo delle quali lasciòsi vedere alquanti stami con apici bianchi. S' apre questo fiore per il più verso la sera sul tramontare del Sole, spirando vn soauissimo odore, fino che la mattina nell'apparire di esso si riserra, ne mai più si riapre. Il sudetto suo odore è assai simile à quello del Gelsomino volgare, non tanto acuto però.

Caduto questo fiore, appare per ciaschedun piedino vna capsula ouero ricettacolo di forma oliuare, e di color verde, sostenuto da gambi folcati, nel quale stà rinchiuso vn seme, che si matura frà Agosto, e Settembre, di forma angolosa, minuta, e rosseggiante: la sua radice è bianca, lunga, poco sarmentosa, raramente d'altre radici contornata, di sostanza tenera, il sapore del fusto è qualche poco amaro, lasciando nel palato siccità, mà quello delle radici è asciutto, e secco, mà le foglie sono molto amare, calefacienti, mordicanti, & efficaci.

E pianta, che viue
più anni.

Lichnide

Lichnide Vmbellifera montana Eluetica.

Cap. 66.

a Lib. 3. c. 105.
e 106. p. 416.
e 417.

b L. 6. f. 31.
p. 362.

c Lib. 6. f. 31.
p. 403.

d Pag. 141.
e Pag. 102.

Fig. 51



Ve specie di Lichnidi coronarie, secondo l'interpretatione di Marcello Virgilio, ^a s'osseruano memorate appresso Dioscoride, cioè vna domestica, e l'altra siluestre. Della domestica ne sono conosciute hoggidi da gl' Herbarij molte specie, notate da Gasparo Bauino nella sua Phytopinace ^b, che poi si moltiplicano in altre specie diuerse, solamente però nel colore de' fiori, ma in quanto al resto della pianta eguali, come notò il medesimo nella Pinace ^c. Ne segue poi vn'altra appresso à medesimi herbarij, creduta essere la siluestre dell' istesso Dioscoride, figurata con questo nome nell'herbario di Castor Durante ^d, la quale è stata creduta dal Gesnero nel' horto ^e essere il fiore di Gioie Siluestre di Theophrasto.

Io però oltr' à tutte le sopradette Lichnidi ne tengo in questi horti vna specie molto rara, ne per ancor, ch' io habbia osseruato, appresso alcun herbario descritta, del di cui seme fui fauorito gl' anni pascati dall' Illustriss. Vettore Antonio Orfati Cavaliere Nobilissimo di Padoa, nel quale tempo mi furono parimente trasmessi alcuni sagotti di semi diuerfi, e senza nome dal Sig. Felice Orelli Speciale in Lucarno, sua Patria, Simplicista, e Farmachopo insigne, fatti raccogliere à sorte nella montagna chiamata Valmasia da certi suoi contadini, frà quali mi racque questa pianta vniforme à quella del sopradetto Orfati; e da quì s'è conosciuto la Patria natia di questa nouella, & vmbellifera Lichnide, quale nè al sopranominato Cavaliere, nè à me stesso era nota.

Vn cubito è la sua altezza, producendo dalla sua Radice vn gran cespo di foglie, intorno al quale nel crescere, che fa, si moltiplicano nouelli, e serpeggianti germogli, i quali poi crescono in molti cespi, e s' allargano in ogni contorno della pianta, portando ciascuno d'essi le foglie della forma della Lichnide volgare; mà però queste sono di sostanza assai più crasse, più sode, più dure, cartilaginose, grandi, e pelose, di colore verde, massime le prime della pianta, sostentate da vna grossa, e soda neruatura nella parte di sotto molto alta, e tondeggiante, la quale se niente si piega, si rompe con stridore, con altre nerature trasuersali, che poco, ò nulla si lasciano vedere, e nel di sopra delle foglie sono eguali, e senza folcatura alcuna, le quali masticate che siano, lasciano in bocca sapore insipido, con molta siccità, & odore herbaceo.

Por-



Portano alcuni di questi cespi, massime i maggiori, fusti non molto grossi, di forma quadrata, però vn poco tondeggianti, bianchi, lanuginosi, nel mezzo caui, eccetto che ne' nodi, i quali in questa pianta sono assai rari, e grossi, e da ciascheduno d'essi escono due foglie vna, incontro all'altra, mà sempre d'vn nodo all'altro alternatiuamente in altra parte; oltre alle foglie maggiori, nella cavità de detti nodi, nasce altra prole di cesticioli di foglie, mà minori, benchè ciò non s' offerua nell' imagine.

Nel giungere, che fanno questi fusti sì maggiori, come minori verso le cime, nasce da ciaschedun di loro vn' ombrella piena di molti bottoni amassati insieme, di forma oblunga, nel di sopra dentati, solcati, e contornati di coste rileuate, tutte lanose, e sono alle volte fino al numero di dieci, e nel giungere, che fanno nel tempo del fiorire, che è verso il fine di Maggio, trasmettono i suoi fiori composti di cinque foglie per ciascuno, assai grandi, di colore rosseggiante, ouero di fiore di mela, solcate, & escavate nella cima, sì che paiono diuise in due, e nel mezzo stà vn umbellico stellato del medesimo colore, sì che riescono molto grati, e vistosi.

Caduti questi fiori, rimane nel solito bottone ouero ricettacolo vna glande per ciascheduno, di forma oblunga, e colore verde, che poscia essicata si trasmuta in gialliccio, con cinque denti duri nella cima, che paiono spinosi, e questi sono i ricettacoli del seme, che arriuari à maturità cadono del Mese di Luglio, e si lasciano vedere di colore rosseggianti, minuti, che osservati col microscopio si mostrano di forma triangolare imperfetta, vn poco piate, con solcature rileuate, che rassembrano in picciolo vna tenue sponghetta.

La sua radice è copiosa, composta di molte radici rotonde, fibrose, e lunghe, & amassate insieme, simili nella forma, e nel colore à quelle dell' Eleboro bianco, mà però più candide, le quali contengono anima sottile nel mezzo: il suo sapore è molto amaro, e quasi al pari di quello della Gentiana maggiore.

Scrive Dioscoride, che pigliato il seme della Lichnide gioua à quelli, che sono stati trafitti da gli Scorpioni. E' pianta perenne.



Liubra, ouero Baccam frutice Orientale.

Cap. 67.



Liubra siue Baccam frutex habet folia oblonga, aliquantulum inclinata, densata, & aequaliter ducta, Flores producit racematis, ut & fructus rotundos; utuntur illa ad construendum unguentum pro vulneribus, ac ulceribus, folia cocta sunt pro uestione praeipue pulueris tormentorum.

L' Imagine di questa pianta è nella figura 32. dell' Erisno vero di Dioscoride.

Malua con foglie di Bettonica.

Cap. 68.

Fig. 32.



Rà diuerse specie di Malue, ch' hò nel mio orto, se ne ritroua vna, che nasce in Toscana, il di cui seme mi fù mandato da Luca dall' Eccell. Sig. Lodouico Breni Dottore in Medicina, & Simplicista insigne, con quello stesso nome di Malua con foglie di Bettonica. Questa veramente è vna rara pianta, e tanto più la stimo singolare, che non v' è (s'io non erro) Autore, nè antico, nè moderno, che faccia di lei alcuna mentione; causa che mi spinge à descriuerla, e rappresentarla in figura.

Spunta dalla Radice di questa pianta vn gran cespuglio di foglie a lunghi pediciuoli annesse, della forma di quelle della Bettonica volgare, mà però queste sono lisce, e senza peli, lunghe quanto il deto minimo, che nella cima sono poco appuntite, e nella parte inferiore sono dal gambo diuise, quasi in due semicircoli; nel contorno loro sono incise, e merlate con denti larghi, che tondeggiano, di colore verde, più viuaci nella parte di sopra, che in quella di sotto, di sostanza soda, e polposa: s' estende nel loro mezzo vn neruo rileuato, dal quale se ne spiccano altri minori, che scorrono verso le cime delle foglie, e terminano nel di loro contorno, scorgendosi espresse nella parte di sopra altrettante folcature.

Nascono




fig. LII



Malva con foglie di Betonica

Nascono da questo cespuglio molti fusti alti circa ad vn cubito, fottili, rotondi, liscij, niente pelosi, e poco legnosi, di colore verde, che tende vn poco al pauonazzo, e che piegandosi non si rompono: hanno rari nodi, da quali sorgano altre foglie ad vna ad vna di piedetto assai più breue, che quelle da basso; anzi che le superiori del caule sono quasi senz' alcun piedetto, nella cima de quali cauli nascono molti bottoni composti di cinque fogliette, e posti sopra vn calice d' altre più piccole fogliuzze, verdi, che serubno di sostegno.

Nell' apprirsi poi questi bottoni, fanno mostra d' vn fior vago, composto di cinque foglie tondeggianti, anzi nella parte superiore, quasi quadre, inegualmente dentate, di colore carneo, con certe striscie per il lungo di colore più acceso, che non è il resto del fiore, nel mezzo di questo siede vna picciola linguetta di colore giallo, che viene attornata da sottilissimi stami con apici sopra dello stesso colore del fiore, onde rendesi alla vista molto vago.

Caduto questo fiore, rimane in quel calicetto foglioso vn globo di pallottine di forma bislonga, amassate insieme, in modo, che sembra vn frutto di rouo, mà molto minore, e questi sono li suoi semi, quali osservati col microscopio, si vedono di colore verdiccio pallido, e ripieni di frequenti solcature; caduti, e separati che siano l' vno dall' altro, hanno forma come d' vn piccolo fagiuolo, con vn poco d' incauatura nel mezzo.

La radice è lunga, e si diuide in diramazioni non molto grosse, dalle quali ne deriuano altre minori con fibre nell' estremità, tutte di sostanza piegheuoli, liscie, e tenere, senza portione alcuna legnosa, e di colore cinericio: gustate lasciano succo mucilaginoso, insipido, e senza odore alcuno, si come tutta la pianta, che si conserva

viuà più anni. Nasce questa Malua nel Territorio

Pisano, sù i Poderi de' Sig. Gaetani, in luogo

chiamato iui comunemente il

Terriccio, lontano quattro mi-

glia dalla Torre, o porto

di Vada, & ancora

vicino ad vna

Terra detta San Pietro in Graticola,

e volgarmente San Pietro

in Grato.



Malua con foglie di Bettonica serpeggiante seconda. Cap. 69.



N' altra specie di questa medesima Malua con foglie di Bettonica hò hauuto altre volte in questo mio horto, & ancora frà le piante seccate ne conseruo il fioretto con il suo proprio ramo; fù questa trouata da Marco Nani mio Seruo, solito à cercare piante, parimente nella Toscana nell' andare al Monte Argentario, la quale di foglie, e di caule è simile alla iudetta, ma in grandezza minore, è di sua natura serpeggiante, il suo fiore è parimente quasi simile, mà di foglie più larghe, che nella superiore, e se offeruàrò in questa pianta altre qualità, à Dio piacendo, le farò palese, altroue. Nasce questa Malua nel piano di Grosleda per andare al monte di Pescale, & in altri luoghi circonuicini.

Malua annua fruticosa Pernambucana di fior giallo. Cap. 70.

Fig. 53



Ora, che mi ritrouo nel trattare delle Malue, se ne rappresenta vna specie molto rara, che nelle foglie partecipa vn poco della forma della Malua antecedente, benchè poi sia nell'altre parti diuersa, hauendo ancora maggiore connessione à mio giudicio con quella della Melochia, parimente specie di Malua dall' Alpino

a 24. 19. 20.
39. e 40.

descritta nel suo Libro delle piante dell' Egitto, anzi in quanto alle foglie fariano quasi l' istesse, se non le diuidessero due alette, che sono da vna parte, e dall' altra del di sotto di esse, e per questa similitudine, al mio credere è stata appresso ad alcuni chiamata Melochia spuria, da altri ancora Alcea spuria, forsi così detta per hauere questa pianta qualità viscosse, & emollienti, simile à quelle della nostra, e volgare Alcea. Da altri poi è stata chiamata questa pianta Malua Indiana spuria con seme spinoso, e triangolare: Io la chiamo Malua di fiore giallo Pernambucana dal luogo di doue à me è venuta, massime per partecipare di foglie vn poco simili alla sopranominata Malua, e Melochia, affermando però non essere stati male



fig. LIII



Malva annua di Pernambuco

male intesi li nomi sudetti, perche tutti si restringono sotto ad vna medesima facoltà emolliente, e di specie di Malue, Althea, Alcea, & altri simili.

Frà quei semi confusi, che già dissi hauere hauuti dal R. P. Fra Michele Angelo Guatini di Reggio Capuccino, Missionario Apostolico nel Regno del Congo, ritrovai questo seme, quale, benché senza nome, lo conobbi però per lo stesso di questa pianta, che già haeuio in questi horti, onde sapendo, che questo suo seme veniuu da Pernambuco, mi sono fatto lecito chiamarla col soprascritto nome, tanto più, che non trouo alcun Autore, che ne habbia dato notizia. Ne rappresento qui la descrizione con la sua figura, riuscendomi facile, anzi inclinato à farlo volentieri, perche questa pianta produce fiore, e seme in questo clima Bolognese.

Cresce all' Altezza circa vn cubito, ò poco più, il di cui fusto, nella parte vicina alla radice è grosso quant' è vna penna da scriuere, dritto, rotondo, di colore scuro; piegheuoile senza romperfi, alle volte copiose di porretti, che al tatto lo rendono aspreto, benché ciò nell' imagine non s' offerua, di scorza, che facilmente si leua dalla sostanza interiore, con midolla verde, e nodi nel detto fusto, e per tutta la pianta assai frequenti: tramanda rami di varia lunghezza, alternatamente l' vn sopra l' altro volti, e disposti, come sono anche le foglie, del cui piede, hora di sopra, hora di sotto, spuntano altre foglie minori, come benissimo nella figura si dimostra, tutte però sono d' vn a medesima forma, cioè quasi ouate, restringendosi egualmente verso le due estremità, contornate di merli alquanto acuti, e colorite nella parte superiore d' vn verde viuace, mà quello di sotto è assai biancheggiante.

Verso le cime, si del fusto maggiore, come de rami spuntano da ogni parte piedicciuoli rotondi, circa due detti lunghi, nella punta di ciascheduno de quali siedono bottoni tondeggianti, con cinque coste rileuate nel loro contorno, onde riescono molto simili a quelli della pianta, che il Volgo chiama Mazzaferatta, che è la Viola quinquifolia, figurata dal Tabernamontano sotto nome di Viola Pentagonisa: giungendo poi li mesi di Luglio, & Agosto escono da questi bottoncini li suoi fiori composti di cinque fogliette lucide, di colore d'aurora, nelle quali per il lungo si vedono qualche vestigi di solcature, e ciascuna di loro si diuide in due semicircoli, hauendo nel mezzo alcuni filamenti sottili dell' istesso colore, non s' aprono mai questi suoi fiori, se non sù l' hora di mezzo giorno, riferendosi doppo poco spatio di tempo, ne più si riaprono, effetto sin' hora non più osservato da me in altra pianta.

Nel peruenire il seme alla maturità, cade il fiore lasciando sul gambo il calice diuiso con il bottone in cinque parti, con le loro coste, le quali tolgonò nel mezzo vna tumidezza rotonda, che s' accresce nel centro, e

chiu-

b. p. m. 2. f. 11. c. 1.
p. 2. 317. d

chiude in sè cinque, ouero sei capsulette piate, in vna parte biancheggianti, e nell'altra di colore scuro, che partecipano di forma triangolare ottusa ne duoi angoli inferiori, & acuta nella superiore; oue termina in vna sottilissima spina, non molto dura, ma pungente; i semi leuati dalle capsule sono anch' essi della forma delle stesse capsulette; come s' osserua nell' Imagine, da vna parte lucide, e del medesimo color scuro, e dall' altra biancheggianti.

La Radice maggiore nella corona è vn poco più sottile del fusto, lunga vn quarto di braccio, dal mezzo in giù ondeggiante, e termina con l' estremità molto sottile, flessibile in ogni parte, e di sostanza tenace: tramanda d' ogn' intorno altre radichette sottili l' vna, e l' altra con vn numero immenso di fibre tanto tenui, che paiono capegli. Le foglie masticate rendono succo mucilaginoso, e sapore insipido, come fa ancora la Malua, Althea, & altre piante, che hanno virtù di molificare, e risolvere, si che probabilmente in questa pianta sono le medesime facoltà. Si rinoua ogni anno col seminarla.

Miagro de gli Antichi secondo alcuni Moderni.

Cap. 71.

Fig. 54.



Itrouasi di questo Miagro frà gl' Autori molta disentione, qual cade non solo nelle foglie, mà maggiormente ancora sopra la figura de' semi, molti de quali vogliono, che sia simile al fieno Greco, & altri, ad vn collo, ouero ceruice, il Ruelio nelle sue traduzioni del testo di Dioscoride^a, legge alcune volte, *Semen oleosum*

BCap. 118. Lib.
4. Pag. 331.

b Lib. 1. c. 11.
Pag. 49.

c Cap. 116. lib.
3. Pag. 539.

Fanugraco simile, & altre volte, *Semen oleosum collo simile*; il medemo nel primo libro *de natura stirpium*^b nel trattato ch'ei fa de' frutti, e semi, scrive *Miagro semen protenditur ceruicis figura*, e poi nel terzo, nel trattato del Myriofillo, Mirride, e Miagro^c, legge *Semen Fanugracis figura*, e più sotto; *Fateri cogit aculata fides* (trattando del medesimo seme, e dell' Equiuoco, che fanno iui gl' Autori in questo passo) *Semen hoc est sano graco non ideo collo (ut quibusdam legitur exemplaribus) similitudinem refere non in utriculis orbicularibus minuta sani Graeci grana continet*: il che mi fa credere, ne mi posso persuadere, che il Ruelio, huomo per altro dottissimo, haueffe posto in vn medesimo libro in varij luoghi due tali diuersità, che quando egli nel primolibro disse, *Miagro semen protenditur ceruicis figura*; volesse per la pa-



Miagro delli Antichi.
Sic' Alcuni Moderni

La parola *semen* significare il ricettacolo, che per appunto è simile ad' vn collo, & ad' vn capo d' vn vccello, come nella figura de' Miagri seguenti chiaro si vede, che rappresenta le capsule naturali di questa pianta, con il seme effectiuo, il quale è simile al Fien greco, tanto più mi conferma nel mio parere nel vedere, ch'egli nel medesimo luogo tratta del seminio, ouero ricettacolo del Antirrhino, al quale attribuisce forma di narici di Vitello: mà nel terzo doue cerca di ributare l'opinione di quelli, che leggono *collo simile* intendesse propriamente del seme, quale certo, come egli dice, è simile al Fien greco: e nella mia opinione parmi ancora concorrere l' Anguillara ^d nel Cap. del Miagro così dicendo: *Il Miagro hà molti surcoli sottili con foglie simili alla Rubia, con seme picciolo uguali ad vn collo, ouero Fien greco di color giallo*, non essendo la forma del Fien greco simile ad vn collo, e per ciò pare essere del medesimo parere, che si disse di sopra del Ruelio.

^d Nel parire
14. pag. 135.

Mà che il testo di Dioscoride debba dire *Fanu graco simile*, e non più tosto *collo*, non saprei per qual causa si j d' alcuni, benché senza ragione, affermata, e perciò il Cesalpino nel libro nono rigetta la loro opinione con queste parole *alijs dictionem gracam immutauit tradendo legentes tradidit idest Fano graco, sed nulla auctoritate*: ben è vero ch' egli in vece di *Fano graco* legge *spondilo*, mà com' esso dice à quelli altri, ancora egli *nulla auctoritate*.

^e Cap. 35. pag.
309.

Il Barbàro nel Corolario *scriue semen colli figura*, seguitato ancora da Gio: Battista Ignatio nelle annotationi sopra il medesimo Dioscoride.

^f Lib. 4. c. 770.
pag. 80. et 88.

Se dunque non vi è ragione al mio credere efficace, per la quale debbasi dire *Fano graco* non saprei penetrare la causa del volere essi più tosto, che il Testo dichi del primo, che del secondo, se pure non fosse quella, che adduce Valerio Corde ^g in Dioscoride, doue trattò del Miagro dicendo, *quam enim figuram fenu graci semen cum collo aut ceruice habet*, al che si risponde, riuocando le sue parole in mio fauore, *quam enim figuram collum, seu ceruix cum semine fanu graci habet*: massime non sapendo egli di certo se il testo di Dioscoride dichi *fanu graco*, ò pure *Collo*; anzi probabilmente douendo dire *collo*, come per attestazione di Marcello si hà dalla maggi. r parte de' Codici, e protestandosi egli di correggere il testo, oue dice *καύλω*, cioè *culo*, riponendoui *καύλω*, cioè *fano graco*.

^g Lib. 4. p. 72.
cap. 171.

E pure quell' altra, che adduce l' istesso Marcello, ^h dicendo *habet quæ certiorum rationem, ut semen semini quam hominis, aut animantium collo comparatur, cui nec forma, nec quantitate aliquod in plantis semen simile forte vidit*. Rispondo à questi, che nissuno mi negarà, che il ricettacolo del seme non habbia qualche similitudine col collo, & col capo d' vn' vccello, come

^h Lib. 4. cap.
112. pag. 133.

come potrà veder ciascun con gl'occhi proprij: ne gioia dire essere più conueniente il paragonare il seme ad vn altro seme, che al collo, poi-
 i Cap. 345. 24.
 288. lib. 2.
 1 Lib. 4. ca.
 128. p. 548.
 1 Lib. 3. c. 133.
 pag. 428.
 ch'ancora l'istesso Dioscoride, secondo Marcello i hà dato al seme del suo Thlaspio la figura d'vn disco, che pure non è seme, mà vn feudo, ò pelta, il che anco hà fatto rassomigliando il seme dell' Antirrhino alle narici d'vn Vitello, come nel cap. del medesimo ^k, & il seme del Geranio al capo d'vna Grue con il rostro come nello stesso Marcello s'offerua^l, il quale niente ripugna; che nelle piante vi sia vn ricettacolo simile ad vn collo col capo intiero, e che il non hauerlo forsi veduto alcuno, che non credo non inferisce, che non vi possa essere, anzi vi è ricettacolo di tale figura, come conoscerà il Lettore ne' Miagri, che sotto si descriuono di Arabia, e di Sumatra.

Finalmente ad ambidue rispondo, che concesso, che il seme non sia di figura di collo, mà di sien greco (il che ancor'io affermo) non mi potranno negare prima, che il ricettacolo del seme, non solo di questi ch'io descriuo, mà ancora di molti altri Miagri fin hora descritti sij: fatto à similitudine del Collo, e capo d'vn uccello, secondariamente essere più verisimile che Dioscoride habbia inteso' del ricettacolo (come hà fatto ancor nel capitolo del Thlaspio dell' Antirrhino) intendendosi per la parola *semen* il vaso che contiene li semi, & l' habbia paragonato ad vn collo, ò capo più tosto, che ad altro per la ragione sopradetta.

Mà perche le seguenti piante peregrine tengono molta similitudine col Miagro nostrale, trà Miagri si deuono connumerare: mà prima che se ne discorra à parte stimo bene l'auuertire, che questo Miagro vsuale d'alcuni moderni vien creduto lo stesso col Miagro de gl'Antichi,
 m Pag. 109:
 ymaco lib. 3.
 fol. 2.
 ne forse s'ingannano, benchè alcuni siano di contrario parere, trà quali Gasparo Bauino ^m trattando de Miagri in generale, pare che tenga, ch' il Miagro de gl' Antichi sia per anche incognito, *μαγρον*, dice egli, *Dioscorides meminit cui Rubia folia tribuit*, e Plinio, *Myagros dicitur, verum quid sit, nunc non decernimus, sunt qui nostrum Myagrum Erijsimum Theophrasti, & Galeni velint, alij Sesamum, ob seminis similitudinem, & olei vbertatem.*

Mà sia come si voglia, fin tanto che non sij scoperta pianta, che meglio della commune esprima il Miagro de gl' Antichi, seguirò l'opinione di quelli, che la credono tale, massime per vederfi i semi di questa pianta vn poco piegati ouero contorti, come caua dal Greco il mio interprete da quella parola *Trachilon*, che significa seme contorto, e riuolto à modo di certa spetie di Lumaca, chiamata Trocho, non solo questa hà simili qualità, mà i Miagri seguenti ancora, perche se bene questa non hà le foglie disposte nel modo della Rubia, come contendono quelli, che portano parere diuerso, interpretando à loro fauore le parole di Dioscoride,

nel

nel luogo citato dal Bauino, che appresso Virgilio Marcello *n* si leggono nel testo Greco *ὅυλλα ἔχουσα ἰμυρίον τοῖς τῷ ἰμυδοπόδαν*, e nel Latino *folia habet Rubia folijs similia*; non mancano altri graui Scrittori, che affermano, che questa comparatione si deue intendere delle foglie ad vna, ad vna, e nõ altrimenti della loro dispositione, come notò il sopracennato Anguillara *o*, quale trattando del Miagro così lasciò scritto: *Alcuni si pensano, che il Miagro debba hauere le foglie precise poste come ha la Rubbia intorno al suo gambo, e perciò non vedendo questa nota nel Miagro negano che sia Miagro: e non si accorgono questi tali, che la comparatione delle foglie della Rubbia con quelle del Miagro si deue fare à foglia per foglia, e così in figura sono similissime.*

Oltre di ciò li semi di questa pianta, meglio di tutti gl'altri Miagri, fin' hora trouati hanno le qualità attribuite da Dioscoride al seme del tuo Miagro, come sopra si motiuò, anzi di questi, del Miagro commune, se ne cava oglio in quantità, che, come scriue l'Anguillara nel luogo sopracitato, è oggidì molto in vso sul Pauese, oue semina si frequente, e chiama si femenzina: nel che risponde molto bene al Miagro di Dioscoride, che alle parole addotte soggiunse: *pingue, & oleosum, quo vinctur, tundentes crematum, & virgane circumlinentes, mox prò lucerna vientes.*

Trà quelli, che credono essere questa pianta il Miagro di Dioscoride, cuui il Dodoneo *p*, che per tale la propose, e figurò, nel che parmi degno da seguirarsi: come per lo contrario io non gli aderisco nel tenere, che questo Miagro sia l'Erisimo Cereale di Teofrasto, e di Galeno, che nel cap. sopranotato dell'Erisimo, si dice essere il formento Saracenicò. Il medesimo la chiamò parimente Camelina, col qual nome la propose ancora il Lobellio nelle Imagini *q*, da cui ne gl' *Aduersarij* *r*, e nelle Osseruazioni *s*, fu chiamata semplicemente Miagro, come pure dal Gerardo *r*, e dal Ruellio nell' Istoria di Lione *u*, il Tabernamontano nelle Imagini *x* la figurò per Miagro primo, & il Bauino nella Fitopinace *y* la propose per il secondo Miagro hortenfe, hauendola chiamata Miagro Satiuo nella Pinace *z*, il Trago nell' Istoria delle piante *a* la figurò, e descrisse per Sefamo, mà non per il Candido d'Egitto, che è il Miagro di quel luogo, e v'aggiunse crescere in abbondanza trà i lini nella Germania: mà più esatta cognitione, à mio parere, n' hebbe il dottissimo Gasparo Bauino, che nel Teatro Botanico *b* l'affermò per Miagro, dicendo: *quod Sefami nomine apud Germanos ostenditur Myagrum est.* Ne solo appresso gl'herbari è pianta, nota, mà ancora appresso il volgo, che in molti luoghi d'Italia la chiamano herba dorella per il seme, che porta di colore d'oro, quale nome le vien dato pure dal Cesalpino *c*, ne porto qui l'Image, già che ne hò quest'anno 1674. seminato la pianta, e natani felicemente nell'Orto publico di questa Città, migliore ancora d'ogni altra, che per l'auanti sia stata si-

o Pag. 112. l. 4.
cap. 112.

o Pag. 144. l. 4.
155.

p Lib. 1. prim. 3.
l. 33. p. 132.

q Pag. 124.
Pag. 79.
Pag. 112.
Pag. 173. l. 2.
cap. 22.
u Pag. 113. l. 1.
10. cap. 1. l. 1.
x Pag. 86.
y Pag. 172. l. 3.
fig. 1.
z Pag. 109. l. 3.
fig. 1.
a Lib. 2. ca. 18.
pag. 655.

b Lib. 1. fig. 4.
cap. 35.

c Pag. 112.

purata, e ciò faccio per mostrare altre specie proposte altroue sotto nomi: a queste piante improprij: onde per dilucidarli, e metterli in chiaro, qui espongo di tutte qualche parti d'esse, acciò meglio il Lettore possi offeruare queste piante lateralmente poste nell'Imagie; al numero 1. v'è impresso il Miagro Arabico, detto impropriamente Rosa di Gierico, pianta senza foglie con i loro semi nudi; e ancora gli loro ricettacoli che hanno forma di capo d'Vccello; al numero 2. il medesimo con le sue foglie; al numero 3. il Miagro d'Egitto; che fù, & è disadatamente creduto Selsamo; al numero 4. il Miagro del Brasile; al numero 5. il Miagro di foglie strette, figurato dal Lobellio nell'osservatione; al num. 6. vn'altra specie di Miagro notato per specie di Rosa hiericuntina da Gasparo Bauino nella Pinace^m con le seguenti parole: *Rosa Hiericuntina exsiccata similis Blasterlos Holandis, fructiculus ad scorbutum.*

Questa medesima con la sua figura vien portata da Gio: Bauino nella sua Istoria, col nome d'Affillo Indiano, così dicendo: *Bryfratribus; non. 4. part. India Orientalis scribentibus, in Insula Sancti Laurentij plantam Hollandi copiose inuenerunt, & vocarunt Blasterlos, quia nulla folia exactè habebat. Teneriores ramulos scorbuti curacioni adhibuerunt non sine effectu. De hac planta apud alios Authores hactenus nihil inuenimus.*

Miagro Arabico detto impropriamente Rosa di Gierico. Cap. 72.



Armi da escludersi totalmente dal genere delle Rose quella pianta peregrina, legnosa, ma arenduole, che impropriamente dal Volgo viene chiamata Rosa di Gierico, che non hà con le Rose proportione alcuna, anzi non solo non è Rosa, mà ne meno è di Gierico, non nascendo questa specie di pianta ne luoghi, oue fù quella famosa Città, e come asseriscono quelli, che vi peregrinorno, trà quali il Bellonio, che trasportato dal Clusio nell'Istoria delle piante peregrine così lascio scritto, *hac apud Hierico non nascitur.* Adunque non se le addata quel sacro detto dell'Ecclesiastico; che dice. *Quasi plantatio Rosa in Hierico.* Scrittura da Sacri Dottori communemente esplicata per vna pianta feconda di fiori à marauiglia diuinosi, onde al parere di questi, è del sudetto Bellonio, dourà intendersi della Rosa hortense, anzi direi io la Centifolia, che è la più bella pompa del Maggio, i di cui fiori sono nelle frondi copiosi, e nell'odore fragranti, nella bellezza peregrini, e nel-

d. L. 3. cap. 36.

pag. 143.

8. L. 6. 34.

e nelle virtù gioueuoli; Doti, come già dissi, che in niſſun conto ſi verificano in quel virgulto, dal Volgo nominato Roſa di Gerico, eſſendo in guiſa priua d'odore, e di bellezza, che ſecondo alcuni, ne anche merita il nome preſſiato di fiore. Non adduco ſotto l'occhio del lettore, l'autentiche de ſacri eſpoſitori, temendo d'attediarlo, & eſſendo anco al medefimo facile appo di quelli leggerle, che però ſolamente mi riſtringo à Ricardo di S. Lorenzo, che nel Libro delle lodi della Beata Vergine, coſì ſcrive *ſ. Lib. 12. p.*
Maria Roſa dicitur, & non qualibet, ſed Hierichuntina, quia in Hierico creſcunt Roſe pratioſiſſimæ habentes centum quinquaginta folia. Chiariffime ſono le parole del citato Autore, onde il volerui aggiungere altro, non ſolo farebbe ſuperfluo, mà anco d'ingiuria à chi legge, che ſe non è più che oſcuſcato, neceſſariamente meco aſſentirà eſſer la vera Roſa di Gerico molto diuerſa dalla pianta, che qui ſi propone falſamente chiamata da molti con ſimil nome di Roſa Hiericontina, che più toſto io ſtimarei douerſi chiamare quella ſpezie di Miagro, che ſopra ſe li è attribuito, mentre non ſolo, quando è arida, mà ancora nel ſuo verdeggiante è priua d'odore.

Eſſendo creduta ancora queſta pianta l'Amomo de gl' Antichi, e per tale deſcritta da Valerio Cordo nelle ſue annotationi ſopra Dioſcoride, e nell'Hiſtoria dal Ceſalpino, da Giulio Ceſare Scaligero ne Commentari delle piante d'Ariſtotile, e figurata da Gualtiero Riffio nella translatione di Dioſcoride, del Ruelio, ma quanto ſbagli queſta opinione, chiaramente lo moſtra l'eſperienza, che non troua in queſta pianta nata di ſemi in molti luoghi dell' Europa, le ſattezze principali dell' Amomo, per non eſſere odorata, e per non hauere le foglie di Brionia, e figura di vna, come ſi richiede nell' Amomo deſcritto da Dioſcoride, e figurato nel Commentario di Nicolò Marogna Medico Veroneſe, tradotto da Franceſco Pona ſuo Compatriota, nel trattato dell' Amomo, che vien giunto alla ſua deſcrizione del Monte Baldo, e di queſto parere furono il Mattioli ne ſuoi Commentari ſopra Dioſcoride, il Bellonio nelle oſſeruazioni, Gio: Bauino, & il Cherlero, nella loro Iſtoria vniuerſale, il Cabreo, & altri da queſti riſeriti, contro il Cordo, e lo Scaligero ſopra notati, il Turnero, il Neandro, l'Andernaco, il Lonicero, & altri, che poco auuedutamente affermarono la Roſa di Gierico eſſere l'Amomo.

Il Camerario, che portò la figura di queſta pianta nelle Imagini, diſcorrendo nell' Horto, laſciò motiuo di crederla congenere de Thlaſpi, mentre coſì ne ſcrive: *Roſa Hierichuntina vulgo dicta, quæ nobis ſuperiore anno pulchre floruit, ex ſemine nata, amomum eſſe nequit, cum deſcriptis ei non congruat: ſed aliquid ſerme habet commune cum Thlaſpio, parum tamen, vel nihil acedinis, quæ guſtu percipiatur, niſi in radice, & ſurculis, quorum ſapor immitatur Raphanum.*

Io non posso però persuadermi, che questa pianta sia del genere de' Thlaspi, non solo perche il di lei seme non mordica, come quello de' Thlaspi, mà perche le di lei filique sono in figura di testa d' uccello, e porta semi, che visti col microscopio sono vn poco riuolti, anzi ripiegati, e simili come sopra scrissi à certa specie di Lumaca, chiamata Troco, qualità spettante à Miagri, e sono sempre piate, e facilissimamente s' aprono, spargendo spontaneamente i semi lontano, anzi perche per le accennate fatture più s'accostano alle filique, e semi del Miagro vsuale, che di Thlaspi, perciò mi dò à credere questa pianta essere più tosto vn Miagro, ch' altro, e così hò risoluto di chiamarlo col sopranotato nome, e dall' Arabia oue nasce, Miagro Arabico s'è chiamato, e crederò sia per giudicarlo ancora chiunque assennato, paragonerà pianta à pianta, e semi à semi.

Quindi io non mi estendo d' esatta dichiarazione di questo frutticetto, come appresso gl' Herbarij, & il Volgo assai noto, e da molti di loro descritto, e figurato. Trà quali oltre il precitato Camerario offeruo gl' Autori dell' Historia Lionese ^a, il Tabernamontano nelle Imagini ^b, il Gerardo ^c, il Lobellio nelle offeruationi ^d, nelle Imagini ^e, facendone anche mentione negl' Aduersarij ^f, e da altri ancora, che qui si tralasciano.

Aggiungo solo, che cognomino questo Miagro Arabico, perche il Bellonio lo trouò nato spontaneamente, nell' Arabia, in vn Deserto vicino al mare rosso, che allignaua nell' arena: dice egli, nel luogo sopracitato nelli esotici, come sopra fù notato, anzi come lo fa parlare il Clusio ^g, che lo traduce, *apud Hiericho non nascitur, sed cam in Arabia deserto Maris rore, per arenas nascentem iam obseruaueramus.*

a Pag. 1796. l.
18. cap. 35.
b Pag. 445.
Par. 2. fol. 3.
op. 445.
c Pag. 1265. l.
3. cap. 52.
d Pag. 616.
e Pag. 103.
f Pag. 441.
g Lib. 2. fol. 166.
Pag. 313.

Miagro dell'Egitto, detto impropriamente Sefamo. Cap. 73.



I come le du: sopradescritte piante, chiamate disadatamente Rose di Gierico, giusta le proue addotte, non sono Rose, mà Miagri: così quella, che da moderni è creduto il Sefamo de gl' Antichi, parmi tutt' altro, che il sudetto Sefamo come giudicarono pure il Mattioli, e l' Bodeo; perche gl' Antichi Botanici concordano nell' asserire, che il loro Sefamo sia pianta frumentacea, che molto s'alza, con fusto, e foglie à guisa di Canna, & altre note particolari, come nel proprio Capitolo si dimostrerà: le quali cose non si possono affermare del Sefamo d'oggidi, che s'erge da terra vn
sol

sol braccio incirca, con foglie corte, e larghe come nel Solatro, e nella Mercuriale, essendo fusto come nelle faue, onde non hà che fare con i frumentacci, e così non può essere questa pianta, ne in modo alcuno è il Sesamo vero de gl' Antichi.

Altre differenze notabili trà questa, e quella pianta, motiù il soprannominato Martioli, e con ragione, mentre figurando il Sesamò volgare, nel cap. del Sesamo di Dioscoride^a, così ne lasciò scritto: *se io debbo d'irne la mia opinione, non mi pare, che molto si rassomigli per non hauere ella li calami più grossi del miglio, ne più copiosi, ne più lunghi, ne più radici ancora, mà un fusto, ouero gambone simile à quello delle faue: nel quale sono le siliquie di grado in grado quadrangolari; nelle quali il seme, oltre à ciò le sue foglie non rosseggiano (ch' io habbi mai veduto) ne il fiore è verde: mà più apertamente si dichiarò nella mia opinione il Bodeo ne suoi Commentari sopra Teofrasto^b, oue saggiamente riprende chi argomenta in contrario: An planta dic'egli, qua passim pro sesamo ostenditur sit veterum Sesamum, in dubium vocari potest, etenim calamo caret mili; et asiore, et numerosiore. Scapum enim fert fabae emulum, in quo fabarum modo siliqua gradatim exiunt triquestre, aut quadriquestre, in quibus semen. Qui hoc ob soli mutationem fieri contendunt, nugantur; Siquidem in Syria Aegyptoque testibus Ranulfo, et Alpino, est non sceus, ac in Italia. Florem praterea fert candidum, dixit Theophrastus, id est herbacei coloris, pluribus folijs confutem, illud etiam Sesamum veterum non esse, ostendit quod dum viret, nec in folijs, nec in semine amaror percipitur. Quod Plinius Sesamo folia rubentia tribuit, non obstat quò minus vulgare non sit legitimum potest enim aliterum genus esse, quod Theophrastus, et ex eo Plinius candidum dixerunt, quod viri docti negant. Antiquorum enim Sesamum singulari constat radice, fibris dotate ex ijs, qua diximus, nullius valoris argumentum apparet, eorum tamen sequor opinionem qui Sesamum esse negant.*

Non essendo dunque Sesamo quella pianta, che per tale hoggi si spaccia, anzi hauendo ella maggiore proportion di figure di foglie, e di seme, con i miagri, massime col precedente di Sumatra, più tosto nel genere de Miagri, che d'altre piante giudico douersi connumerare; Onde io la chiamo Miagro d'Egitto, per nascere in quel Regno abundantemente, d'onde à noi vien portato. Vfsi in quelle parti per condimento de cibi l'oglio de' semi di questa pianta, chiamato iui *Zeid toib*, e vi si vende più caro, che quello d'oliua, come scriue Prospero Alpino nel libro delle piante dell'Egitto^c, prendendo anch'egli, mà con errore questo Miagro per il Sisamo de gl'Antichi per essere chiamato da gl' Egittij impropriamente, questa pianta *Sempsem*, quasi *Sesamum*. Quale nome è verisimile, che passasse dal vero Sesamo à questo Miagro, sostituitogli nell'vso dell' ooglio quando quegli, dopo essere stato lungamente coltiato per l' ooglio già sì famo-

^a Pag. 434. ediz. Veneta 1568.

^b P. 2. c. 3. pag. 290.

^c c. 31. pag. 38.

d pag. 381. a
cap. 90.

e Lib. 2. cap. 6.
pag. 63.

famoso nelle medicine si perse, passato indi l' uso, forse per ismagrire troppo i terreni, ne quali seminauasi, come accenna Virgilio Marcello nel suo Commentario al cap. del Sefamo di Dioscoride ^a. Non si porta quì l'Imagine per hauerli assai essatta appresso il Mattioli, e l' Alpino, ne luoghi citati, & altri: seminafi con la Bambacia al riferire del Bellonio ^e, che lo chiama Sefamo, nelle ruine di Troia, cauandone i Turchi buona entrata per l'oglio, che in quantità ne spremono, il quale coltiuaui ancora nella Sicilia con questo falso nome di Sefamo.

Miagro Affricano chiamato secondo alcuni del Brasile. Cap. 74.

b Lib. 1. cap. 11.
pag. 12.



questa spezie di pianta ne nasce anche nel Brasile, e luoghi circonuicini, come nota il Pisone ^a, che nella sua Istoria naturale, e medica dell' Indie con nome di Sefamo Africano figura, e descriue la Gargila del Congo, chiamata da Portughesi Girgilin, ch'io tengo però non per questo Miagro d'Egitto, ma per vna specie di esso; Massime descriuendosi iui in questa pianta Africana qualità differenti dalla pianta, che descriue Prospero Alpino in quella d'Egitto, quì congiunta trouarà il Lettore l'Imagine del Miagro sopra descritta, e d'altri Miagri ancora.

Miagro di Sumatra, e di Soria, di Seme spinoso, simile al capo d' uccello, impropriamente detto Rosa di Hierico Siluestre.

Cap. 75.

Fig. 55.



a Pag. 42.

Er le medesime ragioni di sopra addotte deue connumerarsi fra Miagri, e non trà le Rose, quella pianta, che da alcuni viene impropriamente chiamata Rosa di Gierico siluestre, di cui ne propose vna figura il Camerario nelle Imagini ^a intitolandola *Rosa Hiereconima alia* sottoscriuendoui ancora d'onde, e da chi hauuta, co-




fig LV.



Diogenes de Sumatra

ta, così dicendo. *D. Leonardus Rauulfus hanc communicauit in Syria ruderi-
bus collectam*, oltre che lasciò scritto nell' Otto, doppo la mentione della
prima Rosa di Hieriko antecedente, le seguenti parole: *Eius Siluestrem
speciem, quam in Syria testis, & ruderibus inuenit innascentem, D. Rauulfus
mibi communicauit.* E perche non ne fauella diuantaggio, stimo non inu-
tile di descriuere pienamente in questo luogo la stessa pianta tale, quale
nacque, e crebbe nel mio Otto di seme portato di Sumatra, come mi scris-
se il Sig. Gio: Maria Ferri (buona memoria) insigne Farmacopeo, e Sim-
plicista de' nostri tempi in Venetia, che me lo trasmesse con molti altri la-
sciaroli da vñ Mercante da quell' Nola venuto.

Tramanda questa da terra molte foglie vnite insieme, della grandez-
za, che si rappresenta nella figura, che esprime la piata intiera, simili di for-
ma à quelle del Miagro vsuale sopradescritte, spunta trà queste vn fusto,
che s' alza intirca ad vñ palmo, e mezzo, sottile, tondeggiente, bianchie-
cio, ondoso, e sodo, benchè non legnoso, che piegato non si rompe, cauò di
dentro, è però midolloso, con dogia di colore argentino, coperto di scorza
sottile, che nel verde biancheggia, porta questo fusto rari, & ineguali nodi,
da ciascheduno de' quali scaturisce vna foglia simile alle inferiori, di mem-
brana tenue, vnita al nodo con breue piedetto, massime quelle, che sono
nella parte superiore, cò peletti sottili, che le inuoltono, e punteggiano, e le
rendono aspre nel lato di sotto in cui verdeggiano, e nel rouerscio, con ner-
nature vñ poco rilieuate, & altre meno visibili, che piegate à guisa d' arco,
arriuanò finò nel contorno delle foglie, raramente dentate, e da questa
parte bianchiccie, verso le cime de' rami sono questi nodi più frequenti;
alcuni di loro, oltre la loro foglia particolare, producono vn ramuscello
per ciascheduno incuruato, sopra de' quali sono gli suoi bottorcini alter-
natamente posti alcuna volta senza foglie, che le danno similitudine, quasi
che di spica.

Da questi bottorcini spuntano di Maggio picciolissimi fiori bian-
chi, e più aiosi, diuisi in quattro fogliette, tanto sottili, ch'apena col Micro-
scopio si ponno vedere, quali cadendo verso il fine di Luglio, lasciano in
suo luogo alcuni recetacoli, poco men che rotondi, biancheggianti duri,
e per cagione di folti, e breui aculei, si rendono al tatto aspri, e con corto
piedetto à ramuscelli congiunti, hà ciascuno di loro nella cima vn aculeo
maggiore de gl' altri, ò più tosto spina pungente adunca, come vn rostro
d' uccello, perloche questi rappresentano assai bene con il loro ricetacolo
il collo con il capo d' vn uccello, e che rotto mostrà nel suo interno vn se-
me, & alle volte due, molro minuti, di color giallo, rotondi, mà però di
forma, che hà vn poco dell' ouato, e questi vilti col Microscopio si scor-
gono da vna parte quasi fessi, & in altre parti piegati, e concaui (qualità
spect-

spettante à Miagri) con vn segno nereggiante, che li circonda, amacato questo seme trouasi oleoginoso.

La radice è bianca, liscia, sottile, contornata d'altre minori, di sapore alquanto ingrato; le foglie hanno dell' acetoso, dell' amaro, e mucilaginoso, con qualche similitudine di sapore simile à quello del Raffano, e dell' Eruca, ouero del terzo Sisimbrio acquatato del Mattioli, e come egli afferma ^b, il secondo di Dioscoride. E' pianta annua.

^b Pag. 416. del
l'ultima edi-
zione.

Mimosa Spinosa di Pernambuco.

Cap. 76.

Fig. 56
37.



Rà le piante più mirabili di natura mirabilissime, al mio parere, sono le Mimose; poiche non solo crescono, come le altre piante, mà di più mostrano d'hauere senso, mentre toccate, benché leggermente, subito si ristringono, quasi fuggendo chi le tocca; onde piante viuè, ò sensitiue con ragione furono chiamate. Lo

scuoprimento del Mondo nouo le fece conoscere à gli Europei; benché vi sia opinione, che n' hauesse a tempi antichi l' Egitto, mentre Theophrasto ^a, trattando delle piante, che nasceuano intorno à Memfi, vna di questo genere così propose. *Nascitur peculiaris quadam materia circa Memphim* (altri in vece di *materia* leggono *virgultum*, godendo parimente di questo significato la parola *ύλμια* nel Testo greco) *non folijs, vel ramis, vel tota forma proprietatem sortita, sed affectum, qua accidit: quippe facies eius spinosa, foliumque felicibus non ab simile, sed cum ramulos quisdam tetigerit, folia quasi hebetata concidere, cum tempore aliquo post reuincere, rursusque uirere affirmant*. E questa pare l'Eschinomene d' Apollodoro seguace di Democrito, di cui Plinio, secondo la traduzione del Dalecampio ^b, *adicit his Apollodorus affectator eius, herbam Eschinomenem, quoniam appropinquante manu, folia contraheret*.


^a L. 4. c. 3. Pag.
79. tradutto
ne di Galea.

^b L. 34. cap. 17.
Pag. 617.

Questa però di Teofrasto, credesi nell' Egitto del tutto perduta, non essendosi potuto trouare da chi hà ricercato con diligenza tutta quella Prouincia, onde non è marauiglia se il Bellonio, e l' Alpino non ne fanno mentione alcuna; anzi il Guilandino confessa apertamente d' hauerla in quei luoghi, & altroue ricercata in vano lungo tempo, dicendo, *Ego istam diu, multumque in Aegypto circa Memphim, heliopolim, Tanaisim, & Alexandriam, qua istam, nunquam offendere potui*. Lo stesso afferma il Bodeo ne
suoi

1400

LVI



suoi dottissimi Commentarij^c, oue non potendo addurre la figura della vera pianta di Teofrasto, porta quèlle di due piante Indiane, di natura non dissimili, e sono la Cardiacca del Mullero con foglie in forma di cuore, che toccate si ristringono, e poi si spiegano: e la Felce con faccia d'Osmonda, di cui trattasi à suo luogo.

Trouasi nulladimeno qualche specie di quèste piante mirabili in alcune parti dell'Asia, e particolarmente nel Malabar, come offeruò Cristoforo Acofta nel libro de gl'Aromati, ^d oue, giusta la traduttione volgare, ne descriue, e figura vna sotto nome d'herba viuua, chiamata Daiouqui nel loro linguaggio, cioè herba d'amore, per seruirsene superstiziosamente à concigliarsi l'amore, da gli Arabi, e Turchi Sulue, da Persiani Luluque, con foglie come di Polipodio. E pianta, che non hà caule, onde non sò per quale causa Gio: Gionftonio la figurasse, e descriuesse per Albero nella sua Istoria delli Alberi^e, oue la chiama Arbor Pudica, citando per primo Autore l'Acofta, che la descriue per herba senza susto. La medesima è l'Anonimo del Malabar, figurato da Castor Durante nel Herbario^f, & è forse quello stesso Anonimo Malabarese osseruato prima da Garfia dall'Orta,^g che così ne parla. *Nascitur in Malauar planta mira naturæ, nam, si quis manum admoveat, illico contrahitur. Folia Polipodij, flores verò luteos habet. Nullus veterum, quod sciam, huius mentionem facit. Eam verò intelligere videtur, qui Americam scripsit, quoniam in Peru Provincia, plantam nasci asserit, cuius folia solo contactu siccantur.* Nelle quali parole accenna Lopez Gamara, che scrisse l'Istoria generale dell' America, oue tratta della pianta, qui dall'Horta nominata, che dal Clusio^h nelle note sopra l'Acofta, fù stimata non dissimile dall'Eschinomene d'Apollodoro sopra detto, che alcuni hanno eredito, sia l'herba Molle descrittta, e figurata dall'Acofta, ⁱ sentenza che non mi pare sussistente, sendo l'herba Molle dell'Acofta pianta spinosa, il che non consta del Eschinomene d'Apollodoro; che per essere creduta dal Clusio senza spine, non facendone alcuna menzione Plinio, fù non fuor di ragione stimata simile all'herba viuua del nominato Acofta.

Similissima a quest'herba viuua dell'Acofta, (se pure non è la medesima come differente solo ne fiori odorati) è la *Tota Vari* pianta pure Malabarese, di cui hò hauuta quest'anno la descriptione e figura disegnata, con diligenza nel Malabar, della quale a suo luogo se ne discorre.

Due altre piante congeneri furono descritte, e con le medesime figure rappresentate da Guglielmo Pisone, ^k ne suoi libri della medesima Istoria Brasiliense con nome di luquiri, ò Caaco, e da Giorgio Marcgrauio nell'Istoria del medemo Brasile, ^l con nome di Carceo, ò herba viuua, delle quali vna è pianta humile velenosissima, che porta le siliquette con se-

^c L. 4. cap. 3.
pag. 326.

^d C. 31. pag.
178.

^e L. 10. cap. 2.
pag. 408.

^f pag. 33.

^g L. 2. cap. 17.
pag. 254.

^h C. 55. p. 50.
nell'Eschin.

ⁱ Cap. 31. pag.
181. della
traduttione
volgare.

^k L. 4. cap. 96.
pag. 117.

^l L. 2. cap. 12.
pag. 74.

me nero, in forma di cuore, punteggiato, come si mostra nell'Imagine al num. 3. l'altra è Frutice da Portoghesi chiamato Silua d'Agoa, che produce le filique grandi, e larghe, come quelle del Piso (vna delle quali viene figurata da Gio. Laet nelle annotazioni al Marcgrauio) con semi compressi, contenuti in ricettacoli quadrati, delle quali due Mimose già n'hebbi i semi, trasmessimi dal Brasile, ma che piantati non mi nacquero, perche erano immaturi, e sono quelli, che si vedono aggiunti in figura al naturale nel primo Ramo seguente al num. 4. e 5.

m Lib. 3. c. 1.
pag. 74. e 75.

A quest piante viue aggiunge la terza pure fruticosa Gio. Laet, descriuendola nella medesima Istoria del Margraui, ma senza figura, e dice che produce molte filiquette congiunte insieme, in ciascuna delle quali vi sono tre semi di color d'oliua, rotondi, e compressi poco men della lente.

n Lib. 6. ca. 32.
pag. 1.


Ne offerud vn'altra specie Giacomo Bontio con foglie di Veccia, la quale descrisse, e figurò nell'Istoria naturale, e medica dell'Indie Orientali, stampata con l'opere del Pisoni, e del Marcgrauio, e con le annotazioni, & appendici del medesimo Pisoni illustrata, & ampliata, nel quale luogo il Bontio nomina questa pianta, Herba sentiente, e pudica, che i Portoghesi chiamano Yerua Sensida, ouero yuergonfada, e la confonde con l'Anonimo Malabarino di Garfia, pianta, che s'è (come s'è motiuato) l'herba viua dell'Acosta, non può essere l'herba Sentiente del Bonio, il quale figurandola con foglie più di Cardiaca mulleriana, che di Veccia, mostra non poca differenza trà la sua pianta, e quella dell'Acosta.

o Cap. 11. art.
pag. 111.

Trè altre, e tutte diuerso dalle sin qui adotte, ne descrive il Roccaforte, figurandone vna sola nella sua Istoria dell'Isole Antille, vna delle quali nasce in Tabago, crescendo vn piede, e mezzo in altezza, porta le foglie grandi vn piede, che tocche si piegano al rouerscio: l'altra che nasce in Madagascar senza produrre fiori, con foglie picciole, che si restringono all'indentro: l'ultima natua d'altre di quelle Isole, non solo al tocco, ma al cenno ancora si restringe.

Oltre di queste Mimose, se ne trouano tre altre specie, che nate nell'horto mio si sono mostrate differenti dalle descritte sin' hora. La prima è spinosa, e viuamente si rissente: le altre non sono spinose; ma hanno trà di loro questa diuersità, che l'vna si restringe poco meno della prima, l'altra solo nel tramontare del Sole si serra, e s'apre la mattina; onde la chiamo Mimosa falsa, ò spuria, e di tutte tre, come da altri non più offeruate, se ne porta le figure, e le descrizioni distinte.

Cominciando dunque dalla spinosa, ch'è più singolare per hauere sentimento maggiore nel restringersi più dell'altre quando è toccata s'offerua, che questa s'alza due braccia incirca, con fusto grosso nel fondo, poco



poco più d'vna penna da scriuere, gialliccio, sottile, tenace, e difficile a frangerfi, ondeggiante, e quadrangolare, fuor che vicino alla radice, e sotto terra, oue tondeggia. Ramifica nella parte inferiore, non meno, che nella superiore i fusti secondarij, che in tale maniera produce, riuscendo ramosi, e di figura pure quadrangolare, s' allungano poco meno del loro progenitore, e per la maggior parte, curuandosi alquanto in dentro, sembrano formare tant' archi per le marauiglie della pianta; armano le quattro coste d' ogni gambo rosseggianti spine, con punte all' ingiù riuolte: la scorza di quelli è verde, di breui, sottili, e frequenti 'peli vestita, e che separata riesce assai tenue; i Rami, se si rompono mostrano vna midolla bianca, e spongosa.

I nodi, ò sì ano occhietti sono frequenti, e ciascheduno manda fuori vn lunghetto piedicciuolo, con due alette herbacee, che sostiene vn fogliame composto prima di due, poi di quattro, e finalmente di sei ordini opposti di fogliette camose, che sono al num. di 24. 28. ò per lo più di 30. disposte per intervalli eguali vna contro l'altra in vn solo piedetto per ciascun ordine, tengono assai di somiglianza con quelle dell' Acacia Americana, che come notò Tobia Albino nell' orto Farnesiano ^{p. 143.}, viene dall' Isola Spagnuola: non sono però così folte, & è il loro verde più chiaro, e sono di forma, quasi ovale, come parimente ovale è la figura, che tutte insieme compongono, come si vede nelle due immagini seguenti, massime nella seconda, che rappresenta le foglie di questa pianta di quella grandezza, che si vidde nel mio orto: per ciascheduna delle sudette foglie scorre vn neruo di sotto appena visibile.

Queste ad ogni leggier tatto, con subito risentimento si ristringono, vnendosi à marauiglia insieme, quasi che con così stupenda commotione, si sforzano di fuggire l'oggetto, che importunamente le tocca; ne solamente le foglie mostrano questo mirabile, e quasi incredibile indicio di vita sensitua; ma ancora il piedetto spinoso, che le sostiene: poiche questo parimente, in tale modo si contorce, e si curva, nell' immediata connessione, che hà con il caule, che spezzato si crederia: si rimettono poi poco à poco nel loro pristino stato, si lentamente però, che l'occhio non se n' auuede; e tale restringimento di foglie accade alla pianta, non solo quando è toccata, ò da mano importuna, ò dagl' animali, che volano, ouero dal vento mosso, ma ancora sul tramontar del Sole, e dura sino al rinascere di quello.

A piè de' fogliami, nella sommità de' fusti, nascono i fiori, de quali non potei vedere altro, che i rudimenti, che spuntarono d' Ottobre in forma di spighette, sendosi poco dopo morta la pianta, che non puote durare al primo freddo, che gli sopraggiunse.

Suole però questa specie di Mimosa produrre le silique lunghe, quanto vn dito di figura quadrata, come i fusti, e ne gli angoli spinose, che secche sono di colore di paglia, con semi, ch' in lunghezza condeggiano, vn poco incauati, nella sommità diuisi per il lungo à somiglianza, & in figura de grani del frumento nostrale: e questi, e quelle della grandezza espressa nella prima imagine seguente, che rapresenta al naturale quella siliqua, e quei semi, al num. 1. e 2. de quali nacque la pianta iui figurata, mandatimi da Pernambuco dal Padre Michel' Angelo Guatini da Reggio, e Dionigi de Carli da Piacenza Capuccini, e Missionarij Apostolici nel Regno del Congo, come per lettera del medemo P. Guattini registrata nel fiore di queste Mimose, dalla diligenza, e cortesia de quali, riconosco alcune piante singolari, che in questa Istoria s'andaranno publicando.

Stropicciate, e contuse le foglie di questa pianta, trasmettono odore herbaceo, e succo tenace, e mucilaginoso, che quasi trà le dete s'impastate, ò stropicciate, e gustate senza però deglutitione alcuna, rendono sapore amaro, poco dureuole, ma che lascia al palato non poca aridità.

La radice è di colore giallo chiaro, rotonda, sottile, lunga, nodosetta, ondeggiante, contornata da vna gran moltitudine d'altre minori radici, che si moltiplicano in molte sottilissime fibre, di sapore moderatamente acuto, senza amarezza, d'odore accutissimo, come d'aglio, e quando è stata cauata di fresco, offende non solo l'odorato, & il capo, ma ancora impedisce il respiro con tanta forza, che è necessario scostarsene, per non rimanere notabilmente offeso dalla di lei facoltà penetratiua. Masticata lascia in bocca per bon spatio di tempo grandissima aridità.

Stimo però sia questa pianta da non seruirsene, mà più tosto da stargli lontano, per l'antipatia grande, che hanno con la natura humana, a cui è perniciosissima, come sono le altre Mimose, che descriue il Pisone, che ne tratta non solo nel luogo citato, mà anco nella sua Istoria naturale, e medica dell'Indie, di modo che ogni minima quantità di poluere delle foglie di questa pianta è bastante di leuare la vita ad vn'huomo, dandogliela ò ne' cibi, ò nella beuanda.

Al quale veleno riferisce il medesimo Autore non essersi ritrouato più potente rimedio delle radici della propria pianta, come accade nella prima Tangaraca dello stesso Autore, pianta così chiamata nell'Indie, della quale il detto Pisone ne propone tre specie, tutte velenose nel luogo poco fa citato, oue trattando pure di queste Mimose, scriue, che le di loro foglie serouono di pastura alle pecore, che ne mangiano senza nocumento alcuno.

fig LVIII






fig LVIII.



Ramo fiorito della Mimosa di Jamaica

Mimosa di Iamaica. Cap. 77.

Fig. 58.
e 59.

Illustrissimo Cavaliere Sertorio Antonio Orfati di Padoa, oue possiede vn nobil Giardino di piante peregrine, fù il primo in Italia, à cui capitasse nelle mani, questa sorte di Mimosa venuta di Iamaica, che perciò da alcuni, che dal medesimo Signor l'ebbero, fù chiamata Mimosa di Padoa. Fui ancor' io nel numero de

fauoriti, hauendomene egli, per sua gentilezza, comunicato il seme, che piantato nell' horto publico, e nel mio produsse le piante, che qui si vedono in due figure: nella prima si rapresenta tutto il corpo cò alcune foglie, e fiore separati dalla pianta nella loro naturale grandezza; nella seconda si mostra l'Imagine d'vn ramo della maggior grandezza che si vidde dalla pianta in questi horti, con suoi fiori, e le diuersità delle siliquæ, che nel Giardino del detto Illustrissimo vennero con i semi à perfetta maturità.

Cresce in altezza più d'vn braccio e mezzo, con aspetto non molto diuerso da quello della precedente Mimosa, à cui è simile ne gl'effetti di restringimento benchè sij alquanto più tarda nel mouersi: e produce vn fusto principale, che ne trasmette molt' altri, massime appresso terra, disposti, come nell'antecedente, per i quali molto si dilatta la pianta, e se alcuno di questi ariua à toccare terra, come ben spesso auuiene, massime à fusti inferiori, iui s'abbarbicano, e trasmettono le radici. Sono in questi fusti spessi nodi, d' più tosto occhietti, da quali nascono molti rami ondosi, che poi crescono quasi al pari del maggiore, di forma rotondi con vn poco di compressione, coperti di scorza sottile, che facilmente si leua dalla parte legnosa, colorita di verde chiaro appresso terra, e più sopra ruginosa, mà tutta lucida, & al tatto alquanto aspra, per causa di molte picciole protuberanze, che nella superficie trasmette: piegati difficilmente si rompono, e rotti si trouano pieni di midolla verdeggianti, circondata da sottile porzione legnosa, e bianca.

Le loro foglie sono disposte come quelle della precedente Mimosa, ma più numerose, perche oue la sudetta pianta porta al più sei rametti fogliosi, questa ne produce fine al numero di otto, con foglie non solo più copiose, mà più larghe, più lunghe, e più robuste, di colore bianchiccio verso il gambo, e nel resto verdi, contornate però di colore ruginoso, che verso l'autunno dilatasi non poco, onde riescono all'occhio molto vaghe, e diletteuoli.

Nel piede de rami fogliosi, quasi in tutte le parti della pianta, nascono

no altri ramuscelli minori; e nell' istessa maniera verso la cima de' rami principali spunta nel mese di Settembre vn lungo piedetto, con vna, ò due foglie diuerse da l'altre, come quelle, che portano la figura di cuore, nel modo, che nella prima Imagine si mostra, e ciascuno di loro porta in cima vn granelloso capitello verde, che poi diuenta giallo, simile a quello del Rouo prima che sia maturo, nel quale mentre succresce s' aprono prima i granelli inferiori, che poscia aperti sono i recettacoli del fiore composto di quattro in cinque denti, che seccati danno luogo a quelli di sopra, di modo che non si vede mai, se non la metà della spica fiorita, ben che ciò nella figura non sia stato espresso dal pittore; hanno nel mezzo molti filamenti, e stami gialli ricciuti, che biancheggiano, e portano nella cima apici minuti, tondeggianti, di color scuro, ed' odore tenue, i quali a poco a poco nel fiorire contornano il resto del capitello; cadendo questi vi succedono le filique, delle quali non si è potuto vedere ne' detti giardini altro che i primirudimenti, ancor che la pianta sia più robusta della precedente, perche nel fine d'Ottobre, e principio di Nouembre sopraggiunta dalla prima aria fredda, si seccò del tutto.

Ma, se non hò hauuto fortuna di vedere queste filique maturate ne' detti horti per descruerle, holle almeno vedute, & hauute dal sopranominato Caualiere Orsati, nel di cui giardino ogni anno giungono mirabilmente a perfettione; il che non è per anco auuenuto a quanti nell' Italia, e fuori, e gli ne hà partecipato i semi.

Sono dunque coteste Silique piate, senza peli, ritorte, con apparenti rileuature a quattro, & à più, si che alcuna volta arriuanò fino à dieci insieme, disposte come in giro sopra vn sol piedetto, nel modo di quelle dell'Acacia Farnesiana, ouero Americana, di colore castagno di fuori, e di dentro argentino, piene di dieci, e dodici granelli, e più ancora, simili alli acini d' vua, ma minori, alquanto compressi, lucidi, e molto duri, e del medesimo colore castagno.

E' grossa la radice quanto vn deto, ò più, ò meno, secondo, che hà il tempo à lei fauoreuole, ch' è il caldo, e l'humido; si diuide in molte altre minori, lunghe, e fibrose, di colore giallo scuro, di sostanza sflacchiata, e tenace, quasi come corda, d' odore d' aglio, mà però non così acuto, come nella precedente, di sapore acre, e pungente.

Le foglie sono mucilaginose, e pingui, mà di sapore indistinto: rotte, e stropicciate frà le deta, rendono materia vischiosa, dell' odore accennato, mà più tenue.





fig LX



Mimosa Spuria di Pernambuco, detta
Mimosa Italica. Cap. 78.

Fig. 60.



Lle Mimose meritamente succede questa pianta, come loro simile nell'altezza, e proportione delle foglie, mà non però nel ristringerfi: sono molt'anni ch'è nota in varie parti d'Italia, oue essendo coltiuata hà prodotto perfettamente il seme, sì che fattasi à noi famigliare, non più peregrina, ò forestiera deue chiamarsi; e quindi

ella hà acquistata il nome di Mimosa Italica, col quale fù solamente figurata dall'Eccell. Sig. Giacinto Ambrosini Lettore publico, e Botanico, nella prima parte della sua Fitologia.

1 Tom. 1. pag.
360.

Alcuni hanno stimato ch'ella sia primieramente venuta dall'Egitto e come tale fin del 1658. mi nacque nell'orto, di seme hauuto con nome di Mimosa Spuria d'Egitto, che subito feci figurare, mà essendo incerto, che fosse natua di quel paese, & hauendone dipoi hauuto noui semi da Pernambuco iui colti, e mandatimi con molt' altri confusi, è senza nome dal sopranotato Padre, come per lettera qu' à basso registrata nel fine di questa, stimai meglio il chiamarla Mimosa spuria di Pernambuco, che come figurata molto prima ch'uscisse in luce l'opera accennata del sopranotato Ambrosini, non parmi da tralasciare, massime non trouandosi iui, ne in altro luogo, ch'io sappia, descritta.

Non essendo questa, come di sopra si è motiuato, differente dalle piante uiue nella grandezza, e figura delle foglie, aggiungo, che queste sono solamente vn poco più tenui nella parte di sopra, perfettamente verdi, & in quella di sotto di color più pallido. Il fusto alcuna volta hò osservato (per essere secondo i terreni, e 'l clima in vn luogo più alto, che in vn' altro) per lo più però crescere in altezza circa vn braccio, e mezzo, vicino à terra, e di forma, che tondeggia, e di color verde macchiato di tanè, con superficie ruuida; mà inoltrandosi all'insù diuiene quinquangolare, & il colore verde acquista qualche lucidezza, e si vede interrotto da striscia di colore pauronazzo, e rossigno.

Dalla di lui parte inferiore verso la corona radicale nascono molti rami di varia lunghezza, e verso le cime trasmette altri rametti con foglie minori e tanto queste quanto le maggiori si possono dire rami fogliosi, per essere ogni foglia composta di molte foglie picciole nel modo stesso, che sono le sopranominate Mimose; e queste diuise in particelle minute, come si può vedere nella figura.

Que-

Questi rami fogliosi, o diciamoli foglie, che sorgono dalla parte del fusto, sono sostenuti da gambo corto; e le fogliette, che li compongono, sono in essi più numerose di quello, che siano nelle inferiori, situate dal mezzo in giù del caule, poichè arriuanò fino al numero di dieci: il loro gambo è snodato nella parte, che si congiunge al fusto, dalla quale spuntano certe alette acute, come spine; e più sopra vicino alla snodatura nasce vn furoncolo rosso, pieno d'humore trasparente, che propriamente si rassomiglia ad vn rubino, il quale è di sapore dolce, quanto il zuccaro: Vscitone quell'humore, vi resta impressa vna macchietta, che sembra vna picciola piaga sanguinosa, di colore di cinabro, la quale è molto vaga à mirarsi.

Germoglia poscia frà le cauità de' rami verso il principio del mese d'Agosto vn picciolo gambo triangolare, non molto lungo, nella cima del quale apparisce à poco à poco vn globetto rotondo, formato di molti bottoncini granellosi, nella forma, che sono quelli della Mimosa antecedente, i quali quando s'aprono producono vn picciolo fiore composto di stami, che leggermente gialleggiano, in mezzo à quali pullulano rare volte vna sola, ma frequentemente due, tre, quattro, & anche più silique vnite insieme, che crescono alla lunghezza, e grossezza, che si vede nella figura, in cui si rappresentano al naturale, non solo le silique, ma i semi, e le foglie ancora.

Queste silique nella parte di sopra sono di colore ruginoso, & al di sotto verdi, e diafane, cioè trasparenti, à segno che contraposte al lume vi si scorgono distintamente i semi della grossezza del miglio, ò poco maggiore, ma di forma ouata, piani, e di colore giallo. Quando queste silique sono maturate perdono totalmente il diafano, e restano molto oscure nella parte di sotto; come parimente i semi ridotti alla loro naturale maturità rimangono di color di tabacco, e di ouati si fanno quasi quadrati, nel mezzo rileuati con vn segno intorno, che visto col microscopio hà figura quasi oculare.

La radice della pianta è rotonda, gialla, lunga poco meno d'vn braccio, mà però sottile, anzi sottilissima nell'estremità inferiore, e tutta coperta, particolarmente nella parte più grossa di furoncoli, & aspra al tatto, e tramanda molte radici minori: nel sapore partecipa dell'aglioso, il quale però non è in lei tãto mordace come nelle radici delle sopradescritte sensitiue, benchè habbia molto dell'efficante al palato, molto dell'acuto al gusto, & assai del pungente alla lingua, lasciando in tutta la bocca vna gran siccità: le foglie hanno sapore non dissimile à quello del cece, e d'altri legumi freschi.

Mi persuado, che questa Mimosa si conseruarebbe vigorosa tutto l'anno

L'anno, se non fosse impedita dal rigore de' freddi: toccata, e maneggiata, come si motuò, non si ritira in se stessa, ne si risente in modo alcuno, mà nel tramontare del Sole si ristringe, e si chiude, riaprendosi poi quando rinasce il medesimo.

Per quest'effetto, si come per altri più euidenti, che si scorgono nelle antecedenti congeneri, hanno acquistato queste piante il nome di Mimose, ch'appresso à gl'Antichi significa buffone. Nell'Image si rappresentano al naturale le foglie, le silique, e semi, che mi furono mandati da Pernambuco con la seguente lettera.

Pax Christi. Molt' Illustr. Sig. mio Offeruandis.

Come scrissi à V. S. Molt' Illust. da Lisbona, colà non ritronai cosa per mandarle, bora di là si siamo imbarcati, e col fauor del Signore in 54. giorni ci siamo ritrouati nell' America nel Regno del Brasile, in questa Terra di Pernambuco, oue veramente quasi tutte le Piantie sono diuerse da quelle d' Italia, e di tutte quelle sementi, che mi hà parso non hauer veduto la Pianta prima, ne hò preso, e qui annesso le mando. Se frà queste ve ne riuscirà alcuna, che sij di suo gusto, ne hauero somma consolatione, caso che nò, mi compatisca, perche son poco simplicità. Di qui partiremo in breue per la nostra Missione del Congo nell' Africa, se piacerà a S. D. M. di leuarci colà à saluamento, farò diligenza per altre sementi, percho col seruir la in questa conosca, che hò animo grande di ciò fare in cose maggiori, ricercando con l' obbligo, che tengo con V. S. alla quale affettuosamente riuarendola mi dichiaro

Di V. S. Molt' Illustr.

il dì 17. Settembre 1667. Pernambuco.

*Obligatis. et affectionatis. Seru.
F. Michele Angelo da Reggio, Predicatore
Capuccino, e Missionario al Congo.*

Nellika. Cap. 79.

Fig. 61.



Erche la Pianta della Tota Vari, la' di cui descrizione è à suo luogo nella Lettera T. al cap. 104. per la sua picciolezza non occorrea che poca parte del Rame per non lasciarui tanto spatio vuoto, hò fatto in essa figurare la Nellika, come Albero di foglie assai simili à quelle della sudetta Tota Vari, e per le sue qualità degno di particolare offeruatione. Fù dissegnata dal già detto Padre Matteo, e da lui parimente in tale forma descritta.

Est Arbor in Oriente vocata Nellika, altitudine mediocris, producens folia paruula, lenia, & oblonga, ut Tamarindi; fructus verò, quasi racemati in foliorum cauliculis appenso; sunt autem foris in sex partes delineati, quibus respondens in obo incluso sex iidem linea, suspiculi, quorum tres ceteris eminent, in quibus semina alba paruaque includuntur: dum immaturus est sapor: cum habet asperum, & agrestem, & licet reuera talis sit, post gustum tamen exciuit saporem placidum, & suauem; dum vero maturus est, sunt ex ipsis condita cum faccero, cor apprimè corroborantia, & refrigerantia: exsicantur recunduntur, & seruantur ad fluxus ventris sistendos, facta ex eis decoctione, & epota, & prò quocumque praternaturali fluxu per inferiora facto, puto presentaneum esse rimedium. Item facta fructuum coctione, si loco Balnei adhibeatur, humores alterati sedantur, refrigerantur, & extenuantur.

Othonna di Dioscoride chiamata d'alcuni
Celidonia Indiana. Cap. 80.

Fig. 62.



Ino dell' anno 1670. publicossi alla luce la Datura di Coccino spinosissima con questa pianta, la quale hora di nuouo rappresentasi, non solo per dargli il suo donuto luogo nell' ordine dell' Alfabetto, mà anco per rappresentarla più diffusamente, e con miglior ordine della prima.

Questa pianta si conserua assai tempo illesa dalli freddi dell' Inuerno; e da che si vidde in Italia, massime in questo horto publico, e nel mio priuato

fig LXI



Nelica

Totta Vari

uato ancora, passò sotto nome di *Celidonia Indiana*. per la sua somiglianza, che hà con la *Celidonia* maggiore di questo Autore figurata, e descritta da Pietro Andrea Mattioli ^a, nel rauisare io questa pianta conobbi à causa di certe differenze, ch' ella non era la seconda *Celidonia* maggiore, che figura, e descrive il Clusio nell' Istoria delle piante rare ^b, come da certi è stata creduta, massime per esser questa pianta Clusiana di foglie vniformi, e disposte, come sono quelle della *Celidonia* maggiore volgare, essendo questa del sudetto Clusio benissimo stata figurata, e descritta da Gasparo Bauino nel Teatro bottanico ^c, e nel suo Mattioli con la stessa Imagine, è solo diuersa questa del Bauino, e del Clusio dalla volgare nelle incisure più sottili nel contorno delle foglie, e del fiore, come nota lui l' Autore, che la descrive, etiamdio, come pianta annua, che la mia di che si tratta è di radici perpetue, di foglie, come sopra scrissi, longo tempo durabili sopra terra, adunque per queste, & altre qualità, che à basso si descriuono, non stimarei la pianta del sudetto Bauino, ò la Clusiana esser altrimenti la mia *Celidonia Indiana*.

Mentre leggeuo il Testo della *Celidonia* maggiore di Dioscoride trasportato da Marcello ^e offeruai, che appresso alcuni, massime da Francesi era chiamata questa *Celidonia* maggiore di Dioscoride *Othonna*, & al mio parere non senza ragione per giouare assai l' acqua, che si distilla per vso de gli occhi, massime essendo quest' *Othonna* specie della volgare *Celidonia* maggiore, e quiui hauendo vicino il capitolo della medema, mi venne in pensiero di paragonarla con la mia *Celidonia Indiana*, e trouandola molto bene concordare con la descrizione di Dioscoride, che gli attribui essere di foglie simili all' *Eruca*, mà frastagliate, come se fossero da vermi corose, e di fiore croceo, di virtù vniformi à quanto scrisse il sudetto Autore, hò preso questa risoluzione per tale proporla al Lettore, non solo in descrizione, mà in figura ancora stimando, che à dotti simplicisti non sarà discara questa mia opinione, massime trattandosi d' vna herba, che doppo Dioscoride, essendo scorso circa à mille, e settecento anni, è sempre stata à gl' huomini incognita. Dalla radice di questa nasce vn gran cespo di foglie sostenute da gamboncelli caui nel di dentro, assai lunghi, per il mezzo de quali scorre vn cannaletto nella parte superiore assai concauo, e nella parte opposta, sorge vna costarella solleuata, e tondeggiente, che gli rende di forma quasi triangolare, da ciascheduno d' essi nascono foglie, che sono più tosto ramifogliosi, che foglie, assai simili (come nõ Dioscoride trattando della sua *Othonna*) à quelle dell' *Eruca*, ed altre minori, le quali sono parimente della stessa forma d' *Eruca*, mà disposte però in rottondo giro, come nell' Imagine s' offerua, si che sono assai simili à quelle del *Geranio* primo,

a Lib. 2. r. 173.
pag. 644. figura
grande.

b Lib. 6. c. 26.
pag. 203.

c Lib. 4. cap. 3.
pag. 74.
d Lib. 4. c. 169.
pag. 464.

e Lib. 1. c. 173.
p. 216.

che figurò il Mattioli, e per questa somiglianza alcuni moderni d' hoggidi l'hanno chiamata Celidonia maggiore Indiana con foglia di Geranio; sono queste foglie tenere, mordide, succose, & irsute, e son trascorse da folli neruetti nel di sotto assai rileuati, quali s'estendono verso il contorno con varie diramazioni, alcune rette, altre ritorte, tutte però riuolte all'insù, e perciò si rendono al tatto aspre, à cagione de' pelli, e delle sopranotate neruature, le quali appariscono nella parte superiore con altrettante folcature tenui, di colore più chiaro delle foglie, circondate di merli maggiori, mediocri, e minori, disposti senza ordine alcuno, altri acuti, & altri in cima tondeggianti.

Le incisure, e frastagliamenti di queste foglie sono irregolari, alcuni sono tanto profondi, che arriuanò fino al neruo di mezzo, e tanto variamente si trasformano, ritenendo però sempre queste foglie sembianza d'Eruca, come sopra fù notato, che non è possibile il distinguerle, ne ben rappresentarle in disegno, come dal naturale si vede la pianta, e da questa strauaganza di foglie osseruo, che si verifica quel detto del Ruelio *de natura stirpium* oue tratta dell' Ipericos, quando parla delle foglie dell' Othonna scriue *barbaro aspectu*, cioè di strane forme: le foglie più grandi s'alzano alla misura quasi di due spanne, l'altre sono più breui, e quanto più alte nella pianta, altre tanto minori delle basse, il colore di tutte nella parte superiore è assai verde, nell' inferiore sono palide, il sapore è assai mordace, & acuto.

Da questo cespo di foglie nasce vno, e più fusti, secondo la grossezza della radice, i quali nel principio della sua nascita sono tanto irsuti, e pelosi, che sembrano essere inuolti in vna bianca lanugine, che li cuopre, ne lascia ben distinguere all'occhio la forma loro, questi sono rotondi nel di dentro, da vn nodo all'altro caui, e mostrano vna sottil scorza di color argentino, che piegati non si rompono, anzi si rendono tenaci, e sfilacchiosi: portano questi rati nodi, grossi, composti di varie tuberosità ineguali, e sono assai l' vno dall' altro lontani, di sostanza teneri, e succosi, che rotti ne stilla vn humore di color giallo, che inclina al rosseggiante, come fa la Celidonia maggiore: ancora da ciascheduno di questi fusti maggiori ne nascono altri minori tutti apportatori di simil prole, nelle di cui cime sono alquante fogliette acute, sottili, lunghette, poste in figura di Stella; nel mezzo di queste nascono, e si diramano alcuni piedicciuoli sottili, e lunghi, che sostengono vn bottoncino per ciascheduno composto di quattro foglie ouate, che seruono di ricettacolo, quali apprendosi del mese d' Aprile, e Maggio, mostrano vn fiore composto di quattro fogliette di color giallo, le quali sono tanto variamente incise, e frastagliate, che profondandosi spesse volte fino al calice, non si possono à prima vista

fig LXII



Othonna vera di Diorcoride

vista discernere l'vna dall'altra, qualità ch' hà fatto credere ad alcuni, ch' essendo il fiore di foglie strette, per le incisure sopranotate, non possi essere la pianta che si pretende, e ciò per non hauer questi osservato le foglie de' fiori, che sono larghe, à benche per il lungo siano frastagliate, non togliendo le incisure, che le foglie di questo fiore non siano ampie, ò grandi però secondo la loro proportion: nel mezzo di questi fiori nascono molti sottili stami gialli, con altri tanti apici sopra del medesimo colore, li quali allargandosi, formano vn fiocco assai largo, di forma rotondo, si che questo fiore rappresenta in picciolo la figura d'vn Anemone, similitudine, che mosse alcuni (come scrive Dioscoride) à pensare, che quest' Othonna fosse vn genere d'Anemone, la di cui grandezza viene espressa à parte nell' Imagine.

Cadute le foglie del fiore, restano nel medesimo luogo à perfezionarsi le silique, benche Marcello Virgilio nel suo Testo Dioscoridiano, Greco, e Latino, non ne fa mentione alcuna, nulladimeno vengono queste affermate dal Ruelio, *de natura stirpium* & oue tratta dell' Iperico, e dice con ragione non esser altrimenti quest' Iperico l' Othonna di quest' Autore, come alcuni si sono stimati, il che dalle qui sue congiunte parole, potrà il Lettore conoscere, dicendo, *quo magis alucinantur qui Ipericum Othonnam herbam esse credant. Nam, ex si perforata crebro folia Iperici accies oculi deprehendant, non tamquam à rimis essent pertusa, vel erosa, sed velut acuminatim puncta conspiciet: item non ei flos inest croci lati folius, sed alba viola luteus, folium huic rura, alteri potius eruca tribuitur; neque semen in Othonna siliquis includitur. Peregrina herba barbaro aspectu.* Di queste silique, ne sono alcune lunghe, & altre corte, alcune dirette, altre contorte, prima verdi, che poi diventano nel maturarsi gialliccie, quali apprendosi, lasciano uscire i suoi semi di color scuro, che veduti col microscopio appariscono segnati di frequenti poretti, simili in ogni parte à quelli della Celidonia maggiore, & essi parimente hanno da vna parte vn' occhietto, quasi pupilla da cui trasmettono vna picciola cresta di sostanza bianca, che inclina al giallo.

La radice è assai grossa, e si mantiene eguale per l' altezza di due dita alquanto crespa, e di sostanza mediocrementè dura, indi poscia affottigliandosi si sparge in frà terra, e tramanda d' ogni intorno radici minori, e numerose fibre; il colore di dentro, e fuori è giallo, che inclina al rosso, come quelle della Celidonia maggiore; il suo sapore è mordente, ed efficace, l' odore di tutta la pianta è simile à quello del Cucumero, ouero Cetrullo, mà non così graue.

Mà che questa sia l' Othonna di Dioscoride, si proua con le di lui parole cauate dal Testo Greco, oue dice, *Othonnam sunt qui*
Troglò

Troglodytica cuiusdam herbe, quæ Othonna vocatur, succum esse credant: Nasceque eam etiam in Arabia, quæ ad Egyptum est: Habet Eruca folia, multum vulnerata, & perforata, perinde atque relicta ex Erucarum corrosione substantiæ non subsistentis, folia etiam pauciora, sed præcipuorum foliorum. Florem fert crocinum latifolium, propterea quidam putant Anemones genus esse, così legge il mio Interprete del Testo Greco; la parola πολύτρυπα foglie frastagliate, e non come il Barbaro *foraminibus multis*, & *continuis perforatis*, ne vi è alcun essemplio di pianta, ch'io sappia, che naschi con le foglie perforate, se bene il volgare Iperico, stimato d'alcuni, mà senza ragione, esser la stessa Othonna di Dioscoride, come bene fù dal Ruelio nel sopracitato capitolo auertito, quantunque habbino le loro foglie, che vitte al lume, ouero al Sole si mostrano perforate, non hanno però forame alcuno, che trapassi le foglie, eccettuato certa pianta che non è da paragonarsi con questa, anzi non è ne meno herba di sorte alcuna la quale fù figurata, e descritta dal Clusio nelli Eforici^b sotto nome di frutice marino reticulato, che è da vn lato all' altro perforato.

h. Lib. 6. cap. 3.
pag. 131.

Che questo sia il senso dell' Autore, si manifesta dalla somiglianza, che soggiunge *ὡς πρὸς ἄντρον* che significa come auanti della corrosione delle rughe, e non come legge il Barbaro *cribri modo*, imperochè gl'auanzi delle rughe, non sono fatti à criuello, mà sogliono essere tutte il più duro delle foglie appresso al neruo, hauendo il verme mangiato tutta la parte tenera nel contorno di quelli.

Legge altresì l' Autore *ἐλατόφυλλα*, aggiunto al *φύλλα* per foglie fogliose di poche foglie, mà principali, secondo la proprietà dell' *ἐλατός*, che significa i pochi, mà Principi, e non come di Barbaro *folijs paucioribus*. Soggiunge *ἄθος κρόκον*, fiore croccino, cioè di colore di Croco, e non *Croci figura*, & in quanto alla forma dice ch'è fiore di foglia larga, onde hanno creduto alcuni, che questa pianta sia vn genere d'Anemone; dunque per Croccino non si deue intendere la figura del fiore del Croco assai lontana dalla somiglianza dell'Anemone, mà si bene il colore di quello.

Mentre ch'io maneggiauo questa pianta per offeruarla, hauendo le mani humide del suo succo, m' accadè toccarmi con vn deto l' occhio destro, quale mi rimase mordicato, & offeso, ne riflettendo per all' hora la causa di ciò, stimai di riceuerne notabil lesione per l' eccessiuo ardore sopraggiuntoui, mà sentendomi sfogare quel mordicamento in alcune lagrime, sentij poscia indi à poco l' occhio assai confortato, e la vista rischiarata, qualità, che furono da Dioscoride attribuite alla sua Othonna.

E questo caso serue molto à confirmar la mia intentione, e ciò ch'io dico di questa pianta, imperochè Dioscoride della sua Othonna iui soggiunge: *Exprimuntur ex ea succus ad oculorum medicinam, cum purgari aliquid oportet:*

oportet:



oportet erodens, & quæ claritati eorum officium, omnia exterens. Ferunt præterea distillare ex Othomâ humorem aliquem, quem lotum calculisque omnibus purgatum, in pastilos conformant ad eandem utilitatem.

Palma Indiana chiamata da Portoghesi Birli. Cap. 81.

Fig. 63.



Questa ne porto solo l'immagine cauata dalle figure del Padre Matteo, ch'io la stimo essere vna stravagante specie di Palma, che porta foglie tanto da quelle della volgare diuerse, che non sembra ne meno essere Palma di specie alcuna: Mentre però dimorò qui alcun tempo in questa Città di Bologna il Padre Fra Valerio

Procurator Generale di sua Religione nel Malabar, & altri luoghi dell'Indie, mi ragguagliò, che gli habitanti del Paese usano le foglie di questa specie di Palma ne' tempi estiuu in luogo di ventagli: in oltre ancora ha molte altre vtilità, e virtù, che da questa pianta ne cauano gl'Indiani, come ne' manuscritti del Padre Matteo si trouano notate, quali, come quello, che le doueua produrre alla luce per via di Stampa, come nel Capitolo dell'Ardabar fù scritto, non le curai.

Parcol Arbore Indiano, Cap. 82.



Arcol Arbor syluestris habet lignum asperum, fructus producit paruos figura, & gustu nostra Hypomelidi similes, sed parum trigonales, & dulciores. Flores emittit pulcherimos, quattuor folijs compositor, ex quorum medio exiit virgula oblonga sanguinea, radix est multum medicinale.

L'immagine di quest'Arbore è nella figura 23. della Buebenda. Parcol viene nominato dal Padre Fra Vincenzo Maria nel suo viaggio, con le seguenti parole.

Parcol pianta pur boscareggia, con il frutto picciolo, rosso, simile alle nostre Larole, più dolce, con il fiore bellissimo, simile ad vn Gelsomino doppio, tinto di porpora, sopra rigato di color d'oro, che moltiplicando tante varietà rende vaghiissima vista.

Pepe

2 L. 4. c. 9. p.
167.

Pepe Indiano velenoso. Cap. 83.



Questo è vn frutto maligno, che dall' Indie fù portato nell' Inghilterra, ed indi in Italia dal Sig. Aleffandro Balami, quale fino dell' anno 1656. mi donò i semi originali, la figura de' quali è nel Leandro Cretense minore. Questo pepe, per quant' io offeruai dal naturale, viene più grosso del nostro commune, e più largo in quella parte, con la quale stà appeso al suo piedicciolo, la sua scorza è poco crespa, di color giallo scuro, punteggiata in modo tale, ch' all' occhio rappresenta vna mal fatta maschera; mà offeruata col microscopio sembra quasi vna testa di morto, con la qual figura par, che la natura habbia voluto contrasegnarlo per mortifero. Delle sue qualità, come del sapore, ne d' altro non ne hò alcuna esperienza, stando, come scrissi nel capitolo del Garofalo velenoso, non ne feci cura, hauendolo consignato all' Eccell. Sig. Dottore Montalbani, per aggiungerlo nel Capitolo del Pepe nell' Istoria dell' Aldrouandi, che destinaua alla luce.

Pincheui Arbore Indiano. Cap. 84.




Inxeni est Arbor, qui habet folia magna, quasi rotunda, aliquantulum aculeata, plana, non tamen lenia, sed parum aspera, flosculos producit paruos, fructus in racemis sicut vna, ex quorum seminibus extrahitur oleum, quod est optimum pro intemperie frigida.

Parimente descriue questa pianta il P. Fra Vincenzo Maria nel suo viaggio, così dicendo.

La Pianta Pincheui tiene le foglie mediocri, quasi rotonde, vn poco punte, nell' estremità piane, alquanto aspre, con li fiori piccioli, e quasi stellati, di colore rossi chiari, che s' impalidiscono, raccolti in mazzetti, alli quali succedono li frutti parimente uniti, come in groppi piccioli, rotondi, viscosi di color oscuro, dalli quali si sprema oglio molto caldo, & ottimo per li dolori, che procedono da intemperie frigida. L' Arbore è mediocre, non s' ingrossa molto nel tronco, ma quasi tutto si diffonde vicino à terra sparso in rami.

Il ritratto di questa pianta si troua figurato à parte nella figura 75. del Tlaspio fruticolo di Persia.

Pim-





Pimpinella maggiore Sopicata di Canada.

Cap. 85.

Fig. 64



Intre la Pimpinella massima, figurata, e descrittà da Giacomo Cornati nell' Istoria delle piante di Canada, altrimenti chiamata noua Fràcia, se ne trouano altre due specie del medesimo paese, l'vna, e l'altra coltiuata nel mio horto, e dalla sudetta molto diuerse, quale per non ritrouarsi appresso alcun Autore, ma solamen-

a Pag. 175.

te registrate nell' Indice dell' horto Blesense ^b; con nome di Pimpinelle, massime Canadensi: la prima di Spica lunga rossa, e la seconda di Spica rossa amallata, ouero glomerata se ne porta qui le figure con le loro descriptioni, la prima con nome di Pimpinella maggiore di quel luogo, e la seconda di Pimpinella minore.

b Pag. 266

Cresce con molti fusti, i maggiori de' quali sono dell' altezza di circa due braccia, e grossi verso la Radice il doppio d' vnà penna da scriuer, rotondi, sottilmente scanellati, coperti di scorza pelosa, ruvida, ma lucida, che difficilmente si leua dalla parte. Sono nell' interno alquanto cavi con midolla bianca, massime verso la parte superiore, oue la cavità è assai più euidente; hanno rari nodi, trà di loro discosti più d' vna spanna, mà verso la cima sono però più frequenti. Pullulano questi fusti da vn germoglio di foglie sostenute da gamboncelli rotondi, e nel di sopra folcati, e rosseggianti (e rosseggiano ancora le foglie nell' vscire di terra) il quale è composto di molte foglie, ouero rametti fogliosi, che nel di sotto abbracciano tutto il caule, e son queste nella loro dispositione, e figura simili a quelli della Pimpinella nostrale, eccetto, che questi sono di gran lunga maggiori, alcune delle loro foglie arriuando alla grandezza, che à parte si vede nell' imagine, assomigliansi assai à quelle della Bettonica, e però non senza ragione è stata chiamata d' alcuni moderni Simplicisti d'oggidi Pimpinella maggiore Indiana, con foglie di Bettonica. Al piede di queste se ne vedono delle minori cò cortissimo piedicciolo annesse, e sono tato le gradi, quãto le piccole, nel contorno merlate, con punte acute, mà nõ pungenti, nel di sopra folcate, di colore verde scuro, mà nel di sotto biancheggianti, cò le nerature tutte rileuate, di sostanza moderatamente carnose, con qualche lucidezza, e spirano vn' odore simile à quello delle foglie della Vite, e hanno sapore vn poco amaro, glutinoso, & astringente, non senza qualche mordacità.

Dalla metà in sù di ciascuno de fusti, frà essi, & i rami fogliosi si diramono gambi, ò fusti triangolari lunghi, e diritti, i quali verso la cima si diuidono di nuouo in altri più sottili, che nell'estremità tramandano vna congerie ouata di bottoncini verdi con quattro costarelle, e questa crescendo s'allunga in vna spica, piena di folti fioretti, composti di picciolissime fogliette, e stami di colore tanè, che rendono le spiche come piumose, delle quali altre sono picciole, altre più grandi. Questi fiori s'aprono nel mese di Giugno, e veduti col microscopio sono composti di quattro foglie tondeggianti, e variamente ritorte, nel mezzo delle quali s'alza vn cilindretto rosso oscurissimo, con vn picciolo fiocco nella cima, pieno di filamenti corti, e contorti, che biancheggiano.

Sembrano le spiche nell'esterno dipinte à stacchi, apparendo trà la regolata serie de fiori vn spatio biancheggiante ordinato, ma interrotto, che è la sostanza, della quale è composta internamente la spica.

Caduto il fiore, vi rimane vn ricettacolo triangolare, lunghetto, alato colore cauillino, grosso il doppio di quello della Pimpinella nostrale, con dentro vn seme, che in questo clima in conto alcuno non matura.

La radice di questa pianta è grossa più del deto pollice, disuguale, e grupposa, di colore ferrugineo, che rosseggia, di sostanza non molto dura, che non s'affottigha molto nelle parti inferiori, e trasmette altre radici di varia lunghezza: Il di lei sapore è più amaro di quello delle foglie, astringente, e molto efficace. Et è pianta perenne.

Di essa, e d'altre ancora sopra notate, che nel fine di questo volume dirò, ne parla l'Eccell. Roberto Morison Medico Inglese, e professore Botanico del Sereniss. Carlo II. Rè della Gran Brettagna, nel di lui horto Regio Blesense impresso in Londra l'anno 1669. e trasmessomi dall'Eruditissimo Sig. Antonio Magliabechi Bibliotecario dell'Altezza Serenissima di Toscana, doue il medesimo Autore nelle Annotationi aggiunte scrive le seguenti parole.

Pimpinella maxima, spica longa rubra: Hec à Sanguisorba differt, quod spicam gerit, ipsa longiorem, ternis, quaternis vncijs constantem, (nel mio horto però non hà mai prodotto spiche di simil lunghezza, mà solo conforme si dimostra nell'Imagine) huius est, & alias species (che sarà quella che qui si figura, e descrive sotto nome di Pimpinella minore di Canada) ei omnino accedens, nisi quod spica sit breui, Glomerata, rubra pariter, vtraque folia gerit longiora, & magis serrata, quàm Pimpinella sanguisorba.

Pim-



Pimpinella minor de Canada

Pimpinella minore spicata di Canada.

Cap. 86.

Fig. 65.



Resce questa poco meno della prima, con le medesime fattezze, eccetto che il caule, quale è più sottile, e nell' intorno più escauato, porta parimente i suoi nodi nella medesima maniera disposti, se non che dal ramo foglioso non sono del tutto abbracciati, come nell' antecedente, ma in luogo di ciò vengono contor-

nati da due alette, ouero orecchie dentate, lunghe; sono ancora le di lei foglie molto più picciole, cioè men lunghe, e più strette, che nella sudetta, come bene s' offerua nella figura, essendoui à parte espressa la grandezza naturale delle foglie della Spica, e del seme, nella conformità, che si sono lasciate vedere nel mio giardino. Il loro sapore è simile à quello delle amandole fresche, quando sono ancora ben tenere.

Porta gli suoi fiori molto più tardi dell' altra, con spiche più breui, più dense, e nella cima più grosse, benchè si sia offeruato, che vna sol volta allungò vna spica al pari di quelle della maggiore, e più ancora, e con fertilità più grande, hauendo trasmesso nella stessa spica molti altri cauletti nudi, come dall' Imagine si può vedere, nella cima di ciascheduno de quali vi era vn sol fiore della forma, e colore de gl' altri; il che però io stimo esser stata vna monstruosità della pianta, come del continuo in molte altre accade.

Traffette il suo fiore, come sopra scrissi, molto più tardi della prima, principando à fiorire solo verso il fine di Settembre, & aperto che sia, si vede parimente composto di quattro fogliette bianche, nel mezzo delle quali passa vna linea verde, e non molto dappo mutati il di lui colore di bianco in rosso chiaro, che à poco à poco si rende scuro, e nel fine tende al nereggiante, riferuandosi però qualche poco di bianchiccio nelle cime delle fogliette floride, che vedute col microscopio sembrano asperse di farina frumentacea, e nel mezzo di questi fiori sorgono quattro appici gialli, curuati, e macchiati di colore nereggiante, onde ne riesce molto vago il fiore.

Il di lui seme non si è potuto maturare, non essendosi visto in questa pianta altro che i di lui ricettacoli rotondi, e grossi come vn coriandro, di colore oscuro, & in quattro parti alati come nella figura si mostra.

La radice non è così grossa, come nella precedente, ma ancora lei di

colore rosseggiante. Il suo sapore è più amaro, più astringente, e più efficace della sopradescritta, essendo questa parimente pianta perenne.

Due generi di Pimpinelle registrò Gasparo Bauino nella sua Fitopinace. Nel primo genere ne collocò di quattro specie, le quali sono oggidì appresso gli herbari note; alcune di queste servono per uso della medicina, massime infrangere i calcoli nelle reni, e per edurre la renella, e rompere la pietra nella Vescica, e d' esse in altro luogo più à pieno se ne discorrerà, oue vn' altra di questo genere si darà alla luce, ch' io la penso pianta non più appresso altro Autore offeruata.

Il secondo genere di questa è la Pimpinella volgare detta sanguitorba della quale ne sono registrate di altre quattro specie nella sopradetta Fitopinace, pure à gli Speciali la maggior parte cognite, alle quali da gli herbari gli viene attribuita virtù di restringere li flussi del sangue, anzi che di questa maggiore, e minore, che nasce ne' nostri fiumi, ne hò fatto molte volte esperienza, che infusa, e tenuta nel vino fa gli effetti della prima Pimpinella Ircina sopranotata, imperòche beuutone il vino per buon spatio di tempo fa mirabile effetto in adurre per vrina quantità di renella con largamente far orinare, anzi che à questo effetto alcuni hauendo prouato il gran giouamento, se ne sono fatti di questo Vino corbe intiere per seruirsene vna gran parte dell' anno.

E pure di queste Pimpinelle Indiane se n'è fatto esperienza, massime della prima, che ne hò nel mio horto, e nel publico ancora maggior quantità, che usata nel sopracennato modo fa il medesimo effetto, mà con maggiore efficacia per esser nel sapore, & in tutte le altre qualità molto più potente delle Pimpinelle volgari.

Quadrifoglio annuo pianta di Persia.

Cap. 87.

Fig. 66.




Rà semi confusi di Persia come auanti si scrisse nel Capitolo della Chrisocome, & altri luoghi ancora venuti à quelle Serenis. Altezze mi naque questa rara specie d' herba, la quale per quanta diligenza habbia usato, non hò mai trouato appresso à gl' herbari simil genere di pianta, ne meno posso risoluermi sotto à che classe si possa collocare, benchè nel crescere porta i suoi rami sopra, al

terre-



fig LXVI



Quadrifoglio annuo di
Perria

terreno distesi, come fà l'Antillide Valentina, che figura, e descrive il Clusio proposta nell'istoria Lionese ^a nel trattato delle piante catartiche, ouero solutue ^b sotto nome di Chamecise dal Dalecampio, ma le foglie della mia pianta, sono più larghe, e sempre disposte al numero di quattro per ciascun nodo, & in forma di croce, nel modo ancora di quelle della Rubia spicata cretica, figurata, e descritta dal sopradetto Clusio ^c, e d'altre simili piante, che per breuità si tralasciano; non sapendo dunque come chiamarla, da quella dispositione quaternaria delle sue foglie, gli hò imposto il nome di Quadrifoglio Persico, che qui giuntamente con la sua descrizione si figura.

Cresce con molti fusti lunghi circa ad vn palmo, ouero come mostra l'immagine, essendo esse il naturale delle sue foglie, e di tutta la pianta ancora, di sostanza sottili, legnosi, e facili da romperli, coperti di scorza sottilissima, che nel verde rosseggia piena di midolla biancheggiante, questi portano spessi nodi, rileuati, & anellati, l'vn dall'altro discosti poco più d'vn deto per il trauerso, da ciascuno de quali crescono le sue foglie sēpre à quattro insieme con breue, e sottile piedino cōgionte, di colore verde, e nel di sotto bianche, à luogo, à luogo aspre, e punteggiate di certa piuma bianca, che le rēde alla vista grate, trascorse per il lungo da vn sottil neruo, il quale nel di sotto vn poco si rileua, e sono queste simili à quelle della sopracennata Antilde del Clusio, ma vn poco più larghe, e nella cima vn poco efcauate, & incise, come nell'immagine s'offerua, da ciascuno de nodi, oltra le foglie, nascono altri fusti minori fogliosi, e da questi li terzi con foglie minutissime, & iui sono li suoi nodi tanto vicini, che rendono la pianta molto folta, e piena di fusti, e di foglie, le quali gustate sono molto asciutte, e rendono vn sapore simile à quello del fico imaturo.

Ogn'vno di questi nodi, oltre le foglie già descritte, porta ciascuno il suo bottone di forma quadrata, composto di quattro coste molto rileuate, che formano altrettante solcature assai caue, e sono questi bottoni nella parte di sotto, massime nelle coste, rosseggianti, e con sopranotati punti variegati, e nel giungere il principio di Giugno, lasciano vscire vn fiore molto vago di colore ametistino, ciascuno de quali è composto di cinque fogliette di forma tondeggianti, e nelle cime come le stesse foglie della pianta, efcauate.

Caduto che sia questo fiore, resta ne' ricettacoli il suo seme minutissimo di colore di tabacco, vn poco lucido, che visto col microscopio si mostra di forma ouata, e nero nella punta minore, con vna fissura nel mezzo, nel modo che porta il Triticum volgare, ouero frumento, à cui ancora si assomiglia di figura.

La sua Radice è sottile di colore, che inclina al ferrugineo scuro, tutta con-

^a Lib. 6. pag.

^b 187.

^c Lib. 16. f. 22.

1660.

^c Lib. 5. ca. 59.

pag. 177.

ta contornata di sottilissime fibre, alcuna volta è intiera, & alle volte si divide in più radici. E' pianta annua.

Ramba Arbore Indiano. Cap. 88.



Ramba Arbor est procera folia habens oblonga, nervata, ut in figura conspicitur, coloris viridis, fructus verò habet similes Coriandro, sed in racemis, sicuti uua, & sunt multum salutiferi infirmis, folia cocta cum sale, & sulfure in aqua omnes plagas sanat breui tempore. Succus, vel puluis de fructibus est valde mirabilis pro plagis, cancrenis, & fracturis ossium.

L' Imagine di questa pianta è nella figura 76. della Tossunda.

Rambora, ouero Rumbora, Pianta Orientale, così la descrive il Padre.

Cap. 89.



Ambora est Arbor Sylvestris, à Lusitanis Pero de Matto, dicta hec habet folia satis magna, aspera, & dura magis, quam illa nostra ficus, multum nervosa, præsertim in parte inferiori, fructificat multum non in ramis, sed in trunco, ubi ex omni parte oriuntur gemmae, in quibus nascuntur fructus, ut pomum parvulum lanuginosum, habentes stellam in medio cum quatuor corniculis; conduntur in aceto, siue aqua salsa pro usu cibario; & Corui comedunt in arbore.

L' Imagine di questa Pianta è nella figura 79. del Zambul primo Arbore Indiano. Viene ancor descritta questa Rambora dal Padre Frà Vincenzo di S. Catterina nel viaggio all' Indie Orientali, quasi dell' istesso tenore, cioè.

La Rumbora pianta boscareggia, e silvestre, è chiamata da Portoghesi pero di Matto, la qual cresce à grandezza mediocre, con la foglia molto grande, asprissima, e dura più di quella de' nostri fichi, per la parte di sotto molto neruosa, in quella di sopra spinosa. Non produce fiori, ma molto si seconda de' frutti, nel sol tronco però, e rami più grossi. Nella corteccia, e qualità del legno è assai simile all' arbore del pomo. Il frutto non nasce mai solo, ma due, tre, e quattro giunti,

gionti, sopra certe verghette curve, nodose, e curve, simile nell'estrinfeco alli nostri pomi seluatici, sol che al tocco più aspri, lanuginosi, e con quattro picciolissimi monticelli, o eleuationi nell'estremità, che li formano come una picciol corona. Crudo è alimento molto ordinario delle Cornacchie. Preparato serue ancora per gl'huomini, stagionandosi con lasciarlo in infusione di Sale, & aceto.

Rategal Arbore Indiano. Cap. 90.



Rategal Arbor producit folia oblonga, & ornata coloris viridis; Flores pulcherimos habet multum racematos; & trunco enim prodeunt multe virgule, in quarum summitate sunt quadam foliola virides, bipartita, ut nostra viola: prima inferius clausa cetera totaliter aperta, & quarum medio fasciculus virgularum sanguinei coloris exit, & una foliola paruula, cum caule longo, scia crispa, quæ respicit contra fasciculum prædictum. E lateribus sunt quatuor alia folia, omnes rubri coloris, crispa, & pulcherima, pulcherimo ordine disposita, & in eodem racemo flores nascuntur interdum aliqui flauis, aliqui rubri, alij partim flauo, partim rubro colore variegati, quos sustinent receptacula superius rubra inferius vero viridia. Semina dant, ut Piseli, odore Nasturij nostri. Visuntur fructus ad soluendum corpus, & semina cocta cum aqua salsa, sunt optima pro vlceribus malignis. Puluis similiter idem efficit.

La figura è nell'Imagie della Tolsunda, ouero Casunda.

Rubbia Siluestre aspera del Bosco di Rauenna. Cap. 91.

Fig. 67.



*Asparo Bauino nella sua Pinace, nel trattato della Rubbia, e dell'Aparine, ed altre simili Piantes, collocò la Rubbia satiuu nella prima Classe al numero primo; ne registrò parimente vn'altra al numero secondo, con nome di Rubbia siluestre aspera di Dioscoride, la quale fù dal Cordo b nelle offerua-
tioni*

a Lib. 9. f. 8. 1.
pag. 333.

b pag. 333.

Lib. I. c. 109.
pag. 497.
e pag. 463.

zioni sotto lo stesso nome similmente descritta, e dal Trago nell'Istoria^c fù per Rubbia siluestre eratica proposta, il Lobelio nell'osservatione^d propose questa pianta per Rubbia massima, asserendo (e con ragione) essere poco dalla Rubbia fattiua diuersa.

e pag. 333.

Il medesimo Gasparo Bauino nell'istesso luogo, registrò vn'altra pianta, quale non è altrimenti aspera, mà lieue, e senza aculei, e dal Martioli nelle sue Editioni sopra Dioscoride, massime nell'ultima con figura grande^f, fù per Rubbia siluestre di quest'Autore creduta, e con simile nome fù chiamata dal Tabernamontano nell'Imagine^g, e dal Gerardo^h nella sua Istoria, e da altri ancora, che per non tediar il Lettore tralascio.

f pag. 971.

g pag. 186.
h Lib. I. p. 118


Oltra alle due sopranotate Rubbie, teng'io in quest'Orto publico, e nel mio priuato ancora vna simil Pianta, quale parmi diuersa da ogn'altra Rubbia sin hora appresso gl'Herbari cognita, e degna da potèr esser collocata frà le spetie delle Rubbie siluestri, massime per nascere apunto in luogo siluestre, chiamato il Bosco de' Pini di Rauenna, detto dal volgo la Pigneda, doue nascono molte rare Pianta, delle quali à suo luogo se ne discorrerà.

Hora trattarò adesso di questa mia Rubbia siluestre di foglie strette, non sapendo alcun, che Autore moderno di lei habbia data notitia, e poi per nascere ne'luoghi da Dioscoride citati, la crederei forsi più d'ogn'altra conuenire con la siluestre del medemo, tanto più, che la pianta proposta da gl'Autori, cioè la prima sopranotata, per quanto hò osseruato nel mio Orto, poco, ò niente si scosta dalla fattiua, e come bene auerte il dottissimo Lobelio sopranotato; anzi s'io deuo dire il vero, credo, che questa mutatione naschi per ragione di luogo, e non per differenza della pianta, la seconda Rubbia creduta quì da altri per la Siluestre di Dioscoride, essendo pianta liscia, à mio parere si scosta, e si muta totalmente dal genere e dalla spetie della Rubbia fattiua, tanto maggiormente, che Dioscoride non hauendo scritto fattezze, ne qualità alcuna della sua Rubbia siluestre di quì argomento, ch'esso s'intenda (in questo caso) d'vna pianta aspera, mà minore della maggiore, perche se questa Rubbia siluestre fosse stata di genere diuerso dalla prima, Dioscoride l'haurebbe descritta, come hà fatto delle due Chelidonie maggiore, e minore, che sono di genere tanto differente l'vna dall'altra, dunque non hauendo ciò fatto tacitamente s'intende, che la sua Rubbia siluestre sia del genere della prima, ne si può credere con ragione, che questa pianta senza spine sia la Rubbia siluestre di quest'Autore, pure tuttauia mi rimetto à miglior giuditio, stante che l'Autore (come sopra descriuò) di questa Pianta fuori che il nome, altro di lei non lasciò scritto.

Trasmette questa Rubbia da vna sola radice molti fusti vniti insieme
liche



Fig. LXVII



Rubia glaucescens Aspera

siche formano vn' allai gran cespo di Pianta, quale stà dritta senza alcun apoggio, questi sono vicino à terra tondeggianti, e di colore scuro, mà poco più sopra, oue cominciano à spuntare le foglie sono solcati, e caui, di formà quadrata, e di colore verde; portano rari nodi, massime nelle parti da basso, mà nelle superiori molto s'auicinano, ne quali sono le sue foglie disposte in formà stellata, e di numero incerto, hora quattro, hora cinque, & alle volte sei, lunghe poco più d'vn' oncia, e larghe mezzo quarto, di sostanza sode, asciutte, & in ogni parte lisce, che però poi diuentano aspre per causa di certe breue spine, che gli succrescono sopra le nerature, che d'ambe le parti riescono rileuate, cosa che s' offerua in pochissime piante; e sono dette foglie sostenute da piedini grossi, e bianchi, che sotto vn poco rosseggiano, e piegati che siano si rompono.

Verso il principio di Luglio tramandano i fusti della metà in sù vn gambocino per parte, come ben nell'Imagie s' offerua, quali allongandosi mostrano alle volte certe foglie molto sottili, e diuersamente disposte dall' altre della pianta, e portano nelle cime loro bottoncini verdi, che apprendosi in cinque foglie, danno luogo al fiore, composto d' altre cinque fogliette di color verde chiaro, grosse, & in cima acute, nel mezzo delle quali sorgono cinque stami con apici di color giallo.

Caduti questi fiori, nasce nell' istesso luogo vna bacca, la quale per non essersi maturata non hò potuto offeruare, mà secca, venuta dal luogo natio è nera, rotonda, entroui materia crassa, e nel mezzo contiene vn seme rotondo, cauo da vna parte, e di color scuro.

La radice è rotonda, ondeggiante, non molto grossa, lunga circa due palmi, con scorza grossa, e soda, che difficilmente si leua dalla parte interna, ch' è sottile, e tenace; trasmette altre radici minori, che portano quantità di fibre sottili, e tutte sono di colore rosso scuro, alla superficie delle quali nascono germogli nodosi, lucidi trasparenti, di colore giallo chiaro, che tira al colore delle canne, quali serpeggiano frà il terreno, e si dilungano, e portano alla luce altre nouelle piante.

Gustata questa radice, lascia vn poco di sapore amaro, che presto suanisce, quello del fiore è mordente, e caldo, e le foglie sono asciutte.

E' pianta perenne di radice, e di foglie.

Le virtù della Rubbia, secondo l'interpretatione, che fà Marcello in Dioscoride parlando della di lei radice, scrisse; *gracilis est, longa, rubens, urinam ciens: eamque ob causam, suffusus felle, cum mulsâ aqua utiliter bibitur, coxendicis doloribus isidem, & resolutis, copiosam, & crassam ducit urinam: aliquando etiam sanguinem: lauari tamen quotidie bibentes in balneo oportet, & excrementorum suorum discrimina contemplari. Succurit, & viperarum morfibus radice rubia succus, simulque foliorum porus: minuit lienes semen*

Y

in aceto

l. 2. 3. c. 131.
(fol. 44)

in aceto mulso posum: quin etiam apposita radix, statim, secundas, & menses
trahit: sanat eadem etiam vitiligines albas, ex aceto emplastri modo imposita.

Rumphal pianta Orientale, specie d'Aro India-
no quale così vien descritta dal Padre
Matteo. Cap. 92.



Rumphal vulgò dicitur *Ignome*; producit florem oblongum
unico folio, pictum, ad modum *Tuppe* coloris flauis, ex ru-
bro maculatum, odoris acuti, ex cuius medio exie lin-
gua
admodum serpentis, sed non pictum, coloris sub flauis
truncus altus, equaliter maculatus, coloris supradicti; su-
cus elibitus noxius est, vtuntur radicibus ad sanandos
morsus serpentium, si vulnus est recens, quod si non, ferro
vulnus iterum aperiant, & sic curant; est etiam radix remedium infigne trita,
& imposita supra partem morbo gallico affectam, ex purgat enim, & sanat: per
fede di ciò che qui si racconta di questa pianta Indiana, descriuesi dal Mol-
to R. P. Fra Vincenzo Maria di Santa Catterina da Siena oggidì dignissimo
Priore del suo Conuento in questa Città di Bologna nel suo Viaggio all'
Indie Orientali, recitato quasi con le stesse parole con nome di Radice
di Confal, cioè.

La radice Confal è quasi rotonda, simile ad una Rapa macchiata, con al-
cune altre picciole radici, o codette, che li pendono disperse nella parte inferiore, &
è rimedio usitatissimo contro il morso velenoso de' Serpi, applicandola alla piaga
ò luogo nuouamente offeso, la quale se già è chiusa, è necessario rimouerla con il fer-
ro. Spoluerizzata, dicono, che vngli per medicare le piaghe corrotte. Produce
due rami vuoti, nel fine carichi di tre foglie grandi, nel principio due pic-
ciole, & un fusto nel mezzo, pieno di sugo velenoso, perciò pastoso,
quasi bianco, macchiato di rosso, che nell'estremità s'ingros-
sa, e sporge un fiore strauagante d'una sol foglia mol-
to lunga, di color giallo, crespa, e puntata à
guisa d'una trippa, con macchie rosse,
d'odore molto acuto, dal cui centro
si stende come un serpente, di
colore parimente quasi
giallo, non però tanto colorito
come la foglia.

Sesamo Annuo, forse il bianco di Theofrasto.

Cap. 93.

Fig. 68.



Stendoli prouato, quando si trattò de Miagri, che quella pianta, che dal volgo vien chiamata Sesamo, non sia il Sesamo de gli Antichi, nè specie alcuna di quello, mà più tosto vna sorte di Miagro, resta à vederli quali delle piante moderne più se gli accostino. Io per me credo, che tali siano due piante sotto altri nomi ben cono-

sciute; l'altra di noua offeruazione: le quale parmi, che debbansi chiamare Sesami, non perche io pretenda, che siano in tutto, e per tutto i due Sesami di Teofrasto motiuati, come vn solo da gli altri Autori; mà perche, hanno la maggior parte delle note, e fattezze di quelli, come dal confròto m'ingegnardò dimostrare, pregando insieme trà Sig. Sempliciti, chi troua di meglio à comunicarcelo per approfittarci con le loro offeruazioni.

Mà prima, che m'inoltri in altro, è da offeruarsi col dottissimo Bodeo ne' Commentarij sopra l'istoria di Teofrasto ^a, che anticamente fù molto equiuoco questo nome di Sesamo; perche non solo significò la pianta frumentacea, & ogliosa, di cui trattano gli Antichi Sempliciti, mà diuerse altre ancora: essendo chi preso Dioscoride ^b, e Plinio ^c il Ricino fù chiamato Sesamo siluestre, come parimente nominato venne l'Eliotropio maggiore, come notò il sudetto Bodeo ^d, quale Eliotropio maggiore, io crederei essere l'Eliotropio tricoceo, che porta semi di figura del Sesamo, e dell'Euonimo; oltreciò Dioscoride, trattando dell'Ebano, ^e accenna, che anche vn'albero così chiamossi, come consta ancora nell'interpretatione di Marcello mentre iui fa mentione de' legni Sesamini, se però in vece di *βυσάννα ξύλον*, non si deue leggere *βυσάννα* con Marcello ^f, aggiungo io, che Sesamo fù il nome d'un Castello, ò Città nella Paflagonia, che Amastri poi fù detto, come notò Plinio ^g, e forse indi trasse il nome la pianta già tanto celebre per tutta la Grecia, e fuori, per l'oglio che se ne cauaua in abbondanza; se pure, come accenna il Bodeo ^h, non portò questo nome dall'India, d'onde prima fù portata, ò dall'Egitto, ò dalla Soria, oue coltiuossi non meno, che nella Grecia.

Di questa pianta, come si è descritto, due forti ne conobbe Theofrasto, che in varij luoghi ne fa mentione, collocandole trà le biade, che mancano di nome commune. Dioscoride ne fauellò come d'vna pianta

a Lib. 1. cap. 3.
Pag. 2. a.

b Lib. 4. c. 164.
pag. 378. tra-
duttore di
Marcello

c Lib. 15. ca. 7.
Dilectamp. p.
315.

d Ibidem.
e Lib. 12. c. 114.

pag. 122.

f Pag. 112. lib.
1. cap. infra.

g Lib. 6. cap. 2.
pag. 120. Da-
lecta. 11.

h Ibidem.

sola; e perche la suppose vniuersalmente conosciuta, seminandosi à suoi tempi come gli altri frumentacei, non la descrisse, contentandosi di notarne le virtù sole. Plinio ne trattò come di biada estiuu: e Columella come di legume. Niuno però ne disse à bastanza, mà da tutti insieme si raccoglie, che il Sefamo era pianta annua, di radice più numerosa, e di fusti più grossi, e più copiosi, che nel miglio serulacei però più, che altro; di foglie arundinacee, che verdi non si mangiauano da gl'animali: di fior foglioso, che portaua il seme di molte tuniche veſtito, e con maniera particolare rinchiuso ne' ricettacoli duri: e che però lungamente si conseruaua, di sostanza ogliosa, e sarinosa, cauandose quando farina, e quando oglio: di figura non diffimile à quella de' semi dell'Euonimo, dell'Elleboro nero; che perciò in Anticira sù chiamato Sefamioide; si come anco il primo Tribolo di Teofraſto, che al mio parere non è altro che l'Eringio marino degl'herbari, come altroue si dimostrerà quando si tratterà del vero Eringio di Dioscoride, che per anco appresso à Simplicisti io penso incognito, & ancora all'Irione di questo Autore, che da Auicenna, secondo la traduzione del Gentile ⁱ chiamasi specie di Sefamo d'abominuole sapore, e da moderni frumento Saracenicu, diuerso però come altroue si disse, dell'Irione di Dioscoride, e che seminato maturauasi in quaranta giorni, e tal volta più presto ancora.

ⁱ Eten. 1. 418.
pag. 18.

Le quali condizioni concorrendo per la maggior parte in quella pianta, che oggidì da molti vien chiamata lacrima di Giobbe, e da altri mà con errore sù per Litospermo maggiore, ò canna litosperma (non perche sia specie del Litospermo di Dioscoride, come notò Luigi Mundella nelle annotationi sopra li Simplici del Brasauola ^k, mà per la durezza fauosa della scorza de' suoi semi) mi danno cagione di crederla specie del Sefamo de' gli Antichi, e forse il bianco di Teofraſto; perche bianco, anzi candido ella porta il seme, liberato però che sia da tutte le sue spoglie qualità in vero concernenti alla legitima pianta del Sefamo.


^k Pag. 109.

Cominciandosi dunque il confronto dalla Radice, se questa nella pianta di Teofraſto era più numerosa, che nel miglio, seruendo ad alimentare molti fusti arundinacei, onde credeuasi potere ismagrire assai i terreni, lasciando scritto, secondo che espone il Gaza, seguitato dal Bodeo sopracitato, e da Cesare Odone ^l *omnium autem, quæ estimis sementibus ager recipit, Sefama terre molestissima esse, plurimumque posse extenuare putatur: utpote, quæ multipliciori, crassiorique calamo, & numerosiore constat radice, quam milium*. Il medesimo appunto succede nella lacrima di Giobbe, che porta sotto terra vna gran quantità di radici lunghe assai più d'vn palmo, serpeggianti, e difficili da romperfi anche picgate, essendo come corda maneggeuole, & in tutto, e per tutto simili à quelle dell'Elleboro bi-

^l Pag. 116. de
tera 5.

co,

fig. LXVIII



Serapi. annuo.

co, piene di fibre ricciute; di colore che piega al gialliccio, e sopra terra s'erge, con vn grosso cespuglio di numerosi germogli vniti insieme, come quelli della canna florida, che crescono in altrettanti fusti inuestiti di foglie inuolte insieme, molto simili à quelle del miglio, e del Panico nostrano, mà però lisce (se bene l'istoria Lioneſe^m, le asserisce rigide al tatto, leggendouisi, *folijs tactu rigidis*) e senza pelo, di color verde scuro, & alquanto lucide, massime nel di sotto, con vn neruo bianco argentrino, che tutta nel di sotto la trascorre, e resta nell'altra parte incauato: di membrana sottile, segnate per il lungo di frequenti, e dritissime linee, ò venè, offeruate ancora nel Sesamo de gli Antichi, come notò chi chiamandole venenose diede materia al Ruellio di scriuere queste parole *u, venosa Sesame, & Trioni sanguinea*, cioè *folia*: presso la corona radicale s'allungano queste vn palmo incirca, e più sopra, sempre si fanno à proportion maggiore, di modo che arriuanò taluolta ad essere lunghe vn braccio, e larghe quasi due dita ristrette insieme, abbracciando ciascheduna da vn nodo all'altro tutto il caule, e nel rimanente piegandosi in fuori con vna macchia oscura trasuersale nel fondo: raccogliendosi dunque da ciò, che si è detto di queste foglie, che sono cannacee, come quelle de gl'altri frumentacci, conuengono mirabilmente con quelle del Sesamo antico, che tali furono accennate da Teofrasto; mentre dopo d'hauere collocato il Sesamo trà frumentacci, di questi così hebbe à dire, come l'espone Teodoro^o, *frumentacea etenim*, ò più tosto come io stimo *frumentacea folio arundinaceo constans*:

Aggiungasi che le foglie della lagrima di Giobbe; essendo verdi non si mangiano da animali, & io mi ricordo di hauerne più volte fatto porgere à varij giumenti, perciò non ne vollero gustare; anzi alcuni di loro, ch'erano Buoi, faceuano atto di volere ferire con le corna, chi loro porgeua simil herba, la quale proprietà fù notata anche da Teofrasto, che lasciò scritto, ò come tradusse Gaza: *Sesamum viridem nullum animal mandit*: Di che non credo ne sia causa l'amarrezza, che non è insigne in queste foglie, mà più tosto l'odore spiaceuole, che mandano; il quale per appunto è come quello de Sorci, ò delle trappole, che hanno seruito lungo tempo à pigliarne, la quale spiaceuolezza pare che sia accennata da Teofrasto nella proprietà, per cui dice, che le foglie del suo Sesamo si conoscono differenti da tutte le altre, scriuendo egli secondo il Gaza nel libro già citato q: *alia item neruata (foglia) alia sine neruo, & vena, Sesamum, & Erysimum discerni ab his sua proprietate cernantur*. Mà più chiaro ne parla il medesimo Teofrasto nel libro delle cause delle piante, come l'espone Teodoro, e fù di sopra notato nel trattato dell'Erisimo, *nonnulla etiam, dum tenera sunt, à nullo gustantur, sicca autem cibo idonea propterea sunt quia quantum in his amaritudinis, difficultatisque fuerit, percoctum excoctumque est so-*

m pag. 1174.
lib. 10. c. 52.

n lib. 7. cap. 3.
pag. 159.

o lib. 8. cap. 3.
pag. 159.

p lib. 8. cap. 7.
pag. 161. &
pag. 167.

q lib. 9. cap. 3.
pag. 159.

r lib. 1. c. 19.
pag. 181.

lis opera, *ut Sesama, ut Erysimum, hac enim viridia, tanq̃ à nullo animali videntur, propter amaritudinem, & grauitatem saporis, sed seccata, acceptiora euadunt*; il che s'osserva parimente nelle foglie della lagrima di Giobbe, che secche non hanno così cattiuo odore ne amarezza di sorte alcuna.

I fusti, che da ciascheduno de nominati germogli trasmettonsi, rottondi sì, mà in alcuna parte ineguali, crescono in altezza vn braccio, e mezzo, e taluolta due, come si è osservato nel mio horto, e s'ingrossano al doppio d' vna penna da seriuere, & alcuna volta più, e meno, con scorza sottile, e liscia, cospersa di materia farinosa, che nel maneggiarsi s'attacca alle mani, per la copia, e grossezza de quali ben corrisponde la pianta al Sefamo antico, à cui Teofrasto assegnò più numerosi, e più grossi gambi, che al miglio, come s'è di sopra notato; piegati che siano non si rompono, essendo della stessa natura della Radice tenace, e piegheuoile: sono pieni di midolla bianca, e spongosa, come quelli della ferula; onde ferulacci si possono con ragione chiamare, come fece il GAZZA in Teofrasto, che così lasciò scritto: *milion ex astiuis, & panico arundinaceus (culmus) Sesama, & Erysimum, potius ferulaceus*: quale Erisimo di Teofrasto con fusti ferulacci è il frumento Saracenicò, come s'è notato di sopra, e nel cap. antecedente, & il Ruelio¹, *Sesama in culmen ferulaceum fastigiatur, at milium, & panicum, in geniculatum, & concauum*.

Hanno cotesti gambi i nodi assai rari, come che lontani vno dall' altro circa vn palmo, e da ciaschedun nodo trasmettono altri fusti, ad vno, à due, e quando à tre insieme, i quali da ogni loro ginocchello producono simile prole, con che si rende non men folta, che fertile la pianta, mandando tutti fuori bona quantità di grani, di figura trà piramidale, e rotonda, ma da vna parte alquanto piani, della grossezza del cece bianco.

Nascono questi grani alcuna volta solitarij, tal'ora à due, e trè per ciascun ramicello, e qualche volta ancora, massime ne i fusti maggiori, à quattro, cinque, e sei insieme, & ancora più, secondo la bontà, e grossezza del Terreno. Nella quale copia di frutti per tutti i rami sono assai numerosi in questa pianta, onde può rauuissarsi la gran fertilità del Sefamo antico, che da Teofrasto per ciò fù posto di pari col miglio, dicendone, come portò il GAZZA n' il libro, e cap. già mentouato *In totum verò genus leguminum, fructus copiosus facundiusque profectus est: sed his feraciora profectò astiua, ut milium Sesama*: dalle quali parole, alcuni raccolgono, che il Sefamo di Teofrasto fusse trà legumi, mà come legge il mio Interprete, se si fa riflessione, che la parola *ἀστίνα* cioè *astiua*, è di più larga significazione, che la sua relatiua *ῥιζοπόνα* cioè *legumina*: contenendo quella sotto di sè non solo parte de' legumi, cioè estiuu, mà tutte le altre piante non leguminose, che si seminano d'estate, e fanno il frutto in breue tempo; si verrà

¹ Lib. 2. cap. 3.
pag. 159.

² Lib. 11. cap. 3.
pag. 427.

³ Lib. 2. cap. 3.
pag. 160.

verrà in chiaro, che Teofraſto non parlò iui del Sefamo, come di legume, mà ſolo come pianta eſtrea in comparatione de legumi; altrimenti biſog-
narebbe conchiudere, che anche il miglio fuſſe legume, parlandoſi iui
il Maeſtro come di pianta d'eguale fertilità, e di natura non diſſimile del
ſuo Sefamo, oltre di che il medefimo Autore, giuſta l'interpretatione
di detto Gazza, diuidendo i grani ne ſuoi primi generi, cioè ne' frumen-
tacei, e ne' legumi, ne conſtitui vn terzo genere differente da i due predet-
ti, & in queſto collocò il miglio, il panico, & il Sefamo.

*L. 3. cap. 2.
pag. 156.*

Ciaſcheduno di queſti frutti, ò grani vien ſoſtenuto da lungo, e com-
preſſo piedetto, e rieſce traforato per il lungo (onde molti ſe ne ſeruono
à giorni noſtri da fare corone da recitarſi) doue paſſa vn filamento con
due linguaette irſute, ch' eſcono dalla ſommità de' frutti, prima diritte, che
ſembrano due picciole corna di color bianco, i quali poi ſi contorciano in
varie guiſe, e preſto ſi ſeccano, e cadono; e con loro ſpunta nel medefimo
tempo, el uogo, vna ſpighetta, che s'allunga mezza oncia incirca, & al
più, che io habbia veduto vn' oncia, ſcagliosa, e piena di bottoncini lan-
ghetti, che paiono grani di frumento veſtiti di color verde, i quali, quando
la pianta è ſeminata preſto, ò nata di ſeme ſpontaneamente caduto l'an-
no precedente, s'approno in due parti circa il principio di Luglio, nel mag-
giore caldo del Sole, e laſciano vedere vn fiore compoſto di due fogliet-
te herbacee, entro ciaſcuna delle quali ve ne ſtanno altre due argentine,
di membrana ſottiliſſima, lucente, e traſparente, e queſte rinchiudono
trè apici gialli, per il lungo ſolecati, quali non poſſo paragonare meglio, che
à quei fiori, ò pure anche eſſi apici, che produce il frumento nel formare il
ſuo grano, poiche ancora queſti, aperte che ſono le due fogliette, cadono
ſimilmente per terra, non reſtandoci altro, che nel mezo del fiore vna pa-
letta picciola, ch' h'ha ſimilitudine d'vna perla, & in cima di queſte vn ſtame
lunghetto, bianco, che pare compoſto di midolla, il quale bipartendofi,
moſtra produrre due cornette varia mente, e ſenza ordine preſiſo contor-
te; ſi che per eſſere dunque, come s' è detto, cot'eſti fiori compoſti di fo-
glie, conuengono con quelli del Sefamo antico, di cui Teofraſto nel luo-
go ſopracitato ò così ne parlò; *Flos lanugineus, & milio, & panico, ſed Se-*
fama, atque Eriſimo, folijs conſtans.

*L. 3. cap. 3.
pag. 160.*

Cadute che ſiano queſte ſpighette de' fiori, vi rimangono i ſuoi frut-
ti, ò grani ſudetti, che prima di maturarſi hanno la ſcorza di color verde,
che vn poco gialleggia; mà perſettionati l' hanno oliuaſtra, variegata di
bianco, liſcia, lucida dentro, e fuori, e di ſoſtanza così dura, che ha dato
occaſione ad alcuni, come ſopra notai, di chiamare queſta piàta Litosper-
mo maggiore, e Canna litosperma: leuata queſta ſcorza legnoſa, anzi la-
pidea, trouaſi due tuniche, ò membrane bianche, e lucide, che circonda-

no vn

no vn seme; e tante spoglie offeruò parimente per cosa particolare Teofraſto, che nell'Iſtoria ne ſcriſſe: *alia magnopere circumſopra* (parla de' ſemi) *vt lupinum, atque etiam magis, & peculiarem in modum Sefama*. E molto prima già diſſe: *ſimili modo vaſculo inclufa*, & *nuda* (tratta parimente de' ſemi) *in vaſculo, vt papauer, quæque papaueri ſimilia: nam ſefama modus quidam peculiaris*, il che puòſi anche intendere per la uenmoſabile ſingolarità di queſti grani, che naſcono ſempre pertugiati per il lungo, e traſmettono per queſta cauità le ſpiche; queſte ſpoglie con gli altri purgamenti del Sefamo chiamauanſi *applauda*, come pure quelle del miglio; e del panico, delle quali Plinio ſcriue: *Mily, & panici, & ſefama purgamenta applaudem vocant alibi alijs nominibus*: il che notò anche il Ruelio con le medefime paroleſ, doue poco prima hauèua dato nome di vaſetto al ricettacolo de' ſemi del Sefamo; con dire: *alia vaſculis continentur vt Sefama*, cioè *ſemina*, & altroue *granum Sefama includitur vaſculis*: dal che non parmi in tutto lontana la pianta di cui ſi parla, ancorche Teofraſto nel luogo citato chiani più ſingolare la maniera di produrre i ſemi ne' ſuoi Sefami.

Suilupato da tutte le ſcorze ſudette il di lei ſeme rimane imperfettamente rotondo, groſſo, come vn cece roſſo, mà ſenza punta, e con vn largo, e profondo canale, che dalla baſe alla ſommità le paſſa da vna parte, con ſuperficie di colore di ruggine, e polpa candida (che me lo fa ſoſpettare il Sefamo bianco di cui Teofraſto diſſe: *nam & Sefama genus quoddam candidum datur*) dura, farinoſa, & inſieme oglioſa, e perciò habile non ſolo à farſene pane, mà à cauarfene oglio, come del Sefamo antico faceuaſi: la pinguedinoſità, oltra la durezza della ſcorza, è cauſa della molta duratione di queſto ſeme, che anche in ciò confronta col Sefamo di Teofraſto, che hebbe à dirne, *arborum ſemina his de cauſis, alia plus, alia minus perdurant: proximis ſerè cauſis, & frumenta ſeruantur, aut enim quod pluribus tunicis veſtiantur, ſeu milium, aut quod pingnia ſint, vt Sefamum*: in propoſito di che il medefimo Autore nello ſteſſo libro laſciò ſcritto k, *Omnium optimè reponuntur milium, Sefama, lupinum, cicer, milium, & panicum, quia tunica multiplici integuntur, & ſicca ſunt; Sefama quia pinguis; lupinum & cicer, quia amaritudinem quandam habent: quæ quidem qualitate ſeruare impune poſſunt, vt dictum eſt*: e nel cap. ſuſſequent parlando pur de' ſemi, *permanent incorrupta alia ſiccitate, quæ canchris diuturna eſt: alia puritate ſinceritateque ſua, vt alica; alia ſucci ſui natura poteſtateque naturali, vt cicer, lupinum, Sefama*: doue pure ſeruendo trà l'altre coſe per condimento dolce ne' cibi, il quale è il ſapore del ſeme della lagrima, che è non poco dolce, e cotto hà di più vn'odore molto grato. E certo, che il Sefamo antico fuſſe dolce, lo ſcriue Teofraſto medefimo, affermando dolciſſimo il bianco, che

c Lib. 8. cap. 5.
pag. 163.

d Lib. 1. ca. 18.
pag. 28.

e Lib. 1. ca. 10.
pag. 44. De
heramp.

f Lib. 1. ca. 11.
pag. 41.

g Lib. 2. ca. 19.
pag. 127.

h Lib. 8. cap. 5.
pag. 163.

i Lib. 4. cap. 1.
pag. 306.

k Cap. 16. pag.
113.

che forſi è la pianta di cui ſi tratta, dicendo *l candida inter omnia dulcedine præſtant, cecum eruum, & lens, & cicer, & faba, & ſefama*, e qui forſe manca qualche coſa nel teſto Greco come auerte l' Eccell. Lorenzo Legati, vno delli due Interpreti ſopranotati, *nàm, & ſefama genus quoddam candidum datur.*

Coltiuaſi in molti luoghi d' Italia, mà ſolo con nome di lagrime di Giobbe, e per farſene corone da recitarſi, non eſſendoli per anco penetrato dal volgo altro uſo di queſta pianta ſeminandoſi à tal fine alla Luna piena di Marzo, in luogo graſſo ſpunta in quindici giorni in circa, tranſmettendo vna foglia chiuſa come i cannacei: altri la ſeminano più tardi affai, e ne colgono i frutti maturi verſo il fine di Luglio, ò poco dopo, ſecondo, che hà hauuto il tempo fauoreuole, & à primi freddi ſi ſecca; onde apparifce, che queſta è pianta eſtiua, come in molti luoghi moſtra eſſere il ſuo ſefamo Teoſtaſto, dicendo ch'egli naſceua, e maturauaſi in quaranta giorni, e tallhora meno, come il miglio, & il panico ^m, *Milium, & ſefamum, & Panicum, & ad ſummum omnia æſtina diebus quadraginta opus habere muſi fatentur, non tamen deſunt, qui, & pauciores prodidere.*

Trouaſi à noſtri giorni queſto ſefamo copioſo nella Candia, in Rodi, e nella Soria, come riferiſce il Lobelio ne gli Aduerſarij ⁿ, oue lo figura, e deſcriue con nome di Litoſpermo maggiore; ne poſgo ancor io qui al Lettore l' Imagine con figura migliore di quello, ch'io m' habbia viſto effigiato appreſſo ad altri, ma ben sì con nome da quelli diuerſo, nel che pure mirabilmete concorda con il ſefamo degl' antichi, che coltiuaſi per tutta la Grecia, e parimente per la Soria, e Cilicia, come notò il Columella ſcriuèdone; *ſed hoc quidem ſemē Cilicie Siriaque regionibus ipſe vidi meſe Iunio, Iulioq; conſeri, & per Autumnū cū maturauerit tolli*: e ſe preſſo di noi non ſi ſemina coſì tardi, come queſto di Columella, nõ perciò ne ſegue la diuerſità delle piante, auuèga che da pochiffimi, & in poca quantità hoggi ſi coltiua, non ad uſo di biada, mà ſolo per bellezza, e per ſeruirſene à far corone come ſi diſſe, e ſe ne' noſtri paefi nõ matura il ſeme in quaranta giorni ſoli, dopo che è ſeminato, come ſcriue del ſuo ſefamo Teoſtaſto, e cõ eſſo lui Plinio, nõ è marauiglia, perche ne meno il ſefamo de gl' Antichi naſceua, e perfeſſionauaſi in ogni luogo nel medefimo ſpatio di tẽpo, come accenna Columella nel luogo citato; oltre di che la diuerſità del Clima può eſſere cagione di ciò, eſſendol' Italia, maſſime la Lombardia molto men calda della Grecia, in cui faceua le ſue oſſeruazioni Teoſtaſto, che à queſto propoſito ſcriue, *p diſſert, & terra à terra, & calum à celo ad fructuum perfectionem.*

Il Ceſalpino fù di parere, che queſta pianta ſi propagaffe più di propagini che di ſeme, ſcriuendone *propagatur ſobole potius quàm ſemine*: e la cagione ſi fù, che hauendo trouata ſterile la di lei ſpica, ſtimò che non faceſſe

1 Lib. 9. cap. 5.
pag. 163.

m Lib. 9. ca. 3.
pag. 156.

n pag. 16.

p Lib. 5. cap. 3.
pag. 158.

q Lib. 4. c. 15.
pag. 151.

se altro seme; onde ne haueua prima notato, *flores tantum, az fructum non habet*: mà la verità si è, che nasce di seme, come del suo Sefamo afferma. Teofrasto, dicendo, come notò Cesare Odone sopra il medesimo, *generatio simplex, & una est, quippe ex semine tantum exit, ut panicum, milium*. E se il Cefalpino hauesse aperto vno di quei globi, ò bacche legnose, e traforate, ch'ella porta, mature però, vi hauerebbe trouato dentro vn seme ben grosso, e grasso insieme.

Come si possa pilare, lo scrisse Magone al riferire di Plinio^f, che così ne notò il di lui parere. *Sesamum in calida maceratum exporrigi: deinde confricari, frigida immergi, ut palea fluat, iterumque exporrigi in sole super linsea, quod nisi festinato peragatur, lurido colore mucescere*: così come se ne possi cauare l'oglio l'insegna Giouanni figliuolo di Mesuè^g, secondo la censura de' PP. Osseruanti espositori di quello nel Ricettario, *Oleum de granis Sesami. Modus compositionis eius est sicut olei de amygdalis, praterquam oportet, ut grana Sesami alio modo excorticentur: qui modus talis est; mundetur Sesamum ab omnibus immunditijs, deinde roretur ipsum aqua cum sale pauco, & confricetur manibus. Deinde affetur assatione modica, & ponatur in sacculo panni asperi, & fricetur multum, donec excorticetur: deinde mundetur à corticibus, & moletur cum molis, & fiat abrachine*, che s'interpreta massa, ò pastone, come espongono i suderti PP.^h & de cetero trahatur oleum sicut de amygdalis, & quandoque trahitur oleum praterquam excorietur, & eius operatio est, ut affetur primo Sesamum, deinde moletur, & fiat abrachine, & trahatur oleum sicut diximus: quasi lo stesso, mà più breuemente scrisse ancora Paolo Egineta^b, *Sesaminum oleum*, dice egli, *fit contusus, & leuigatis Sesamis, expressisque per fiscellas in cochleis, oleo ipso, seu in aqua calida segregato, vasisque vireis reposito*: se dunque per cauarsi quest'oglio era necessario che s'amaccassero, e scorzassero, ò si abbrustolissero i semi del Sefamo, bisognaua, che fossero vestiti di scorza molto dura, la quale per appunto trouandosi ne' semi della lagrima, m'accresce le ragioni d'affirmar la specie di Sefamo, anzi al mio parere il vero Sefamo di questo Autore.

E perche, come sopra scrissi con il Lobelio, prouiene in abbondanza questa pianta in Soria, chi sà, che non vi fusse introdotta, massime trouandosi iui vna specie di lagrima di bacche molto più grandi delle nostre, e forsi è questo vno de' due Sefami, come nel seguente trattato si mostra, e poi comunicata all'altre Prouincie di quà poste, portataui dall'India Orientale è per conuenire anche in ciò col Sefamo de' l'antichi, di cui Plinio^c *Sesamum ab Indis venit, & ex eo oleum faciunt, color eius candidus, come pure è ne' semi della lagrima^d, reliquos vinum ut Indos ex palmis exprimere, Sesama oleum; & altroue^e parlando pure dell'oglio: Indi ex castaneis, & Sefamo atque ariza facere dicuntur*. E pure è più dura, e più secca di so-

Ranza

^f Pag. 214. lin. 8.

^g Lib. 18. c. 106. Balicamp.

^h Pag. 73.

^b Cap. 405.

^a Pag. 186.

^b Lib. 7. ca. 10. pa. 190. m. fol. 1. & 1. 2. 900. 10. guaris.

^c Lib. 2. ca. 10. pag. 148. Dancamp.

^d Lib. 2. ca. 12. pag. 128.

^e Lib. 15. ca. 7. pag. 336.

stanza la polpa del riso, che quella del mio Sefamo per cauarne oglio, & il Ruelio seguendo Plinio, *Sesamum venit ab Indis, ex qua oleum conficiunt;* onde il Bodeo Istinò, che il nome del Sefamo, fusse deriuato da linguaggio Indiano, quando non fusse d' origine Egitia, ò di Soria, *vel nomen Sesamum,* scriue egli nel commentario sopra l' istoria di Teofrasto; *accepit ab Aegyptijs Sirijsue, fortè ab Indis.* Comunque siasi dalla Soria, ò dall' Egitto, è probabile che fosse introdotto il Sefamo nella Grecia, e nell' Italia, nostra doue fortè coltura così commune, che d' anno in anno seminauasi, come gl' altri frumentacci abbondantissimamente, perche era molto in vso per l' oglio, che se ne cauaua, sì per le virtù medicinali, come per il condimento de' cibi, e massime del pane, sopra di cui spruzzauasi per renderlo dolce; onde il Ruelio scrisse, *condendis panibus nonnunquam inspergitur:* se ne faceuano anche focaccine col miele, come attestò il medesimo Ruelio, hauèdo poco prima detto, *melli crudo permiscetur, ut in placentas concreascet, quæ Græcis sesamidem appellantur:* taluolta ancora se ne faceua pane, massime nell' Oriente, per testimonio del medesimo Ruelio, che poco doppo disse: *nullus Orienti frequentior cibus quàm Sesami, quamuis sequacis sit lentizæ & oleagimi liquoris.* In proposito di che Galeno, secondo Andrea Lacuna i disse, *Sesami semen pingue est, ideoquè repositum, celerimè fit oleum;* quamobrem eos qui ipso vescuntur, celeriter replet, stomachumque subuertit, ac tardè conuocatur, pingueque corpori præbet alimentum &c. E forse cominciò à tralasciarsi nell' Italia la coltura di questa pianta per lo smagrimento ch' ella faceua della terra, e per la difficoltà di cauare l' oglio, e per la copia de' gli oliueti, che somministrano oglio più facile à cauarsi, che quello del Sefamo, & in grande abbondanza. V'aggiunge Marcello Virgilio l' vso del miele, e del zucchero, che subreptando per condimento de' cibi, hà fatto trascurarsi il Sefamo. *Neglexit,* dice egli, *ut credimus Italia Sesamum ob olei ex oliuetis copiam, quam semper habuit, & ex quo inceperunt homines, in delicijs vite, mel, & saccharum habere, eoquè ad dulciaria uti.* Quindi non è marauiglia, se con la pianta, se ne sia anche perduta la cognitione, & in lungo tratto di tempo sustituitogli il Miagro d' Egitto, chiamato oggidì impropriamente Sefamo come nel cap. del Miagro di questo loco si scriue legume, che per portare oglio non dissimile da quello del Sefamo antico, fù chiamato impropriamente Sefamo da moderni, nome, che non bene se le addatta, per le ragioni addotte à suo luogo.

Se dunque per tante proue la lagrima di Giobbe è vn Sefamo, potiamo concludere hauere ella le virtù da Dioscoride attribuite al suo; cioè, che fattone empiastro risolue le grossezze de' nerui, gioua alle contusioni, & infiammationi delle orecchie, alle scottature, à dolori colici, & à morfi delle ceraste, che vnto con oglio di rose mitighi i dolori del capo cagiona-

l. lib. 2. ca. 29.
pag. 427.

l. lib. 8. cap. 3.
pag. 340.

l. lib. 2. ca. 29.
pag. 428. de
natura Simplic.

l. lib. 1. pa. 372
delli sesamo.

l. lib. 1. ca. 90.
pag. 238.

ti dal feruore del Sole; il che s'intende non solo del seme, mà della pianta ancora cotta nel vino, la quale vale etiamdio alle infiammationi, e dolori degli occhi.

Oltre il Cefalpio, il Lobelio è l'Autore dell'Istoria Botanica di Lione sopracitati, il Trago^l, il Gesnero nell'horto^m, e nell' enumeratione Alfabeticaⁿ, il Dodoneo^o, il Lobellio nelle Osseruazioni^p, Gio: Bauino nell'Istoria^q, e Gasparo Bauino nella Pinace^r, Castor Durante^s, come altri, che per breuità tralascio, trattarono di questa pianta sotto altri nomi à semplicità ben noti, mà non mai sotto à questo suo proprio nome di Sefamo.

l Pag. 916.
m Pag. 103.
n Pag. 113.
o Pomp. 4. lib.
1. cap. 24.
p Lib. 6. ca. 37.
q Lib. 18. r. 46.
r Pag. 218.
s Pag. 126.

Sefamo Annuo Indiano, forsi il Sefamo secondo di Teofrasto. Cap. 94.



h Lib. 6. ca. 56.
pag. 152. del
1658.

E da ciò, che si è detto della lagrima di Giobbe nostra apparisce essere ella vn Sefamo; col medesimo nome, posso chiamare con ragione vna pianta dello stesso genere. Nasce questa nell' India Orientale, e con nome di miglio del Sole, ò Litospermo Indico, (nomi à queste due piante al mio parere impropri) vien figurata, mà nõ descritta da Giacomo Bonzio^a, nell' Istoria naturale, e medica di quei paesi, stampata in Amsterdam con l'Istoria consimile di Guglielmo Pisone, per essere ella ne' fiori, nel caule, e nelle foglie simile alla nostra, mà porta le bacche molto maggiori, e dure come pietra, con dentro il seme farinoso, e buono da mangiarsi.

Chiamasi in lingua Portoghese *Herba de Rosarios*, perche in alcuni luoghi non altrimenti, che forsi della nostra, se ne serouono le donne pouere da fare corone da recitarsi, anzi come nota l' Autore sudetto, ne fanno parimente delle collane, che vsano in vece di quelle d'oro, costumato solo appresso i più ricchi: e questo io lo crederei vno delli due Sefami di questo Autore, cioè di Teofrasto.



Sesamo Perenne Indiano, pianta Frumentacea,
e specie di Sesamo. Cap. 95.

Fig. 69.



Itrouandomi fino dell'anno 1656. in Toscana col Sig. Alessandro Balam in ricerca di piante per quelle parti alpestre, e marittime, passassimo dal monte di S. Giuliano, oue trouassimo molte herbe singolari; indi peruenuti à Lucca, e qui con la scorta dell' Eccell. Sig. Lodouico Breni Dottor di Filosofia, e medicina, intenditissimo della materia herbaria, oltre alle cose più cospicue della Città, offeruassimo varij giardini, & in particolare quello de' RR. PP. Capuccini, nel quale trà molte piante peregrine trouassimo questa, che prendo à descriuere per Sesamo perenne, iui nata di seme, portato da alcuni Padri di quella Sacra Religione dall'Indie con nome di Gramigna Indiana, che poi d'alcuni Intelligenti della professione, come nel fine di questa si scriue fù chiamato frumento Indiano di spica articolata.

Di questa trasmissione bona quantità à Bologna, la trapiantai nel mio orto, e nel Publico ancora, doue trouatosi l'aria confaceuole, moltiplicò felicemente senza tema alcuna dell' Inuerno, che non punto nocendole, q̃i crebbe in altezza di trè braccia, e più, massime quando si ritroua in terreno grasso, e luogo humido: la sua radice è vnica perpetua; che assai si profonda; porta nel contorno di lei, e nella superficie della terra molti germogli, che le fanno corona, e riescono in tanti diritti, & eguali al numero di trè, ò quattro, e taluolta cinque vniti insieme; nel loro principio, à modo di quelli dell' Iride, e dell' Acoro vero, e falso (quale direi essere più tosto Iride palustre, che Acoro falso per non essere specie alcuna di questo, & altre piante simili) manda fuori ciascuna di queste radici maggiori vn fusto grosso più d'vna penna da scriuere tutto di foglie vestito fino alla metà della pianta, e nel rimanente scoperto, di forma piana, che tond'ggra, mà senza coste, verde di sopra, e di sotto lucido, somigliantissimo per di fuori à quelli della Canna, e che di dentro è pieno di materia spongosa, come quella de gambi della Ferula, e del Sorgo ancora, chiamato dal volgo Melichea, quale dal Trago nell'Istoria (ch'io non direi) per Panigo di Dioscoride, e di Plinio fù proposta.

Portano li fusti di questo mio Sesamo i nodi molto grossi, e rari, di maniera che nelle parti da basso sono distanti l'vn dall'altro più di quattro dita, e maggiormente più sopra, e gli vltimi, che sostentano le spiche sono


2 Lih. 1. ca. 30.
pag. 619. &
660.

no alle volte lunghi vn braccio, che piegati si rompono, e stropicciati rendono sugo acqueo.

Le foglie di questa pianta verso la Radice sono lunghe vn braccio, e tal volta arriuanò a due, della larghezza, che s'esprime à parte nella figura: e per lo spatio di due oncie abbracciano quasi tutto il caule: le altre più interne sono men lunghe, e disposte, come quelle del Gladiolo, ò più tosto della Canna volgare, alle quali sono simili, e tanto frangibili, che alquanto piegate si rompono con stridore, come se fossero di vetro, ristrette nella cima come quelle della palma, e mostransi per il lungo piegate, e tutte vergate di linee poco apparenti di fuori, mà più euidenti di dentro, con vn neruo, che le solca nel mezzo per il lungo rileuato, verde di fuori, e biancheggiante di dentro: nella qual parte le foglie riescono ruide, come quelle dell'orzo per cagione de peli frequenti, che le inuestono, riuolte all'insù. Così pure nel contorno sono aspre, e quasi taglienti, mà però senza dentatura alcuna.

Durante il loro verde queste foglie per hauere sapore di canna, non sono in tutto inabili al cibo de gli animali, non hauendo grauezza d'odore, ò amarezza, come le foglie del Sesamo precedente, il che si proua, che questa pianta non sia il Sesamo comune de gli antichi, non toglie almeno, che non le sia congenere, ò specie del medesimo à certi tempi poi, massime nel l'Autunno: cangiano queste foglie il loro verde in rossigno, che tal'ora è così carico, che le fa parere sanguinose.

Nel furore del crescere, i fusti di questa pianta mandano fuori le loro spiche, vna, ò due, e tal'ora trè per ciascheduno, anzi alcuna volta se ne vedono quattro, ò cinque sopra vno stesso nodo, di lunghezza d'vna spanna incirca, di forma quasi triangolare, composte di squame, come si mostra à parte nel rame, e trà ciascheduna di queste squame, del mese di Giugno spuntano due linguette lanuginose, simili à quelle del primo Sesamo antecedente, mà del colore della lacca del Verzino: e doppo queste dello stesso mese, & anche del seguente per ogni diuisione della spica, nascono fiori composti d'vn ricettacolo herbaceo, che figura vn grano di formento vestito, e contiene trè, ò quattro fogliette bianche, & argentine alquanto lunghe, distinte con altrettanti stami del medesimo colore, sottilissimi, che sostentano apici gialli scuri, molto grandi à proportion de eid, che li sostiene, i quali apici poco dopo si seccano, e cadono; e per il loro colore fanno sembrare rosseggiante la spica di lontano veduta, ancorche per altro verde in quel tempo: Contornano questi fiori l'ordine ineguale de grani, che ascende per il mezzo della spiga, composto d'articoli commessi insieme, che separati hanno forma di denti senza radice: ogni articolo inferiore della spiga nella base hà due cavità, come due oechietti, il che



come ben nell'Imagie s' offerua, che opposti s'incontrano l'un l'altro, di modo, che se il primo Sefamo precedente è pertugiato per il lungo, questo è traforato per il trauerso.

Il seme contienfi in vn ricettacolo piramidale, duro, e di colore di canna secca di fuori, & argentino di dentro, abbracciato da trè lati, da vna spoglia grossa parimente di colore di canna secca di sopra, e qualche volta anche di sotto, profondamente incauata. Liberato da questi inuogli, trouasi vestito d' vna membrana bianca, che piega nel giallo: sciolto poi dall' vltima tunica mentionata, questo seme conserua la figura piramidale, con sostanza, che fresca è simile di color à quella de pistacchi mordi, e secca piega nel bianco, molto ogliosa, e che però assai corrisponde al Sefamo de gli antichi, tanto celebrato per la copia dell' oglio, che ne cauauano.

Reggesi questa pianta con vna sola radice, che molto si profonda, stendendosi poi dalla corona di essa, mà che non derogano alla di lei vnità, alcuni capillamenti ondeggianti, e lunghi tal volta vna spanna, e più, duri, e fibrosi con midolla rotonda, lunga, e dura, sì che sembra vn filo di rame: nel resto questa radice essendo lucida, con frequenti annellature, piena d'occhietti, che s' approno in nuoui germogli, che s' allargano, e portano nouelle piante sopra terra nel contorno della radice maggiore, imita molto quelle della Canna volgare, se non che in ogni parte minore; densa però, e difficile da rompersi, e che rotta si troua piena di sostanza, sfilacchiosa, e senza midolla, di colore cauilino, che piega al fosco, & à luogo à luogo in tutto oscuro: conseruasi viuua non solo la radice, ma ancora le foglie ne maggiori freddi dell' Inuernata, massime quanto è riposta, & inuasata la pianta, come altroue si scriffe; onde costituisce la sua pianta perenne, che perciò non hà bisogno di propagarsi di semente: ben che caduto in terra nasce ancora facilmente in questo clima: quindi non può chiamarsi propriamente biada estiuua, come era quella di Teofrasto, ^{a Lib. 8. c. 1. 30.} che disse, che il suo Sefamo nasceua, e maturauasi in quaranta giorni, ^{118. nel Gaz. 1. 1.} tal hora in meno, come il miglio, & il panico: il che se proua che questa pianta non sia il Sefamo di quel Filosofo, e d' altri Antichi, non toglie almeno, ch' ella non sia vna specie di Sefamo, addattandoselo à marauiglia nelle fattezze, come si è fino hora mostrato, e si mostrerà d' auantaggio; impero che questa radice ama, come sopra notai, i terreni grassi, per tirarne l' humidità pinguedinosa, & alimentarne à sufficienza i molti calami, o gambi, che essa nodrisce, e porta.

Fu questa pianta, come sopra si scriue, portata dall' Indie, oue è fama, che prouenga in abbondanza; & in questo pure concorda col Sefamo antico, di cui Plinio ^{b Sefamum ab Indis venit, & ex eo oleum faciunt: quale} oglio,

^{b Lib. 18. cap. 10. Delectamp pag. 448.}

oglio, come si cauasse lo insegnano Paolo Egineta, e Mesue, citati nel capitolo precedente: oltre l'essere originaria dell' India, & habile à cauarsene ooglio, questa mia biada, può ridursi in farina, e farlene pane assai saporito, come del Sefamo de gli Antichi faceuasi: il che pure aggiunto alle ragioni portate, serue di non leggiere congettura per crederla specie di Sefamo.

Trà gli Antichi, ne trà moderni, non trouo, chi ne faccia mentione, se non l'Autore dell' Iudice delle piante dell' horto Regio Blesense registrandolo iui, con nome di Formento Indico perenne di spica articolata: & il nostro Eccellentiss. Sig. Giacinto Ambrosini publico professore de' Semplici in questa Città, che hauuto dal mio giardino lo propose contra tre figure nella sua Fitologia, e descriue ^d nominandolo prima Frumento Indico perenne di spica lunghissima articolata, e poi Gramigna digitata Indiana, di spica articolata. Notasi parimente questa pianta dall' Eccell. Roberto Morison Medico, e Professore Botanico del Sereniss. Carlo Secondo Rè d.lla Gran Bretagna, & circa ne suoi preludi herbacei, che nominandola col sopranotato nome di frumento di spica articolata così la propose *Frumentum Indicum, spica articulata radice perenni Spicam longam semidipalem per articulos, semi runciales aut runciales, dispositam gerit, qua sola nota (iuncta duracione) facile cognoscitur.*

Siderite di Persia odorata . Cap. 96.

Fig. 70



Are veramente questa pianta, essere la stessa con la Siderite Mospeliense descritta, e figurata con due Imagini nell' Istoria di Lione con nome ancora di Parietaria del Cordo, e di genere di Siderite per essere di foglie, e di rami nella medesima maniera disposti, creduta iui impropriamente esser l' Othonna di Dioscoride,

essendosi à bastanza à suo luogo fatta conoscere in questo volume, però se il Lettore osseruara bene ciò, che ne scriue la detta Istoria, e lo confronti, con la seguente descrizione conoscerà facilmente essere queste due piante diuerse l'vna da l'altra.

Mi nacque molt'anni sono da semi venuti di Persia, e porta vn gran cespo di foglie sopra al terreno distese, delle quali le maggiori sono della lunghezza d'vn palmo, e più ancora, e larghe circa tre dita per il trauerso, di sostanza sode, cartilaginose, nel contorno gentilmente dentate con denti duri, e quasi pungenti, nel di sopra sono queste foglie di color verde,

Fig LXX



Sideritis odorata St. Peter's Wort

verde, che nel di sotto biancheggiano, anzi candicanti, tra scorfe da neruature rileuate, e vn poco crespe di sostanza dure, come se fossero di rame, d'ottone fillato; piegate che siano queste foglie non si rompono, mà tornano nel loro stato primiero; stropicciate, e contuse rendono odore aromatico, e resinoso.

Sono queste molto grandi, anzi rispetto alle altre Siderite grandissime, e maggiori ancora di quello, che à parte si rappresenta nell' *Imagine*; essendo assai somiglianti à certa pianta chiamata dall' *Anguillara* ^{b Parre 12. pag. 225.} *Mentia Saracenisa*, e Costo hortente di Cassiano basso, & herba di Santa Maria, e da altri, benchè impropriamente per specie di *Chrisocome* ^{c Lab. 1.1. pag. 163.} creduta, e dal *Trago*; mà con errore fù per *Alisma* di Dioscoride figurata, e descritta, queste però della pianta, che qui si descrive, sono più strette, e più lunghe, e d'odore assai meno graue, e di sostanza più dure, e più cartilaginose. Vengono queste sostetate da gâbocelli larghi, massime nella parte oue si congiungono al nodo, in modo che tutto l'abbracciano, e sono di forma quadrangolare lanuginosi, anzi pelosi, & à luogo à luogo rossigni, qualità che s'aspettano alle Sideriti; gustate le foglie lasciano vn certo sapore vn poco mordente, & acuto, misto però con gran siccità.

Da questo cespo di foglie nasce quantità grande di fusti quadrati, e solcati, dal mezzo in sù sanguigni, e nell' altra parte inferiore di colore verde, che biancheggia, alti due cubiti, e grossi circa ad vn quarto d'oncia, e più ancora, massime i maggiori, ondeggianti, di sostanza soda, e dura, che piegati però non si rompono, pieni di midolla bianca, circondata da fortile portione legnosa mà soda, come sono le neruature sopranotate, la quale portione è coperta di due scorze, che l'vna dall' altra difficilmente si leuano; portano rari nodi pure rosseggianti, da quali oltre le foglie accennate, escono altri fusti fogliosi, che molto infoltiscono la pianta, benchè le foglie siano minori, e senza piedetti congiunte al medesimo caule.

Ciascuno poi di questi fusti tanto maggiori come minori portano ne' nodi verticili circondati d'vncini molto irfuti, & inareati, di sostanza sode, lûghetti, e nellepûte acuti, nel mezzo de quali oltre le foglie nascono molti ricettacoli quadrati solcati, e nella cima contornati da cinque denti acuti pungenti, & irfuti, e da ciascun di questi nasce circa il fine di Giugno vn fiore galeato, assai grande, come nell' *Imagine* si figura simile à quello della saluia volgare, nell' interno di colore rosso, che tende al violaceo, è di fuori bianchiccio, vn poco lanuginoso, con la bocca aperta, con due ali tondeggianti nel di sotto, vna per parte, & il labro superiore finisce in punta, nel di cui mezzo escono molti stami bianchi, con vn apice nero in capo trapassato da vn filo bianco, che procede dalla parte interna del ricettacolo. Si moltiplicano questi fiori in ogni parte de' rami, eccetto che

A a

nelle

nelle cime de fusti, oue soprafedono le sole foglie, come ben s' offerua nell' Imagine .

Seccato, che sia questo fiore rimane ne' ricettacoli, ne' mesi di Settebre, & Ottobre, vn seme di forma ouato, con vna solcatura per il lungo, e sono vn poco più accuti da vna parte, che dall'altra, di colore rosseggianti, che giusto rappresenta la forma d'vn stercio di Toppo grosso. La sua radice è molto lunga, arendeuoale, e si diuide in più radici, quali nel profundarsi maggiormente si diuidono, e si moltiplicano in altre radici minori, il suo colore è ferrugineo, e contienell' interno anima bianca, gustata lascia sapore astringente misto con siccità.

d. Lib. 4. ca. 33.
pag. 400.

Dioscoride, secondo la traduzione di Marcello 4, trattando di tre sorti di Siderite, benché questa non sia alcune di quelle, nientedimeno per essere di sapore non ingrato, e lascia nel palato molta siccità, & astringenza, non mi pare sconueniente, che possi questa stagnare il sangue delle ferite, e mitigare le loro inflammationi, come Dioscoride notò nel suddetto capitolo delle sue Sideriti, tanto più, che s' offerua in questa pianta l'essere, come sopra si è descritto, li nodi, e li fusti in parte sanguigni, onde io crederei, (benché per la rarità della pianta, che poco in questo mio horro vi è durata, non se ne sia fatta esperienza,) ch' ella sia di simil virtù, e rimedio certissimo in tali mali, stante che da se stessa con segni così euidenti la pianta lo dimostra.

Siderite Cretica viscosa con odore di Bitume.

Cap. 97.

Fig. 71




a pag. 459.

Insemi il seme di questa pianta sotto nome di Stachi spinoso Cretico, che figura, e descrive il Clusio nelle aggiunte alla sua Istoria 4, ma che sij poi la stessa del sudetto, chiaramente dalle di lei fattezze si conosce; poichè quella del Clusio è pianta lanuginosa, spinosa, e senza odore, e questa, di cui si discorre, non ha spine di forte alcuna, anzi tutti al contrario dello Stachi rende vn' odore graue, e porta foglie dentate, e senza lanugine alcuna, qualità tanto contrarie l'vna dall'altra, ch'io stimo più tosto vna specie di Siderite, che di Stachi, ne faccio difficoltà alcuna il proporla per tale.

fig. LXXX

Siderite di Candia con odor di Biume



Kanadi

Bulilla

La sua altezza è quella, che s'offerua nell' Imagine oue tutta la pianta è ritratta nel suo naturale; il caule maggiore nel fondo tondeggia, e più in sù diuenta quadrato, diritto, fodo, che piegato si rompe con stridore, la sua midolla è bianca, e la scorza è verde, difficile da leuarsi dalla parte legnosa, i nodi sono rari, da ciaschedun de quali nascono foghe, e fusti minori come nella figura si dimostra.

Queste foglie, massime le prime, che procedono immediate dalla Radice, e che nel cesto da basso contornano il caule, sono di forma oblunga, dal mezzo in sù dentate, e raramente solcate, con diuerse diramazioni, che nel di sotto vn poco si rileuano, della stessa grandezza, che s'offerua nel disegno, e sono di sostanza durette al tatto, viscoso, quasi nel modo che sono le foglie della volgare Glicirrhiza, di colore verde, che alquanto gialleggia, e simili a quelle della Siderite quarta, che figura, e descriue il Clusio nella sua Istoria^b, eccetto che quelle sono più bianche, e più tenue, e senza odore: ciascun nodo de fusti ne porta due, trà di se opposte, con poco, o niente di piedicciuolo al caule congiunte, lunghe, strette, e senza dentatura, ne incisione alcuna; quelle dell' altro nodo sono riuolte in contraria parte, seguitando così alternatiuamente fin alla cima: Frà questi nodi, e foglie del fusto maggiore nascono vna gran quantità di fusti, e foglie minori, che assai infoltiscono la pianta.

Giunti, che sono quei fusti verso il fine del mese di Giugno massime gli più alti, tramandano certi ricettacoli apportatori del fiore, non già nel modo delle altre siderite, che contornano tutto il caule, ma ben si ad vn solo per ciaschedun nodo, come nell' Imagine s' offerua, i quali prima d' aprirsi del tutto si mostrano d' vn colore giallo, che poscia, aperti si tramuta in bianco, consistendo ciascuno d' essi in due fogliette breui, tondeggianti, poste vna incontro l'altra, & vn'altra terza piegata all'ingiù, larga con tre incisure, & vna linea solcata, che per il mezzo tutta la scorre. Dalla bocca di questi fiori forgono alcuni stami bianchi con apici morelli, che gli rendono molto vaghi, e caduti che sono rimane ne' ricettacoli vn seme oblungo, più grosso in vna parte, che nell' altra, di colore scuro, e quasi nero, che visto col microscopio si mostra vn poco alato, e frà queste alette scauo, e nel mezzo à dette escauature vn poco rilegato; si che si conosce chiaramente che questa pianta altro non è ch' vna sorte di Siderite per la gran similitudine che hà col seme della Siderite con foglia d' Hifopo, descritta dal sopranotato Clusio, eccetto che nel colore, si che si rende quasi vniforme con quello di questa pianta.

La radice è sottile, ondosa, e biancheggianti, di scorza che si leua facilmente dall' anima, la quale è molto legnosa: gustata rende sapore acuto, & acre, mà quello delle foglie amareggia, e spira odore graue, acu-

co, e penetratiuo, simile à quello del Bitume Iudaico, e à quello della comune, e volgare Sclarea, perciò d'alcuni saggi simplicisti è stata chiamata Siderite con odore di Sclarea.

E pianta perenne; però in questo nostro clima Bolognese poco durabile.

Auiene à questa pianta come fa alla Menta Gattaria, Maro, Valeriana, & altre simili piante odorate, le quali sono tanto da gatti molestate, che con le loro persecutioni, ò carezze che siano, l'hanno fatto perire, molte volte senza hauerne ne meno potuto raccogliere li semi. E' pianta, che dura più anni.

Sisembro Alpino Rotondifoglio.

Cap. 99.

Fig. 72



VI Cimone Stato di Modena, in luogo detto la Nuda, che sono pascoli della Comunità Fanano, lungo il margine d'vna sorgente freddissima, trouai del 1640. questo Sisembro serpeggiante, in sito oue godeua à pari l'acqua, & il terreno, per la qual causa gl'imposi il nome di Palustre. Da Pastori di quei contorni vien chiamata questa pianta, impropriamente però, Baccara, come parimente quel fonte vicino, oue ella nasce; si chiama il fonte della Baccàra, non so se si deue questo suo nome alla pianta, ouero la pianta il suo al fonte, mà hauendo bene rauuifate le sue facoltà, e trouato li suoi sapori simili à quelli del Sisembro aquatico, risolsi di chiamarlo Sisembro Alpino Rotondifoglio, Palustre, Serpeggiante più tosto, che Baccara.

S'estendono le radici di questa pianta nella superficie dell'acquoso terreno, incatenandosi nella maniera, che fanno quelle del Polygonoto volgare, stimato dal Brunfelsio a il sigillo di Salomone, e maggiormente ancora con quelle del Lilio Conuallio, detto dal Fuchsio ^b Efemero non letale. La forma loro è tondeggiente, al tatto dure, e piene d'occhietti, e tubercoletti aspri, ruuidi, e quasi spinosi, di scorza grossa, difficile da leuarsi dall'anima, piene per ogni parte, di radichette minori, e fibrose. Le radiche maggiori, sono verdi, grosse come vna penna da scriuere, l'altre bianchiccie, che sembrano capelli canuti, e le terze sono di colore oscuro.

Da queste verdi, & incatenate radici pullulano molti cespi di foglie di varia grandezza, di forma poco meno, che rotonda, ondeggianti, & à luogo

a Pag. 93.
b Pag. 140.

fig. DCCII.



Sisymbra Alpina palustre

di foglia rotonda

luogo, à luogo scauante, e quasi dentate, di sostanza crassette, e cartilaginee, lisce, tenere, & vn poco lucide, massime le nouelle; sono ancora trascorse da molti neruetti, che nel di sotto le lasciano solcate, cosa non più offeruata in altra pianta da me di forma assai somigliante a quelle della seconda Sanicula montana, che figura, e descrive il Clusio nell'Istoria^c, ò sia; come vuole il Lobellio nelle Imagini, e nell'Aduersarij^d, il Geo Alpino con foglie hederatee da Moderni, eccetto però, che quelle della mia pianta, non sono mai appuntite, ne con tale dentatura contornate, sono ancora sostenute da vn gambo sottilmente solcato, di sostanza sodo, e crasso, ma succoso, e che piegato si rompe, restando solo intiero vn certo filo liscio, e neruoso.

Parte di questi cespi di foglie maggiori portano vn fusto alto più d'vna spanna, di sostanza densa, herbacea, e succosa, non molto grossi, vicino à terra, coloriti d'vn verde, che biancheggia, ma sono verso le cime più scuri: le foglie sono simili all'altre, con briue piedino però alternatiuamente al caule annesse, frà le quali; & il fusto nasce alle volte altra prole fogliosa; & arriuando questi fusti verso le loro cime, tramandano alcune foglie oblunghe, e dentate con poco, ò niente di piedetto, e giunto il tempo del fiorire sorgono da questi fusti, ò foglie superiori molti rametti per ogn' intorno, quasi umbellati, con piedetti sottili, sopra de quali stanno li suoi bottoni, che del mese di Maggio tramandano fiori candidi, composti di quattro fogliette simili à quelle della Cardamina trifolia, figurata, e descritta nell'Istoria Lionese^e, e dal Lobelio nelle obseruationi^f, e nell'Imagini fu per Nasturtio Alpino trifoglio chiamato, le quali tolgono di mezzo, oltre vna picciola palottina verde, quattro filetti bianchi, in cima de quali vi sono apici turchini, caduti li primi fiori, succedono à poco, à poco gl'altri più interni dell'umbrella, che nel crescere, & aprirsi, tutti poi si conuertono in tante silique.

Sono queste silique sottili, verdi, e larghette, con rileuati tubercoli, che palesano il numero delli inchiusi semi; & arriuate, che sono alla maturità, esse cade al principio di Luglio, al minimo tatto che si fa alla pianta, per volerli leuare, tutte l'altre che sono mature s'approno, e spargono i semi lontano dalla pianta, nel uodo di quella, ch'appresso alcuni herbari vien chiamata Persicaria filiquosa, e dal Gesnero nell'horto, e nella descrizione del Montefratto^g si detta *Nolime tangere*, e dal Dodonco nell'Istoria^h si chiama con nome d'herba impatiente; si che questa mia pianta potrebbe ancora lei, per essere di seme così fugace, Sifimbro impatiente nominarsi.

Caduti, che sono i semi, rimangono sopra la pianta le reliquie, ò scorze delle silique riuolte, & annellate. I semi visti col microscopio sono di

c Pag. 107.
d Pag.

e Pag. 666.
f Pag. 106. e
368.

g Pag. 149. e
368.

no di forma rotonda imperfetta, più grossa da vn capo, che dall' altro, di colore giallo, lucidi, increspati in certa maniera, che paiono squamosi, ò scaccati, & in ciascuna punta, quando sono freschi, hanno vn vaghissimo colore turchino, che poscia seccati si conuerte in vn colore più scuro. Il loro sapore è acuto, simile à quello del Nasturtio aquatico, che figura, o descrive il Mattioli², la radice hà sapore simile à quello delle rape crude.

Trattando Dioscoride del Sisembro, secondo l' esposizione de suoi interpreti, e massime di Marcello Virgilio¹ ne portò due spetie, vna coronaria, e specie di menta palustre, diuisa dal Bauino in altre tre nella sua Pinace, e la seconda di questo Autore, che nasce, e viue per lo più nell' acque forgenti, come fà il Sio. Altre Sisembri acquatici, propone nella sua Istoria Gio: Bauino, oue tratta del Sio², quali però crederei più tosto spetie di Cardamine, e di Nasturzi, che di Sisembro; e stimarei ancora, che questo mio non più da altri, che da me per auanti descritto, possedesse intieramente, se non forsi di più le seguenti virtù, che già da Dioscoride, secondo l' interpretatione allegata del sudetto Marcello, vengono attribuite alla sua seconda spetie, cioè, *natura illi est calefacere, & urinam ciere: estur vel crudum etiam Sisymbrium: exterit vtrumque genus lentiginis, asperamque, & adustam sole cutem emendat, totis noctibus emplastri modo impositum: cum vero illuxit, bāmōre aliquo ablucum.*

1 Pag. 116. vltima edizione con figura grande.

2 Lib. 11. c. 117. pag. 263.

1 Lib. 11. c. 117. pag. 268.

Stipsdanti Arbore Orientale.

Cap. 98.



Stipsdanti habet folia aculeata, aspera, & crassa, valde viridia, flores produens paruulos, albos, & in cacumine radiantes; fructus est triangularis, rubicundus, nigricans, radix magna sed valde purgatiua, si con aqua bibatur utilis est ad hydropicos, sumus radius sumiprus per os, dentes fortificat, dolorem sedat, Vermes enecat; ex folijs, cum crassa sint, succus extrahitur, coquitur, spissatur ad consistentiam extracti, & ad vsum seruatur, ex folijs formant Gentiles medicamentum purgans. Sed valde periculosum ob nimiam caliditatem, aperit venas, & est medicamentum mortale.

La Figura di questa pianta è nell' Imagine 32. dell' Erifmo di Candia.

Il Padre Vincenzo Maria di Santa Caterina da Siena descrive quest

istessa pianta con nome di Danti, con queste parole seguenti.

Il Danti è pianta piccola, con le foglie grandi, quasi rotonde, nelli lase puntate, aspre, e grosse, molto verdi, & oscure, singolarmente nell' estremità doue sono-

2 Lib. 4. cap. 2. pag. 363.

ne sono strisciate di giallo. Il frusto è triangolare, colorito parimente di giallo, e rosso. La radice beuuta con acqua è molto purgatiua, singolarmente profittuole à gl' Idropici. Costumano gl' Indiani di riceuere frequentemente il fumo della medesima per bocca, prouando che fortifica li denti, mitiga il loro dolore, & ammazzà li vermi. Dalle foglie, le quali sono crasse, e carnose, si torce il sugo, quale fanno cuocere, e condensare, e di quello si vagliono più ordinarimente li Gentili, come ancora delle foglie semplici pistate per medicamento euacuatiuo, con tutto ciò da più pratici è tenuto per rimedio violento, e di calore intenso, & eccessiuo, per onde molte esperienze dimostrano, che frequentemente nuoce, & in luogo di porger salute, causa grauissimi danni.

Thlaspio di Dioscoride, ò sia Nasturtio de' Tetti di Serapione. Cap. 101.

Fig. 74



Ve sono le piante, che da gl' Autori moderni vengono figurate, e descritte per il vero Thlaspio di Dioscoride, & io non niego essere queste nel genere de Thlaspi, e poterli vsare in luogo di quello di detto Autore. Dalla piata però; che questo gran Maestro della Botanica intese molti si scostano, poiche in esse non trouansi le

foglie diuise con incisure (essendo solo dentate) ne i semi di figura di disco, e quasi fessi, come Dioscoride insegna essere nel suo, descriuendolo nella maniera seguente, giusta l' interpretatione di Marcello Virgilio *Breuis, & exigua herba Thlaspi est, folijs angustis, digitali longitudine, in terram versis, in summo incisuris diuisis, & modice pinguibus, caule tenui, duorum dodrantum altitudine, paucis in eo adnatis: & circa caulem, fructu in summo modice lato: in quo exiguum semen est Nasturtio simile, disci figura, & reueluti infractum, vnde nomen inuenit.*

a Lib. 2. c. 145.
pag. 284.

Essendo dunque le piante da moderni proposte per il Thlaspio qui descritto mancheuoli delle note principali di esso, si può chiaramente conoscere, ch: il Thlaspio di Dioscoride non sia da moderni per anco stato conosciuto, non che descritto, e lo confessò anche il dottissimo Gio: Marnardo nelle sue Epistole medicinali *b*, con queste parole. *Thlaspi verum Dioscoridis, a quo nostro incognitum*

b Lib. 4. pag. 86
epistola 3.

Se questo grand'huomo però ritornasse hora trà viui, mi persuado, che non parlerebbe più di questa forma, essendomi, con l' aiuto di Dio, riuscito di

to di rauuifare questo vero Thlaspio di Dioscoride nella pianta Persiapa; che qui vengo à descriuere, ne stimo sia per essere discorde dal mio parere il giudicio de gl' intendenti di questa professione, se si compiaceranno di confrontare il mio Thlaspio con quello di Dioscoride, & offeruare quanto bene concordino in tutte le note più singolari, e massime in quelle, che ne gli altri Thlaspi sin' hora descritti non si riuengono, ne meno si ritrouano.


Nacquemi, non è molto, questa rarissima pianta di seme, che mi fu trasmesso di Firenze dall' Illustriss. & Excell. Sig. Dottore Filippo Donini Sopraintendente de' Giardini del Sereniss. Gran Duca di Toscana (de' Semi portati (come scrissi nel capitolo della Chriscome di Persia, e di Soria) à quelle non mai à bastanza lodate Sereniss. Altezze, essendo stati cagione, che questa rarissima pianta si sia vna volta trouata, onde se gli deuolode perpetua da tutto il Mondo) sotto nome di Thlaspio di Persia; per lo che non mancommi l' agio d' offeruare, che quest' herba spuntando da terra forma vn germoglio, ò sia congerie assai folta di foglie (come le chiama Dioscoride) larghe, e lunghe quanto vn deto, mà che tall' hora, più, ò meno l'allungano, secondo la natura del terreno in cui si coltiua la pianta.

Queste però, che da Dioscoride sono chiamate foglie lunghe quanto vn deto potriano ancora dirsi Ramuscelli, non intendendo egli altro cò tale nome, che quei primi herbacei, e fogliosi fustarelli della medesima lunghezza, che immediatamente dalla Radice (come ben mostra la figura, che soggiungo) questa pianta dispiega, simile non poco à quelle della seconda Stratiote, che conforme vogliono alcuni è il Millefoglio volgare, i di cui ramuscelli parimente con nome di foglie sono chiamati da Dioscoride dicendo, che sono simili alle penne de gl' uccelli, ò come porta in quel luogo l' Interprete citato, parlando del Millefoglio: *habet haefolia auicularum pennis similia*: e pure si sà, che nella Stratiote sopra nominata, solo i rami fogliosi hanno simiglianza di penne d' uccelli, seruendoli di foglie quelle tenui emissioni, che di quà, e di là non continuate s' estendono, le quali per essere innumerabili, hanno fatto denominare Millefoglio la pianta, à cui male si addattarebbe tal nome per i soli rami, che sono pochi, se foglie propriamente si addimandassero.

In tale maniera dunque non propria, chiamandosi foglie i ramuscelli, che prima spuntano nel mio Thlaspio, crescono, come pure fu auuertito da Dioscoride, verso terra riuolti, anzi sopra di quella in gran parte distesi. E' viuace il loro verde, la costa alata, ò fustarello, che per mezzo di quelli, tutto herbaceo, e grossetto scorre rotondo al di sotto, al di sopra ricce piano, con vn sottile canale, che tutto per lo mezzo lo solca. Dalle
di cui

fig LXXII

Thlaspi uero di Dioscoride primo.



di cui sponde, e dalle cime si stendono, quelle picciole, e sottili escrescenze, ouero emissioni di foglie, che secondo il mio parere Dioscoride chiamò foglie intiere.

Queste nascono tall' hora opposte, non di rado alternate, & alle volte ancora senza ordine alcuno disposte, e tutte minutamente, e variamente incise, sì che mostrano nella parte superiore vn sottilissimo folco, à pena visibile, che per il mezzo le trascorre, e dall' opposta faccia, sotto ad ogni linea fatta dal folco, le segna vn neruetto così tenue, che à pena si discerne, massime verso le cime. Sono queste incisure trà se distinte alla rinfusa, tutte però strette, & all' indentro riuolte; queste foglie si rendono simili, non solo à quelle dell' accennato Millefoglio, mà à quelle ancora di certa pianta, che dal volgo vien chiamata herba Carara, e che dal Lobelio nelle imagini è portata figurata con nome di Coronopo serpeg- pag. 438. gigante del Ruellio, e prendesi da alcuni, impropriamente però, per l' Ambrosia di Dioscoride.

Nel mezzo poi dell' herbaceo germoglio di questo mio *Thlaspio* nasce di Maggio vn caule, che s'inalza poco meno d'vn cubito, come fu espresso da Dioscoride, di color rosso massime nel fondo, rotondo, liscio, e pieno di midolla verdiccia, circondata da sottile dogia di legno, che piegato non si rompe. Porta frequenti i nodi, che tramandano con i rami fogliosi presso terra altra figliolanza di cauli, e foglie della medesima condizione di quella del caule principale, mà assai più piccioli.

Più sopra verso il mezzo della pianta cangia colore il fusto principale, essendo tutto verde, & à ciascuno de nodi vi nasce vna foglia sola, hora intiera, hora largamente trinciata, mà che sempre con due alette abbraccia tutto il caule: le foglie largamente incise tengono qualche similitudine con quelle dell' *Eruca silvestre*.

Trà queste, & il foglio maggiore nascono altri fustarelli, le foglie de quali, come tutte le altre della parte superiore di questa pianta, riescono totalmente differenti di forma da quelle, che fin' hora si è descritto; poiche sono quasi rotonde, e perciò somiglianti assai à quelle de cauli superiori della perfogliata, abbracciando totalmente il fusto. Ben è vero, che queste non restano sempre intiere, come nella sudetta pianta, mà di sotto riescono bipartite, e tal volta lunghette, come s'offerua nell' imagine, nel modo di quelle della *Pistolochia*; furono ancora paragonate alle foglie dell' *Hedera*, con similitudine molto buona, se la forma però si consideri, e non la grandezza ordinaria delle foglie di quella, e di questa pianta; essendo nel *Thlaspio* sudetto assai minori, per la qual somiglianza pare, che Giulio Polluce le accennasse fatte à foggia di pelta, ch' è vna

Bb

forte

d Lib. 3. a. 3. 179.
 pag. 41.
 e Lib. 3. a. 3. 181.
 pag. 55.

forte di scudo picciolo usato dalle Amazoni, assomigliando egli questa. forte d'armi alle nominate foglie dell'Hedera, come vien riferita da Her-
 molao Barbaro nel suo Corollario sopra Dioscoride^d. Gio Battista Ignatio
 porta similmente la stessa autorità del Barbaro nel Corollario sopra il me-
 demo e, nel che molto ben concorda con queste ultime sue foglie l'herba;
 che qui porto, palesando esse essere questa pianta il vero Thlaspio di Dio-
 scoride, le quali foglie hederacee sono di sostanza dure, e cartilaginose à
 differenza dell'altre, che sono moderatamente morbide, e tutte trascorse
 da sottili neruetti, che da ogni lato si lasciano vedere, formando certe
 linee intersecate, che sembrano tanti caratteri.

I Rami, che nascono dalle foglie intiere nella parte superiore del
 maggiore si diramano in altri minori, che sono tre, ò quattro, e tal volta
 sei, li quali portano in tutte le cime, à guisa d'ombrella, i suoi bottoncini
 verdi, che sono tanti scudetti grandi, come il grano d'vna lente, ciascu-
 no de quali vien sostenuto da vn sottil piedicciolo. Nel fiorire, che fan-
 no non si allargano, se non la metà, onde paiono tante borsette mezze
 aperte, nelle quali, mediante l'aiuto del microscopio, si scoprono quattro
 fogliette bianche, ripiegate, & aggroppate in se stesse, con stami nel mezz-
 o del medesimo colore, e soprafendenti, vi stanno i loro apici di colore
 giallo.

Cadendo i primi fiori ad vno ad vno, s'allunga il ramo, restan-
 do intorno le capsule, sopra sottili pedicciuoli, con i semi dietro, in figura di
 disco, e così di mano in mano vanno cadendo gli altri fiori, tanto che la
 loro congerie vmbellata diuene vna lunga spica, lo scudetto, che partor-
 riscono queste spiche, viene trascorso da vn sottil neruetto, che da ambe
 le parti si vede.

In ogni scudetto ritrouansi due semi à similitudine di quelli del vol-
 gare Nasturcio, come nota Dioscoride: spiegano all'incontro due alette
 bianche à pena visibili, & in punta riescono quasi amaccati, e fessi, come
 notò parimente lo stesso Dioscoride. Caduti i semi, vi rimane la spica
 nuda, dalla quale di quà, e di là, s'alzano quelle membranette, che nelli
 scudetti seruono per separare vn seme dall'altro. E' gratiosa non poco la
 proprietà di quest'herba, poiche quando hà maturato il seme lo rigetta
 da sè lontano, e di lì à poco si vede rinascere nel sentiero, e ne contorni
 della pianta, che nel suo luogo primiero si perde, e muore.

La sua radice principale nella corona è di grossezza eguale al fusto,
 e getta d'intorno altre radici minori, dalle quali molt'altre ne deriuano
 fibrose, rotonde, bianche, e legnose, mà facili al frangerfi: masticate ren-
 dono sapore acre, come il Rafano, che si mangia: le foglie sono meno

mor-

mordace di sapore, ch' in tutto è simile à quello dell' Eruca.

Il seme è mucilaginoso, aspro, & acuto, nella guisa della Senape; onde non senza ragione questa pianta (come vien fatto parlare Dioscoride) fù chiamata Persiana, & Erratica Senape, ancorche altri l' addimandassero Myite, altri Mioptero, & alcuni Dasmofonte, e qualche altri Bitro; la quale diuersità di voci, mi fa ricordare d'altri nomi, che nel testo Dioscoridiano sono attribuiti à questo Thlaspio, come di Suitempo appresso gli Egittij di Scandalacio, di Ciprella, e di Piede Gallinaceo appresso i Lattini, fù anche detto Saurio da Greci meno antichi, si come apporta Marcello Virgilio, nome tolto dalle lucertole, che così chiamansi in Greco conforme spiega il mio Interprete; e la ragione si è perche nasce in copia ne luoghi, oue frequenti si vedono questi insetti. Al che si può aggiungere, stando nell' origine del primo nome di questa pianta, che non solamente Thlaspi, come volse Galeno, altri Thlaspidio, ouero Thlaspidio la dissero, come Hippocrate, e da Serapione / trattando dell' istesso Thlaspi, sotto nome di Nasturtio, dopo hauere descritto il primo Nasturtio, ch' è il volgare, descriue ancora il secondo, sotto nome di *Nasturtium sectorum*, il quale molto bene corrisponde con il mio Thlaspi di Dioscoride, e dopo questo secondo descriue il terzo, chiamandolo Nasturtio Orientale, che secondo il mio parere, altro non è che la vera Braba di questo Autore, come nel proprio capitolo à bastanza si è dimostrato.

f. Cap. 156.
g. Cap. 759.
i. pag. 150.

Ne Paesi, oue nasce in abbondanza, si fa vedere frequente, come offeruò Dioscoride, ne' sentieri, nelle fosse, nelle siepi, e circa le case. Delle di lui virtù, si hà, che riscalda, e con qualche conueniente liquore beuuto, purghi mirabilmente la bile per di sopra, e per di sotto, tiri il sangue, e rompa gli abscessi interni. Gioua ancora contro le Sciatiche, con farne lauatiui, ouero Chlisteri, e prouoca i mestruj: per esser dunque così efficace nelle sue facultà quest' herba, mi dò à credere meglio d' ogni altra con genere, potersi chiamare il vero Thlaspio Teriacale, e douersi per ciò vsare solo questo nelle compositioni, & in altre medicine contro veneni.

E perche Dioscoride nel cap., in cui si tratta di questa pianta, fa mentione d'vn'altro Thlaspio, à relatione del Semplicista Crateia, da alcuni, chiamato parimente Persiana Senape, con foglie più larghe, e maggior radice del primo, come intese Marcello Virgilio, mà di forma, e virtù consimile, non parmi da passare qui sotto silenzio, che questa medesima pianta sia da alcuni stata creduta il Rafano volgare, contro la quale opinione per mostrarne l' errore, basta il dire, che Dioscoride, secondo la traduttione del sudetto interprete, parlando di questo secondo Thlaspio, s'intende d'vna pianta, al mio parere oggidì incognita, mà però simile al

suo primo, mà di foglie più larghe, e di radice maggiore, col quale niuna somiglianza tiene il Raffano sudetto, che non solamente merita il cognome di commune trà i Raffani per non essere la specie più consueta à mangiarsi dal volgo, mà ne meno deue chiamarsi Raffano, non contenendosi egli sotto questo genere di piatte per essere più tosto la Braba vera di Dioscoride da gli Scrittori moderni chiamata impropriamente Draba, ò Arabide, come nel proprio capitolo si è dimostrato.

D'onde cauo, che questa mia pianta, come venuta di Persia non possa essere il sudetto Thlaspio di Crateia, chiamato Senape Persiana, perche la radice di quello è grande, come parimente le foglie: e per lo contrario nell'herba, che si è descritta, la radice è picciola, come pure picciole sono le foglie de' rami fogliosi.

Ne solo viene dalla Persia, mà dalla Soria ancora, nella quale è molto famigliare questo mio Thlaspio Dioscoridiano, i di cui semi alcuni venuti dalla Soria sotto nome di Thlaspio Soriano, mi furono ultimamente donati dal fù Eccell. Sig. Tomaso Belluzzi, all' hora Lettore dello Studio di Pisa, i quali seminati mi produssero la pianta di cui sin' hora si è discorso.

Semen illi acerrimum est, dice Marcello nella sua esposizione di Dioscoride b, calefacit: bilem acerabili mensura potum, per superna, & inferna purgat: clystere etiam contra coxendicos dolores infunditur: quin etiam potum sanguinem trahit, & interiores abscessus erumpit, ut mensis idem, & fetus in utero enecat.

Thlaspio Fruticoso di Persia con foglia di Keiri di Fiore odorato. Cap. 102.

Fig. 75.



Opò il Thlaspio di Dioscoride nell' antecedente Capitolo descritto, ne segue vn' altro fruticoso del medesimo luogo; del di cui seme fui favorito la prima volta con questo nome, e patria dal Sig. Andrea Vestri Farmacopo Pisano, e Simplicista insigne, & ultimaméte dall' Ecc. Sig. Pietro Nati Dottore in Medicina, e dignissimo Ostensore delle Piante nell'orto di Pisa: quale seminato che fù, ne partorì sempre vniforme, e in due diuerse volte la pianta; che qui si figura, e si descrive, benchè pare, che questa mia habbia qualche similitudine col Thlaspio fruticoso, con foglia di viola gialla, ouero di keiri, descritto da Gasparo Bauino



uino nel suo Teatro Bortanico^a, nientedimeno al mio parere hà ancora qualch'altre particolarità di simili dal sudetto, che sono il sapore assai amaro, & acuto, come l'Eruca, & il fiore alquanto odorato, le quali cose mi porgano qualche dubbio esser questo da quello diuerso; intanto hò stimato bene il porne quiui al Lettore la di lui Imagine, ancorche fusse l'istesso, per esser pianta rara, e che stà fiorita tutta l'Inuernata, e parte ancora dell'Estate, tanto più faccio per non esser stata fino ad hora (ch'io sappia) d'alcuno Autore figurata.

Produce questa specie di Thlaspio nel principio della sua nascita vn cespo di foglie pellate, di sostanza sode, crasse, lisce, e senza denti. Queste nel di sopra sono di colore verde scuro, nel di sotto però impalidiscono, trascorse per il lungo da vn neruo in questa parte apena visibile, nell'altra poi resta con vn tenue solco escauato, e sono della forma, e grandezza che s'offerua nell'Imagine, & assai simiglianti al Xciri volgare, ò sia la Viola Gialla commune, mà però queste del mio Thlaspio sono assai minori.

Dalla radice, e dal cespo del quale nasce vno, ò più fusti ondosi, & in varie parti ripiegati, alti vn palmo, e mezzo incirca, non molto grossi, parte legnosi, duri, coperti di scorza grossa, difficilissima da leuarsi dalla parte legnosa: questi se si piegano si frangono, e mostrano nell'interno loro anima sottile, con entro midolla verde, circondata da doge tenue, legno sa di color bianco: da i nodi, ouero occhietti da ciascheduno de quali nascono le sue foglie in varie parti riuolte, & al più delle volte senza ordine alcuno sopra la pianta disposte; in alcune cavità del fusto maggiore nasce altra prole di fusti, e foglie minori, alcuni vicini à terra, altri verso il mezzo di questi, quali crescono tanto, ch'auanzano, ò superano il fusto maggiore, anzi che sono i primi à portare alla luce il fiore, come bene nella figura s'offerua.

Giunti poscia che sono questi fusti laterali verso le cime, tramandano vna massa di bottoncini rottondeggianti, disposti in forma quasi d'ombrella, di color verde, eccetto nel mezzo, che sono di color morello violaceo, quali s'aprono più l'Inuerno, che l'Estate, e mostrano vn fiore di color bianco, composto di quattro foglie sostentate da altre tanto herbacee, e sono questi fiori assai simiglianti all'Esperide prima, che figura, e descrive il Clusio nell'Istoria delle piante rare^b, eccetto ch' in questo mio Thlaspio le foglie del fiore non sono in grandezza eguali, essendone sempre due maggiori, e due minori (particolarità da me mai più veduta in altro Thlaspio, ne meno ch'io sappia, ne ch'io mi ricordi in altra pianta:) nel mezzo di queste quattro floride foglie sorgono alcuni stami rossigni, con altre tanti apici sopra, di color giallo, ne s'aprono questi fiori tutti in vna volte

b Lxviij. cap. 5.
pag. 296.

volta, mà solamente quelli del circolo esterno, che sono i primi ad aprirsi, e così successivamente fioriscono gl'altri, i quali spirano ancora d' un odore assai grato, ch' inclina alquanto à quello della Viola negra: & in questo mentre quella congerie rotonda di bottoni, che prima sembraua ombrella, crescendo si prolunga in forma di spica, non molto lunga però, nella quale si perfetionano le sue capsule, ouero pelte biscutate, e piatte, di color più scuro, che separate l'vna dall'altra si mostrano rottondeggianti, eccetto che nella parte annessa al pedino sostentatore di quelle: sono quadrate, & in questa parte vi resta per ciascheduno scudetto vna fessura oblunga, che finisce in punta, quale aperta lascia vedere vn seme piano, ò piatto, cioè di forma compressa, e nel contorno di lui circondato da vna escauadura, che lo rende alato, e di colore di Cannella; Questo seme rotto, e gustato rende al palato vn sapore, come si accennò di sopra, amaro, e che dura assai più di quello delle foglie, e più acuto, pungente, quasi come senape.

Fiorisce questa Pianta tutto l'anno, l'Estate però con pochi fiori, mà l'Inuerno ne resta tutta carica, e quanto più è crudo il freddo, tanto maggiore quantità di fiori và producendo, segno euidente della natura calida della Pianta.

La sua radice è breue, di color buseo, sottile, legnosa, che si divide in più altre radici minori, ondosc, e fibrose. Il suo sapore è amaro, acuto, e forte, e più potente, e mordente ancora nel sapore sono le foglie, ch'imitano quelle della Braba Dioscoridiana, chiamata dal volgo falsamente Raffano volgare.

Toppi herba marina Indiana.

Cap. 103.



Osi la descrive il Padre: *Toppi habet folia magna vt laurus, lucida, in superiori parte viridia, sed subter parum lutea, cum acuminibus minutis, colore nigro; est planta valde longa, & nascitur in mare, ex cuius undis littora replentur folijs, & fructibus; est duplicis speciei, sed in folijs sunt similia, quæ nullam habent nervum nisi vnum in medio sunt quæ racta multum mala, quæ totæ franguntur, & in diuersas partes diuiduntur, solum distinguuntur in fructibus, quorum vnus est vt Pyrus, etiam in colore similis, cum quinque auriculis foliaceis retro flexis*

flexis, qua adherent fructibus, in quo inserta est longa fistula, qua dum fructus maturescit cadit, & est plena lanugine veluto magis delicata. Alius vero fructus habet paruum calicem ad instar poculi, qui postea dilatasur, & diuiditur in septem radios, in medio quorum est paruus fructus Rapa nostra similis, istur sale conditus vel aqua salsa, valet ad reprimendum sanguinem, ac etiam pro contusionibus, & alijs similibus effectibus vtuntur supradicta lanugine; cortex plantae partim est rubra, & partim lutea, qua vtuntur ad tingendum colorem rubrum obscurissimum.

Descruiessi breuemente questo Toppì dall'accennato Padre Fra Vincenzo Maria nel lib. 4. cap. 9. pag. 367. con queste parole.

Il Toppis pianta, che nasce alla seconda dell'acque, e si sostiene sopra molte radici scoperte, l'altezza è d'un braccio, e più da terra, il cui frusto è come vna rapa coronata d'vna rosetta, con fogliette riuolte done il frusto s'inserisce, e sostiene.

L'Image di questa pianta è nella figura 75. del Thlaspio fruticoso di Persia.

Totta Vari, ò forsi Mimosa del Malabar.

Cap. 104.



Vesta pianta, che nel Malabar si chiama Totta Vari, è molto simile all'herba viua dell'Acosta, sì nella figura, come nelle virtù; onde per alcun tempo l'hò stimata per la stessa, mà riflettendo alle differenze particolari delle foglie, e de fiori dell'vna, e dell'altra, mi è parso bene il distinguerle come spetie da spetie sotto vn medesimo genere; perche ne' rami fogliosi della pianta dell'Acosta (che si nominò nella prima delle mie Mimose) le fogliette senza essere lanuginose, sono tutte separate, e con qualche intervallo disgiunte, e più anguste, che in quest'altra, sono vn poco più larghe, anzi si toccano insieme, quasi ammassandosi, e non senza qualche lanugine; oltre di che si progongono in quella quattro pedicciuoli con vn solo fiore per ciascheduno giallo, e senza alcun odore, ne cò apparenza di rossigno; in quest'altra si scorgono cinque lunghi piedetti con cinque, ò sei, e tal volta sette boncini per ciascheduno, ò fiori, che siano, con linee rosse nel di dentro, odoratissime come le pere mature. Dirò quì vn mio pensiero, ò che l'Acosta non hà visto, ò non hà figurato bene la sua, ouero che

che questa è altra pianta; onde hò giudicato, che non riusciria discaro il portarne la figura naturale, con la descrizione come nel capitolo dell' *Ardabar* sù scritto, trassinessa gl' Anni passati dal *Malabar*; e quando anche questa *Tota Vari* fosse l' istessa, che l' herba viua dell' *Acosta*, tanto non saria fuori di ragione, la sudetta figura, che se ne porta, perche imita assai più il naturale, che quella del sudetto Autore per esprimere meglio le foglie di *Polipodio*, e di *Tamarindo*, & anco i fiori, come si potrà osseruare da chi li paragonarà: così dunque la descriue il nostro Padre Matteo.

Mirabilis herba inuenitur in Regionibus Malabaris, vocata à naturalibus Tota Vari, ob oculos ibidem mihi venit die Octaua S. Ioannis Baptista, anno 1657. paruula herba est, habens folia quasi Tamarindorum, leuia, aliquo passo lanuginosa flores itidem paruulos producis, colore flauos, & in interiore foliorum, lineis rubicundis depictos: odore autem suauissimo, ac si esset odor pirorum maturorum perfectè olentium: similiter producis semina valdè paruula: mirabilis videtur sanè, ac si sensum aliquem haberet, & animali polleret virtute: nam si leuiter tangatur, & digitis atrectetur, mouentur folia, & ad inuicem inter se clauduntur; si verò unus ramulus leuiter palpetur ille tantum mouetur, & per inferiora clauditur; si tota planta fortiter tangatur, tota mouetur, & clauditur: potest autem dici herba verecunda, sunt & alia herbarum genera, quæ per diem aperta manent, nocte clauduntur: alie è contra: sicut & nonnulli flores, qui nocturni flores vocantur, quia tantum nocturno tempore virescunt, & per diem languescunt.

Nascitur talis herba, inter palmarum radices, eamq; alij verecundam, vt dixi, alij virgineam vocant: meritò sedem habet inter radices palmæ, quæ typus Iusti est: vnde in libro psalmorum dicitur: Iustus vt palma florebit: & digne Iustus, quia Virgo, quia Castus: flores autem è prædicta planta extracti, statim marcescunt, dicunt naturales, quòd si Virgo herbam atrectet, clauditur quidem, sed statim aperitur: at verò à non virgine tacta, sic longo tempore clausa permanebit: eundem effectum se claudendi producis, & si stilo aliquo atrectetur & tangatur clauduntur enim folia per inferiora. Et hinc vocatur Tota Vari, vel Tota pari, idest tacta clauditur. Virute etiam mirabilis pollet hæc herba, & mirandos effectus producit, ex quibus nonnullos hic breuiter subiungam.

1. *Primò enim strato alligata, impedit pollutiones nocturnas.*
2. *Flores eius stimulos carnis reprimunt, si manibus solum admoveantur, & odor eorum per olfactum atterahatur.*
3. *Totius herba facta decoctione, & epota, gonorrhæarum seu seminis fluxum sistit.*
4. *Herba trita, & oleo macerata, & cocta, presentaneum remedium est pro quacumque uembrorum contusione, & pressione, si calidè inungatur pars offensa.*


fig LXXV



fiore del Rastegai



Rastegai foglia



Torunda

p^a Indiana

Ramba Arb Indiano

Falsel Arb Indiano

femsa; quia sicut tacta clauditur ita constringit partes ictu, vel pressione lesa.

5 Quomodocumque epota, amorem conciliat.

Il ritratto di questa pianta si troua nellà figura 61. della Nelikā.

Tossunda, siuè Cafunda. Cap. 104.

Fig. 76.



Rutex est circiter quinque cubitorum altitudi, ne Flores producit flauos quinque folijs compositos, instar violæ; folia vulgari parietaria similia sunt post flores filiquas profert fasciculis similes, in casumine tamen curruentes, in quibus sunt circiter octo femina, dura, oblonga, & lenia: foliorum decoctio partum accelerat, foliaque trita cum senape ventris doloribus medentur.

Questa medesima pianta viene portata dal P. Fra Vincenzo Maria nel Lib. 4. cap. 8. pag. 363. con nome di Cascunda.

Trifoglio glutinoso, Saffatile, Argenteo di Fiore Odorato. Cap. 105.

Fig. 76.



Asparo Bauino nella sua Fitopinace, ouero enumeratione delle piante ^a, registra sessantadue spetie di Trifoglij, descritte appresso diuerſi herbarij. Il medesimo nel suo Prodomo, ouero Teatro Botanico ^b, ne registrò sino al numero d'altre ventiquattro, le quali tutte ne fa mentione nella sua Pinace ^c, altre di ciò ne

tengo io ne miei manuscritti di molt'altre spetie, quali io penso non essere ancora d'altri offeruate, benchè questa (che quiui si propone) habbia qualche simiglianza con il Lotto incanno Narbonese aspero del Lobelio portato nella sua Istoria da Gio: Bauino ^d, sotto nome di Trifoglio argenteo di fior gialli, mà chi bene considera le qualità dell'vna, come dell'altra pianta, conoscerà esser da questo diuerſa, quale ritrouai anni sono à piedi del Monte Baldo, ne' contorni della Corona in capo alle praterie del Monte Masetto, che dà fine ad vn spauentoso, e precipitoso balzo, che riguarda verso l'Adice, il quale portato con vna quantità d'altre piante, in quest'orto publico della Città di Bologna, si piantò, e vi fiorì, ma per

Cc

essere

^a Lib. 2. ca. 10.
pag. 614.

^b Lib. 5. cap. 16
pag. 14.

^c Lib. 8. fasc. 1.
pag. 316.

^d Lib. 17. no. 2.
pag. 319.

essere di natura di nascere frà le fiffure de' Sassi, e passersi d' aere fredda, sopraggiuntoui il caldo non molto vi durò, la pianta la quale portasi qui al Lettore la propria Imagine, con la sua descrizione.

La maggior altezza che si sia offeruata in questo Trifoglio, è quella che si vede nel disegno; Questo produce dalla sua radice molti fusti diritti, pelosi, legnosi, sottili, e rotondi, arrendeuoli, sì che piegati non si rompono, la di cui scorza è nel di sotto di color ferrugineo, e poco più sopra è di color verde, ne' di cui nodi nascono due, tre, e quattro piedicciuoli: sopra de' quali vi sono le sue foglie à trè à trè ripiegate verso la parte superiore, sì che paiono fatte à conca, coperte sì da vna parte, come dall' altra di pelo bianco, anzi condido, che tutte le cuopre, sì che per tal causa si mostrano affatto di color argentino, massime dalla parte di sotto, sono di sostanza sode, cartilaginose, e crasse.

Queste gustate rendono in bocca sapore glutinoso, sì che pare s' impassa, come se fosse cola; qualità ch' io non hò offeruata in altra pianta.

Nel giunger che fanno questi fusti, verso le parti superiori tramandano del Mese d' Agosto li suoi bottoncini pellosi, e di forma lunghetti, che apprendosi in tre foglie, lasciano vscire vn fiore della grandezza, che si vede à parte nel disegno, di colore giallo, con odore simile à quello della nostrale, e volgare Ginestra, mà però l' odore non è tanto acuto.


Caduto, che sia questo fiore suresce vna siliqua irfuta, della lunghezza come s' offerua nell' Imagine, e contiene vn seme ouato, e piatto di color oscuro.

La sua radice è lunga, e di colore ferrugineo poco, ò niente gruppofa, che verso il fine, si diuide in altre più sottili, masticata, lascia in bocca come sopra s'è descritto delle foglie humore crasso, glutinoso, e di sostanza asciutto.

E Pianta perenne.




fig. LXXXVI.



Trifolium sativum glutinosum

fig LX XVII



Verbena con foglie d'Ortica

Verbena confoglie d' Ortica di Canadà.

Cap. 106.

Fig. 77



Alla radice di questa Verbena nascono foglie lucide, crespe, asperse di macchie, ouero puntini bianchi, che sono spianati sopra le foglie, e sono nel contorno dentate, & in ogni parte pelose, & al tatto aspre, con neruature di sotto assai rileuate, che diuersamente le trascorrono, facendole, come s'è detto, increspare, e

nel di sopra folcate. La loro forma è simile à quelle dell' ortica volgare, mà più crasse, e frà queste, massime nelle parti da basso, oue sono le maggiori della pianta, ve ne è ancora di quelle, che hanno due ale vicino al gambo, come nella figura s' offerua.

Da queste foglie forgono vno, ò più fusti, alti alle volte circa ad vn cubito, e mezzo, nel di sotto, ò presso terra sono di color morello, e poco più sopra verdi, disposti come quelli della nostrana, e volgare Verbena, cioè di forma quadrata, & in ciascheduna delle faccie vn poco scan- nellati, e nel di dentro vuoti, essendo la midolla, ch'è argentina, e spongo- sa, attaccata alla parte legnosa, nel resto sono fodi, che niente piegati si frangono, coperti di due scorze sottili, e cartilaginose, delle quali l' este- riore difficilmente si leua dalla compagna, e questa con facilità si distacca dalla parte legnosa.

Hanno rari nodi, & anco assai grossi, mà ineguali, da ciascheduno de quali nascono due foglie vna contro l' altra, e così seguitano all' insù si- no nella metà della pianta, oue si dirama in altri fogliosi cauletti appor- tatori di molte ondeggianti spiche di varia lunghezza, sopra de quali nasco- no bottoncini à due à due congiunti, qu'ali nell' aprirsi del mese di Giu- gno, lasciano vedere vn fiore bianco, anzi candido, composto di quat- tro fogliette disposte nel medesimo modo, che sono quelle della volgar Verbena.

Caduto che sia questo fiore, rimane vn seme, ch' offeruato col mi- croscopio è di forma oblungo, in punta acuto, e grosso nella parte oue stà annesso al suo ricettacolo, e da due lati folcato, e se niente si maneggia, s' apre in due parti, e resta nel mezzo concauo, lucido, e di color gialleg- giante.

La sua radice si diuide in varie parti, di sostanza soda, fibrosa, di co-

lor bianco succido, liscia, e di scorza facile da leuarsi dalla parte legnosa.

Le foglie, e parimente la radice, hanno sapore amaro, & asciutto; è pianta che tenuta in vaso, e conseruata dal freddo si mantiene molti anni.

Due spetie di Verbena, secondo la relatione di Marcello ^a, trouo descritte in Dioscoride, delle quali tralasciando la prima per essere pianta poco cognita, e molto contrastata, trattarò solo della seconda, della quale ne son più specie da gli Autori moderni, e da Gasparo Bauino nella sua Pinace registrate ^b, la prima di queste porta il fiore azzurro. La seconda tenuifolia vien descritta, e figurata dal Clusio nella sua Istoria delle piante rare con nome di Verbena lupina ^c. La terza è del Perù, proposta da Nicolò Monardes riportata ne gl' Esotici del Clusio nel trattato, che fa di detto Autore ^d, e parimente nell' Istoria Lionese frà le piante peregrine ^e, dicendo però non differire ella dalla nostrana, che nel mantenere le sue foglie sempre verdi, attribuendogli virtù mirabili contro li vermi, come nel fine di quell' Istoria si scriue nel trattato delle piante peregrine. Chiamano la quarta Nodiflora, che nasce ne' luoghi maritimi di Liorno, figurata, e descritta dall' Imperati nella sua Istoria ^f, e dal Bauino nel Prodromo; ma che tutte queste non habbino niente di comune con questa, eccetto la forma del fiore, e del seme, il quale intendo essere venuto di Canada, chiunque ne leggerà l' annessa relatione, potrà facilmente giudicarlo.

Questa viene registrata nell' Indice dell' Horto Blesense ^b con nome di Verbena con foglie d' Vrtica, & anche dall' Eccell. Roberto Morrifon ne' suoi preludi Botanici con queste parole. *Verbena vrtica folio; Planta est bipedalis aliquando altior; è regione ad caulium nodos quadratorum, bina nascuntur folia, mucronata, Vrtica maioris folijs, haud absimilia; sed saturatius viridis, quoad flores, & semina, Verbena vulgari, in omnibus accedit.*

Virga Aurea Virginiana Irfuta Annua di fiore pallido. Cap. 107.

Fig. 78



On trouo di questa Virga Aurea Indiana appresso gli herbari scritto cosa alcuna, e come nuoua al Lettore propongo, massime per esser tanto abbondante, e voluntaria questa pianta, che quei luoghi, oue vna volta sù seminata, e quei tall' altri circonuicini, ne' quali dal vento vengono portati li suoi semi paposi, tal-

^a Lib. 4. ca. 19.
pag. 486.

^b Lib. 7. fol. 4.
pag. 269.

^c Lib. 4. ca. 19.
pag. 45 & 46.

^d Cap. 73. fol. 4.
pag. 347.

^e Lib. 4. ca. 19.
pag. 1910.

^f Lib. 15. pag.
707. Edit. di


Napoli & lib.
28. pag. 673.

Edizio. Veneta
del 1671. Gio.

Maria Ferro.

^g Lib. 7. ca. 16.
pag. 125.

^h Pag. 104.



Rompha pianta
Orientale

Vigna Aurea Virginiana annua

Ardabar pianta
Orientale

talmente infetta, & amorbisce, che li giardinieri stentano à leuarla, e liberarsene, per la gran copia che ne nasce, anzi che dell'Autunno, bench' ella sia pianta, che perisce ogni anno, fa di mestiere il leuarla auanti, che cadi in terra il seme. E' stata chiamata d'alcuni questa pianta Virga Aurea Virginiana, e da altri Coniza del medesimo luogo; in quanto à me crederci più tosto douersi ella collocare frà le spetie delle Virghe Auree, che delle Conize, e così col sopr'accennato nome di Virga Aurea Virginiana la rappresento, parendomi accostarsi più à questa, che à quella.

Questa produce vn cespo di foglie sopra il terreno distese, lunghe circa à due oncie, e larghe più d'vn quarto, sostentate da vn neruo rileuato, che nel di sopra le lascia folcate, essendo da breui peli inuestite, che le rendono al tatto aspre, massime nella faccia superiore, nel contorno dentate à modo di sega, e trascorse da sottili neruature, in varie parti riuolte, che le rendono alla vista vaghe.

Nasce da questo cespo vn fusto alto circa à due braccia, di forma rotondo, peloso, sodo, diritto, alcune volte grosso quasi che il deto minimo, che piegato non si rompe, mà si sfessa, e mostra nell' interno midolla bianca, asciutta, contornata da portione legnosa, e filosa. E questa coperta da due scorze, la prima difficilissima da leuarsi dalla sua vicina, mà si ben tutte due con poca fatica si leuano dalla sudetta parte legnosa: sopra questo fusto nascono occhietti, e da questi foglie senza ordine disposte, della forma delle sopradescritte, e che nell' Imagine s' offerua, nelle cauità delle quali nascono altri fusti con foglie sottili, strette, niente dentate, e che molto infoltiscono la pianta.

Nel giungere, che fanno questi fusti verso le parti superiori, tramandano circa il Mese d' Agosto, frà le foglie tramezzate vna spica piena di bottoncini di color verde di forma piccioli, lunghetti à sottili picchetti annessi, ch' apprendosi lasciano vscire vna moltitudine di fogliette bianche, intorno ad vn disco picciolo di colore giallo; caduti i fiori resta nel calicetto vn seme paposo, piumoso, e picciolissimo.

La sua radice è legnosa, bianca, ramosa, & in varie parti ritorta, contornata da vna gran quantità di fibre, che assai sotto terra si profondano, di midolla piena, bianca, legnosa, soda, che piegata si rompe con stridore. Gustata, è asciutta, e qualche poco acuta, e mordente; però che passa presto; sono le sue foglie più acute, e più mordenti, di sapore quasi come pepe; li bottoncini sono ancora essi acuti, & odorosi, e tutta la pianta hà odore di Raffano, & è annua.



Virga Aurea Virginiana minore.

Cap, 108.



A che feminai la sopradescritta pianta nel mio orto, essendosi dal suo seme sparso, sempre da se stessa mantenuta, e rinouata, producendo certe piante in altezza molto disuguali, cioè di due braccia, come la già descritta, & altre, che non s' alzano più, che vna spanna; mi è spesso occorso di considerarne la stravaganza non però con tanta curiosa riflessione di volermi persuadere, che si potessero diuidere in due spetie; con tutto ciò, hauendo dopo osseruato, che negl' Indici Blesensi; due ò tre spetie vengono nominate, vna di foglie dentate, l' altra di foglie strette, e l'altra di Pelose; mi dà à credere queste esser due piante totalmente diuerse, e che il seme venutomi da Parigi dalla cortesia dell' Eccell. Sig. Dionigi Iunequet, Medico, e Semplicità Regio, fosse tramischiato delle due soprannominate, la minore delle quali per hora breuemente si descrive con lasciarne concludere al perito Lettore ciò che gliene parerà.

La sua altezza, come già dissi, non è che d'vna spanna, il suo fusto rotondo, sottile, assai peloso, che piegato non si rompe, di scorza verde, facile à leuarsi dalla parte legnosa, nella quale contiene midolla lucida di color argentino, che non si può però notare se non col beneficio del microscopio: porta spessi occhietti, da ciascheduno de quali nascono foglie sottili, strette, nel contorno pelose, di forma simili à quelle della volgare Linaria, trascorse per il lungo da vn neruo nel di sotto apparente, e nel dorso peloso: trasmettendo circa il mese d' Agosto verso le loro cime, cesticioli pieni di fogliette minori, nel di cui mezzo nasce vn briue fusto apportatore di tre, ò quattro bottoncini in forma di spighette, mà breui, quali apprendosi mostrano vn fiore bianco, nel mezzo giallo, in tutto simile à quello della pianta superiore, che caduti portano seme paposo, che col minimo vento si sparge, e se ne vola, moltiplicandosi parimente, così la sudetta.


Hà la radice legnosa, fibrosa, bianchiccia, con scorza, che facilmente si leua, scuoprendo anima argentina, con odore quasi di Raffano: masticate le foglie, lasciano in bocca sapore acuto, e caldo; la pianta ancora lei, come la prima, è annua. Vengono parimente registrate queste due piante dall' Eccell. Roberto Morifone nel suo catalogo delle aggiunte dell' orto Blesense; mà con nome di Virga Aurea Americana di foglie strette ferrate, e l'altra di Virga Aurea Americana hirsuta. Zam-

a Nel primo p.
do. nel secun-
do 10. 105.

b Pag 322. &
323.

Fig LXXXIX

Zambul Arbore Orientale



Rumbera Arbore Indiano

Carda Arbore Indiano

Zambul Arbore Indiano, ouero Corniolo Mas-
chio di Teofrasto. Cap. 109.

libro, oborto, di. Non enim imitatio oborto oborto oborto

Fig. 79



E' manoscritti del P. F. Matteo troua l' imagine
d' vna Pianta Indiananotata sotto nome di Zā-
bul, descritto dal Padre con le seguenti parole:

*Zambul Arbor satis magna, habet folia oblonga,
plena dura, nervosa, fructus produens ad instar
corni nostratis, coloris inter rubrum, et sangui-
neum, et nigrum suntque; saporis acidi, ossa vero
olivarum instar; cortex confusa, et ex ea decoctio facta aluum sistit.*

Questo è quanto he seruiue il sudetto P. Fra Matteo, ma chi sarà sì
diligente osseruatione della pianta, che contiene il ristretto di quelle poche
parole, esaminando tutte le due parti, con le di lei qualità, con la figura,
ancora, massime l' essere i suoi frutti d' vn rosso scuro, di sapore acido, e
tanto quelle, come tutto il resto della pianta hauere egualmente dell'
astringente, e giouare à i flussi desenterici, credo, che facilmente concor-
rerà nel mio parere, esser questa vna spetie del nostrano, e volgare Cor-
niolo, tanto più per hauere questo Zambul i suoi frutti della forma stessa;
anzi se deuo dire il mio sentimento circa questa peregrina pianta, che
porta le sue foglie lunghe, e strette, parmi essere il vero, e legitimo
Corniolo maschio di Teofrasto, il quale ne seruiue di due spetie, cioè
maschio, e femina, differenti però nelle foglie del nostro Corniale,
d' Italia, quali furono notati da Teofrasto nella sua Istoria, et aleroue
attribuendoli foglie amidaline, come vien fatto parlare dal Gazza suo in-
terprete con le seguenti parole.

*Cornus quaedam mascula, quaedam femina, quam et fenicorum vo-
cant; habet folium amigdale, nisi quod pinguis, crassiusque; corticem nervosum,
et tenuem: caudicem non nimis crassum. Caterum femina, virgas paruas, si-
cut amerina, suo latere proferit, et fruticosior est: nodos amba, perinde, ac ame-
rina, tum geminatos, tum inuicem congruos habent. Materies maris exerts, et
taque solida, cornibus spissitate, formitateque similis: femina vero medulam
continet, et molior est, atque cauatur: ob id ad venabulorum usum inutilis. Ma-
ris longitudo duodenorum, maxime cubitorum, quanta venabulorum Macedo-
nicorum longissimorum est. Caudex enim totus nulla excellentia exstat. Quidam
Troianam incolunt, marem sterilem dicunt, feminam autem fructuosam. Nu-
cleum fructus oliue similem habet; gustu dulcis, odoratuque gratus, floride, et
flore, fructificatque eodem modo, ut singulari pedicula plura proferat. Tem-*

Lib. 3. cap. 11.

b Pag. 64.

porre

pore quoque ferme conueniunt. At macedones ambas fructificare affirmant, sed femina ingastabilem esse: radices autem modo amaranthium habere validas, & nulli pernicios obnoxias. Nascitur etiam in humidis locis, nec tantum in siccis: promouit semine, atque euulsione.

Dunque se deuo dire ciò che quiui mi pare necessario, credo, che il Testa di Teofrasto non sij altrimenti scorretto, come alcuni nel Capitolo del Corniolo hanno lasciato scritto, e m' imagino che ciò sij causato per non hauer essi hauuta relatione delle piante vere di questo Autore.

Zambal frutice Indiano, ouero Ringhini primo.

Cap. 110.



N tanto si darà fine in quest' ultimo foglio con le seguenti piante Indiane, la prima delle quali la stimo vna specie di Solano pomifero spinoso, la seconda nò è altro che vna specie di Melanzana spinosa, legnosa, e frutescente, della quale qui si porge l' imagine, nelle di cui descrizioni non vi è altro del mio, che d' hauerle collocate à suo luogo; si rappresentano però cò le stesse parole, che le descrive il Padre Matteo, e sono le seguenti.

Zambal est frutex in stipite, & in folijs aculeos oblongos habens, folia ferè dentata quercorum modo, in summitate ramorum habet gemmas triangulares, flores trifolium carulei coloris, fructus rotundos auellonarum magnitudinis; nascitur in campestribus, cuius semina sunt valde minuta, & plana, quorum virrus est pro densium dolore, superposita ferro ignito, acceptoque fumo per os.

L' Image di questa Pianta è nella Figura 25. della Canna Indiana arborea.

Zambal secondo. Cap. 111.

Fig. 80.




Si & alius frutex huic similis, dictus Balingella de matto, qui nascitur in pectrosis locis, & eius radicibus vtuntur Pauperes pro ligno comburendo; flores habet caruleos, sed magnos, nec est aculeatus in folijs fructus sunt multo maiores illo supradicto, ad modum male insane nostrae; ex radicibus huius fructicis extrahitur oleum preciosissimum pro vulneribus.

A P.

fig LXXX.

Zarnbal ouero Ringhine
secōdo. an.



P E N D I C E.



Sfendo ormai nel fine di questa mia Istoria, mi giun-
fero alcune descrizioni di piante Indiane, registrate
in questo mio volume col solo nome, & Imagini,
le quali non parmi fuor di proposito il soggiungerle
qui, a beneficio de' studiosi Lettori, nell' Idioma istef-
so Latino, nel quale scriue il P. Fra Matteo.

Aggiunta all'Ana Varecca . Cap. 14. pag. 29.



IN Provincia Malabarica reperitur genus stirpium, quod in e-
dem lingua vocatur Ana Parecca, idest Elephantis ficus, seu fru-
ctus, habens radices albas, oblongas, quæ facile frangi possunt, sa-
pore amaro: habetque folia oblonga, & pingua, crassitudine se-
midigitali, odore subagreste, & terreo, fructus produit inter folia, sicut etiam, &
radices, sed sursum tendentes, præter illas, quibus arbori inhaeret. Istus lanuginos-
us sunt fructus, & odorem habent sicut ficus immatura Italica. Virtus foliorum
est ad ambusta curanda, addito iburis albiramento, & oui albumine. Radix
verò deseruit pro dolore ventris, & torminibus intestinorum sedandis, vermibus-
que necandis in pueris: Fructus similiter pro capitis dolore vtiliter adhibetur cum
ramento myrrhae.

Alla Butua ,ò Brutua . Cap. 30. Pag. 59.



R Eperitur in Mosanbik arbor vocata Brutua, cuius radix est magna estimationis (coricem habens subnigro colore intus vero subulbo) quibusdam circulis, seu parvis veluti musculis compacta, & gravis est, non levis, cuius virtus mirabilis est ad apostemata resoluenda, si tantillum de ea in potu sumatur. Putant quod hac radix sit illa, quae vocatur Rangaire, vulgo de Manikal, magni pretij, & virtutis.

Alla Palma Birli. Cap. 81. Pag. 159.



Eperitur in Indijs species Palma, quam vulgò vocant Birli, cuius rami descruunt porissimum ad ornatum : Vix enim festum aliquod in India celebratur, in quo non adornent Ecclesias frondibus prefata arboris, & ramis eius satis pulchris, & venustis. Produ-

cit flores in cortice quodam, seu germine inclusos, fructus ad modum Areca immediate sequentes, sed alij uando minores, & copiosissimos. Indigene autem ex ijs conficiunt rosaria. Similiter ex iisdem fructibus extrahitur succus, qui distillatur, & pro vino usurpari solet. Radix eius fricta in oleo sesamino optimo remedium est pro curandis vulneribus. De' fruti di questa Palma Indiana, ne tengo io nel mio Museo molti, de' quali à suo luogo se ne discorrerà.

Nell' istesso tempo riceuo ancora vn Libro stampato in Londra, l'anno 1674. intitolato *Icones, & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae, Auctore Paulo Boccone &c.* nel quale vi trouo mentionate alcune piante nel mio Volume descritte, quali potrebbe stimar superfluo alcuno il replicarle, hora essendo in questo già stampate le loro descrittioni, non le hò potuto leuarle, tanto più ch' alcune d' esse sono da me memorate sotto altro nome, & ancora più diffusamente descritte, & altre diuersamente interpretate.

La prima delle quali è vn' *Heliochriso con foglie d' Abrotano femina*, anzi più tosto l'istesso Abrotano femina vero di Dioscoride, e de gl' Antichi, da me per tale descritto, e figurato, e come credo giudicherano li Dotti della professione.

a Cap. 1. pag. 6

Altra con nome di *Nasturtium Montano con foglie d' Asara*, quale s' è da me proposta ^b, per Silembro Alpino rotondofoglio.

b Cap. 98. pag. 188.

Altra chiamata *Althea con foglie di Carpino*, che di questa à bastanza c, se n' è trattato per Malua annua di Pernambuco.

c Cap. 70. pag. 182.

Altra nominata *Malua con foglie di Betonica*, e forsi sarà questa la seconda nella mia Istoria d' descritta senza imagine per Malua serpeggiantte con foglie di Betonica.

d Cap. 69. pag. 132.

Altra con nome di *Stramonio feroce* proposta, la quale sino dell' Anno 1670. fù da me per il principio di questa Istoria (assieme con l' Othóna di Dioscoride) data in luce, sotto nome di *Datura di Coccinò spinosissima*, e similmente in questo volume e si troua sotto l'istesso nome notata.

e Cap. 42. pag. 76.

Altra descritta per vn' *Thlaspio Latifoglio platycarpo con foglia di Leucoio*. Tiene questa pianta qualche similitudine con il *Thlaspio Persico*, ch' io figuro in questa Istoria f, mà essendo in questo mio fior alquanto odorato, e nelle foglie amarezza grande, con altre qualità, che nel *Boccone* non si leggono, mi fan star sospeso, se questo di Sicilia sij lo stesso con quello di Persia.

f Cap. 101. pag. 196.

Altra chiamata con nome d' *Astero Tomentofo con foglie di Verbasco*, questo è l'istesso, ch' io descriuo g con nome d' *Altero con foglie di Verbasco di Ragusi*.

g Cap. 17. p. 132.

Altra proposta per *Coniza Cannadense annua, acra, bianca, con foglie di Linaria*. In questa mia Istoria ^h, descritta sotto nome di *Virgaurea Virginiana*

h Cap. 107. pag. 204.

niana infusa, parendomi douerleagli meglio questo nome di Virgaurea., per le sue foglie dentate, che porta questa pianta nelle parti da basso, che nelle Conize per il più ch'io habbia osseruato son sempre intiere, e senza dentatura alcuna.

Aggiunta alla Siderite Cretica, con odor di Bitume, Cap. 97. pag. 186.



Iene questa pianta descritta dal Dottissimo, & Eccellentiss. Morison con queste parole ne' suoi precludij a pag. 309. Botanici, a *Sideritis glutinosa*, *Bitumen redolens*: *Hac Sideritidis species dodrantalis est altitudinis, cuius folia ex aduerso sita sunt hirta, glutinosa, Caulibus (binazim) adherentia, contacta manibus, & naribus admodis, bitumen redolent, flores albos, & semina reliquarum Sideritidum modo fert.*

L' Eccellentiss. Sig. Giovanni Ray nel suo Catalogo delle Piante d' Inghilterra, e d' altre Isole circonuicine, trattando delle virtù delle Sideriti, in quella Reggia scuola sperimentare, così lasciò scritto.

Sideritis astringit, hamorrhagiam sistit, catarrhos, & destillationes à capite compescit. Vulneraria est, intus & extra adhiberi apta, precipuè in bernijs, Schod. Gerardus Panacis sui efficaciam in vulneribus sanandis, experientia coloni cuiusdam Cantiani, qui crus sibi inter falce grauiter vulnerauerat, edoctus, miris illud præconijs celebrat. Folia trita cum axungia porcinæ recentibus vulneribus imponit; le quali virtù, mi fanno souenire l' effetto singolare conseguito dalla nostra volgare Siderite, della quale richiesto ne mandai tempo fa à Milano all' Illustriss. & Reuerendiss. Sig. Canonico Manfredi Setalli, Sig. dottissimo, e singolarissimo posseditore d' un gran Mulco ripieno di molte rarità, tanto naturali, quanto artificiali fatte di sua propria mano (come bene vedesi dal suo Catalogo) quale seruitosi della volgare Siderite, mi riferì hauerne riportato molt' vtile per le destillationi cadute dal Capo.



LAUS DEO.



ERRORI SCORSI NELLA STAMPA.

Pag.	Linee.	Errori	Correzioni	Pag.	Linee.	Errori	Correzioni
1	25	oggiù	hoggiù	104	10	Scamone	Scamonea
4	5	habena	habet	105	21	quadreca	quadreca
4	11	capellere	explicare	110	7	marre	marre
11	11	ondeggie	tondeggie	111	15	fuchio	Fuchio
11	12	Ballon	Bulbus	112	20	Pidolo	Pirio
12	1	acorez	acutus	112	20	pel ano	pubano
12	11	dell'	dall'	112	10	arclata	oculata
13	13	fe	fec	112	11	Sclismum	Sclismum
21	15	eupressa	eupressin	112	14	sore	Lutose
21	25	Eutrate	Eutrate	113	14	mili	mili
24	16	Varfedia	Vancia	113	1	Bambucia	Bambagia
25	11	Colocasia	Colocasia	113	1	Canceo	Cano
25	22	carbrerat	extrahatur	113	4	pell	pell
26	17	Maneka	Manka	113	4	Cornati	Cornati
29	13	Sales	Sole	114	10	sanguisalba	sanguisalba
29	14	Mitro	Melchior	114	8	dai	dai
29	1	Draba	Baba	114	10	venenosa	venosa
29	5	tristidione	tristidione	114	21	si che	e esse
29	2	hemidion	hemidion aridis	114	12	adima	adima
29	21	Dioisno	Dryosno	114	13	fu	fu
31	8	come	come	114	22	adima	adima
32	20	Meliviana	malibiana	114	13	anala	molita
32	12	Cretana	Cretana	114	1	iffur	effur
32	3	concinantes	concinantes	114	11	boncini	boncini
32	16	dell'altre	dell'altre	114	20	soggaru	soggaru
32	16	alleganemene	elegantemente	114	1	altrici	altrici
31	13	ratte	ratte	114	2	ca' l'urone	ca' l'urone
31	21	lughie	lughie	114	2	curvace	curvace
31	5	Eura	Eura	114	2	ferria	ferria
31	7	Enilmo	Enilmo	114	21	stere	stere
31	13	li ti	li ti	114	24	lento incunao	lento in cunao
31	24	Rocer	Rocer	114	2	in quile	dalla quile
31	5	alcidul	alcidul	114	13	quidido	quidido
32	21	sticida	sticida	114	14	a' impolla	a' impolla
32	22	accidental	occidental	114	1	stereopato	stereopato
32	11	verifiosa	verifiosa	114	12	curvace	curvace
114	19	ipazio	ipazio	114	1	Enilmo	Enilmo
114	20	che possidore	e possidore	114	1	Melano	Melano

V. D. Ioseph Cribellus Pœnitentiarius pro Eminentiss. & Reuerendiss. D. Archiepisc. Bononiæ, & Principe.

Hoc opus inscriptum Istoria Bottanica di Giacomo Zanoni Semplicista, e Soprintendente del Giardino Publico dell' Vniuersità di Bologna, de mandato Reuerendiss. Patris Fr. Sixtus Cerchius Inquisitor Generalis Bononiæ accuratè perlegi, nihilquè in eo quod, quod Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & bonis moribus aduerfetur inueni, idcirco, vt in publicam vtilitatem typis mandetur, dignum censui.

Ego Petrus Pompeius Vincentius de Mantachettis L. V. D. Publicus Lector, & S. Officij Promotor Fiscalis, &c.

IMPRIMATUR

Fr. Sixtus Cerchius Inquisitor Generalis Bononiæ, &c.

Auertimenti per li Librari, per porre à suo luogo le Figure nel Libro.

Figura	1	Carte	1	Figura	<u>41</u>	car.	<u>105</u>
Figura	2	car.	7	Figura	<u>42</u>	car.	<u>105</u>
Figura	3	car.	9	Figura	<u>43</u>	car.	<u>107</u>
Figura	4	car.	13	Figura	<u>44</u>	car.	<u>109</u>
Figura	5	car.	15	Figura	<u>45</u>	car.	<u>111</u>
Figura	6	car.	21	Figura	<u>46</u>	car.	<u>113</u>
Figura	7	car.	23	Figura	<u>47</u>	car.	<u>115</u>
Figura	8	car.	25	Figura	<u>48</u>	car.	<u>117</u>
Figura	9	car.	29	Figura	49	car.	<u>119</u>
Figura	10	car.	29	Figura	<u>50</u>	car.	<u>127</u>
Figura	11	car.	31	Figura	51	car.	129
Figura	12	car.	33	Figura	52	car.	<u>131</u>
Figura	13	car.	35	Figura	<u>53</u>	car.	<u>133</u>
Figura	14	car.	37	Figura	<u>54</u>	car.	<u>135</u>
Figura	15	car.	41	Figura	<u>55</u>	car.	<u>143</u>
Figura	16	car.	43	Figura	<u>56</u>	car.	<u>145</u>
Figura	17	car.	45	Figura	<u>57</u>	car.	<u>147</u>
Figura	18	car.	47	Figura	<u>58</u>	car.	<u>149</u>
Figura	19	car.	49	Figura	<u>59</u>	car.	<u>149</u>
Figura	20	car.	51	Figura	<u>60</u>	car.	<u>151</u>
Figura	21	car.	55	Figura	<u>61</u>	car.	<u>155</u>
Figura	22	car.	59	Figura	<u>62</u>	car.	<u>157</u>
Figura	23	car.	61	Figura	<u>63</u>	car.	<u>159</u>
Figura	24	car.	63	Figura	64	car.	<u>161</u>
Figura	25	car.	65	Figura	<u>65</u>	car.	<u>163</u>
Figura	26	car.	67	Figura	<u>66</u>	car.	<u>165</u>
Figura	27	car.	69	Figura	<u>67</u>	car.	169
Figura	28	car.	75	Figura	68	car.	<u>173</u>
Figura	29	car.	77	Figura	<u>69</u>	car.	<u>183</u>
Figura	30	car.	79	Figura	<u>70</u>	car.	<u>185</u>
Figura	31	car.	81	Figura	<u>71</u>	car.	<u>187</u>
Figura	32	car.	83	Figura	<u>72</u>	car.	<u>189</u>
Figura	33	car.	87	Figura	<u>73</u>	car.	<u>193</u>
Figura	34	car.	89	Figura	<u>74</u>	car.	<u>197</u>
Figura	35	car.	91	Figura	<u>75</u>	car.	<u>201</u>
Figura	36	car.	93	Figura	<u>76</u>	car.	<u>203</u>
Figura	37	car.	93	Figura	<u>77</u>	car.	<u>203</u>
Figura	38	car.	97	Figura	<u>78</u>	car.	205
Figura	39	car.	101	Figura	<u>79</u>	car.	<u>207</u>
Figura	40	car.	103	Figura	<u>80</u>	car.	<u>209</u>





S.N. IV 1

